

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEIKUTSERTAAN PAP SMEAR PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI DAERAH RW XIII PERUMAHAN PUCANG GADING SEMARANG

**KINANTHI ESTU LINADI -- E2A007068
(2011 - Skripsi)**

Kanker serviks adalah penyakit kanker yang disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV). Kanker serviks menjadi penyebab kematian wanita pertama di Indonesia. Menurut data Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Semarang tahun 2004, ditemukan 1.115 kasus kanker serviks, tahun 2006 sebanyak 4160 kasus kanker serviks, dan pada tahun 2007 terdapat 5.481 kasus kanker serviks. sementara menurut WHO tahun 2008, keikutsertaan pap smear di Indonesia hanya 5%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan pap smear oleh PUS di daerah RW XIII Perumahan Pucang Gading Semarang. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif analitis. Populasi penelitian ini adalah wanita PUS dengan jumlah total 316. Sampel sebanyak 75 menggunakan metode simple random sampling. Analisis data dilakukan secara statistik dengan taraf signifikansi 95%. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden (20%) melakukan pap smear, sedangkan sebanyak 60 responden (80%) tidak melakukan pap smear. Dari uji statistik chi square didapatkan ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik pap smear ($p=0,002$), dan ada hubungan antara dukungan suami dengan praktik pap smear ($p=0,0001$). Saran yang direkomendasikan berdasarkan penelitian ini adalah pemegang program dapat bekerja sama dengan FKM Undip untuk meningkatkan sosialisasi tentang kanker serviks dan pap smear kepada masyarakat.

Kata Kunci: kanker serviks, PUS, pap smear