

30.9.2003

Raskaudenkeskeytykset ja steriloinnit vuonna 2002

Aborter och steriliseringar 2002

Induced abortions and sterilisations 2002

Raskaudenkeskeytykset

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346
hanna.eronen@stakes.fi

Anne Soimula
+358 9 3967 2359
anne.soimula@stakes.fi

Mika Gissler
+358 9 3967 2279
mika.gissler@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-
ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsövården

National Research and
Development Centre for Welfare
and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347
(painettu - printed)


Stakes julkaisi ennakkotiedot vuoden 2002 raskaudenkeskeytyksistä huhtikuussa 2003.

Lopullisten tilastojen mukaan tehtiin vuonna 2002 yhteensä 10 902 raskaudenkeskeytystä eli 9,1 tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden. Tämä on noin 200 keskeytystä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 1973 jälkeen keskeytykset vähenivät vuoteen 1995 asti sekä absoluuttisesti että suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin. Vuonna 1995 keskeytyksien määrä jäi alle kymmentuhannen, mutta tämän jälkeen keskeytyksiä on ollut vuosittain 10 000 - 11 000.

Vuotta 2001 lukuun ottamatta eniten keskeytyksiä on tehty 20-24 -vuotiaille (2 626 kpl vuonna 2002). Eniten keskeytyksiä (86,4 % vuonna 2002) tehdään vuosittain ns. sosiaalisella perusteella eli elämänoloista ja muista olosuhteista aiheutuvan huomattavan rasituksen vuoksi. Muut yleisimmät perusteet ovat alle 17 vuoden ikä (6,8 %), yli 40 vuoden ikä (3,8 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,1 %). Lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinviaasta tai heikkoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi suoritettiin 0,5 prosenttia keskeytyksistä vuonna 2002. Mahdollisen tai todetun sikiövaurion vuoksi suoritettuja keskeytyksiä on vuosittain vähän yli 200 (2,0 %).

Noin 94 prosenttia keskeytyksistä suoritetaan ennen kahdennentoista raskausviikon päättymistä ja nykyisin suurin osa, 88 prosenttia vuonna 2002, päiväkirurgisesti tai lääkkeellisesti. Lääkkeellinen keskeytys on yleistynyt nopeasti: vuonna 2002 näin keskeytettiin 27,2 prosenttia kaikista keskeytyksistä, kun vastaava luku edellisvuonna oli 16,4 prosenttia. Vuosittain keskeytetään muutamia kymmeniä (0,4 % vuonna 2002) yli 20 viikkoa kestäneitä raskauksia, pääasiassa todetun vakavan sikiövaurion perusteella ja muutama naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi.

Kuvio 1: Steriloinnit tuhatta 25 - 54 -vuotiasta kohti sukupuolittain 1951-2002



Asuinkunnan mukaan tarkasteltuna eniten keskeytyksiä suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin tehtiin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ja Helsingissä (yli 11/1000) vuonna 2002. Alhaisimmat keskeytysluvut olivat Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Savossa (alle 7/1000).

Steriloinnit

Sekä naisten että miesten steriloinnit ovat viime vuosina vähentyneet. Vuoden 1985 lainmuutoksen jälkeen naisten steriloinnit yleistyivät nopeasti ja niiden määrä oli suurimmillaan vuosina 1987, 1989-1992 ja 1996, jolloin tehtiin yli 12 000 sterilointia. Vuonna 2002 steriloitiin enää 6 728 naista. Suhteellisesti steriloidaan yhtä paljon naisia kuin vuonna 1970. Miesten huippuluku 2202 saavutettiin vuonna 1997, mutta vuonna 2002 steriloitiin vain 1 589 miestä. Edellisvuoteen nähden kummankin sukupuolen steriloinnit vähenivät noin 8 prosentilla vuonna 2002.

Sterilointeja tehdään edelleen huomattavasti enemmän naisille (81 %) kuin miehille (19 %). Vuosien 1950 ja 1970 sterilointilakien voimassaoloaikana on niiden nojalla sterilisoitu vuoden 2002 loppuun mennessä noin 291 700 naista, mutta vain 23 400 miestä. Yleisin steriloinnin peruste on ollut 30 vuoden ikä sekä miehillä (97 % vuonna 2002) että naisilla (96 %).

Vuonna 2002 tehtiin väestöön suhteutettuna 6,2 sterilointia tuhatta 25-54-vuotiasta naista kohti ja 1,4 sterilointia tuhatta 25-54-vuotiasta miestä kohti. Eniten naisten sterilointeja tehtiin Lapin sairaanhoitopiirissä (13,3/1000) ja vähiten Helsingissä (2,1/1000). Miesten sterilointeja tehtiin eniten Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä (2,2/1000), vähiten taas Ahvenanmaan maakunnassa (0,2/1000) ja Vaasan sairaanhoitopiirissä (0,5/1000).

Taulukot:

- Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2002
Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2002
Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2002
Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2002
Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2002
Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2002
Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2002
Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2002
Taulukko 9: Raskaudenkeskeytysten metodit 1998-2002
Taulukko 10: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2002
Taulukko 11: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2002
Taulukko 12: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2002
Taulukko 13: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2002
Taulukko 14: Steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2002

Lähteet:

Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisestä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970.

Toimenpiteitä koskevien lakien (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970 ja Steriloimislaki 283/1970) sekä niiden nojalla annettujen asetusten (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mukaisesti suorittajalääkäriin on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-keskukselle (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun ase-tuksen (774/1989) 6 §:n perusteella.

Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä Lääkintöhallituksen julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935-1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955-1970; Terveydenhuolto vuosina 1971-1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat Stakesin tietokannassa. Vuosien 1987-2001 aineistoa on tarkastettu, mm. kaksoiskappaleita poistettu ja aiemmin tilastoihin mukaan ottamattomia tapauksia, myöhemmin ilmoitettuja on tallennettu. Tämän vuoksi osa tiedoista poikkeaa aiemmin julkaistuista tilastoista.

Ikäryhmittäisessä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen tätä ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti laskettu vuosien 1986-1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä.

Käsitteet ja määritelmät:

Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytysten määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä.

Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa pysyvään suvunjakamiskyvyttömyyteen. Steriloinneiksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen ruumiillisen sairauden hoitamiseksi.

30.9.2003

Aborter och steriliseringar 2002

Aborter

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346
hanna.eronen@stakes.fi

Anne Soimula
+358 9 3967 2359
anne.soimula@stakes.fi

Mika Gissler
+358 9 3967 2279
mika.gissler@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus-
ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården

National Research and
Development Centre for Welfare
and Health

Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi


ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347
(painettu - printed)

Stakes publicerade i april 2003 förhandsuppgifter över aborter som utförts under 2002. Enligt slutgiltiga statistikuppgifter utfördes år 2002 sammanlagt 10 902 aborter dvs. 9,1 per tusen kvinnor i fertil ålder. Detta innebär ca 200 flera aborter än året innan. Efter år 1973 minskade antalet aborter ända fram till år 1995 såväl absolut som i relation till antalet kvinnor i fertil ålder. År 1995 understeg antalet aborter tiotusen, men därefter har antalet varierat årligen mellan 10 000 och 11 000.

Med undantag för år 2001 har de flesta aborterna utförts i åldersgruppen 20-24 år (2 626 st. år 2002). De flesta aborter (86,4 % år 2002) utförs årligen på social indikation, dvs. på grund av betydande belastning för kvinnan med hänsyn till levnadsförhållanden och andra omständigheter. De övriga vanligaste indikationerna är åldern under 17 år (6,8 %), över 40 år (3,8 %) och fyra tidigare förlossningar (2,1 %). År 2002 utfördes 0,5 procent av aborterna på medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppslyste eller svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa. Antalet aborter som utförs på grund av möjlig eller konstaterad fosterskada är något över 200 (2,0 %) årligen.

Ungefär 94 procent av aborterna utförs när graviditeten varat mindre än tolv graviditetsveckor och numera utförs största delen, 88 procent år 2002, som ett dagkirurgiskt ingrepp eller induceras med läkemedel. Läkemedelinducerad abort har snabbt blivit allt vanligare: år 2002 användes metoden i 27,2 procent av alla aborter, medan motsvarande antal året innan var 16,4 procent. Årligen avbryts några tiotals (0,4 % år 2002) graviditeter efter den 20nde graviditetsveckan, huvudsakligen till följd av konstaterad grav fosterskada, och några få på grund av fara för kvinnans liv eller hälsa.

Fig. 1: Steriliseringar per tusen 25-54-åringar efter kön 1951-2002



Efter patientens hemkommun utfördes år 2002 mest aborter i relation till kvinnor i fertil ålder i Västerbottens sjukvårdsdistrikt och i Helsingfors (11/1000). Antalet aborter var lägst i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Östra Savolax (färre än 7/1000).

Steriliseringar

Antalet steriliseringar av både män och kvinnor har minskat under de senaste åren. Efter lagändringen år 1985 blev steriliseringar bland kvinnor snabbt allmännare och deras antal var som högst under åren 1987, 1989-1992 och 1996, då man utförde över 12 000 steriliseringar. År 2002 steriliserades endast 6 728 kvinnor. Relativt sett steriliseras lika många kvinnor som år 1970. Rekordantalet för män, 2202 steriliseringar, nåddes år 1997, men år 2002 steriliserades endast 1 589 män. Jämfört med föregående år minskade steriliseringarna av de bägge könen år 2002 med ca 8 procent.

Det utförs fortfarande betydligt flera steriliseringar bland kvinnor (81 %) än män (19 %). Under den tid då steriliseringslagarna från åren 1950 och 1970 har varit i kraft har man med stöd av dem fram till slutet av år 2002 steriliserat ca 291 700 kvinnor, och endast 23 400 män. Den vanligaste indikationen för sterilisering har varit 30-årsålder för såväl män (97 % år 2002) som kvinnor (96 %).

År 2002 utfördes i relation till befolkningen 6,2 steriliseringar per tusen 25-54-åriga kvinnor och 1,4 steriliseringar per tusen 25-54-åriga män. Mest steriliseringar av kvinnor utfördes i Lapplands sjukvårdsdistrikt (13,3/1000) och minst i Helsingfors (2,1/1000). Mest steriliseringar av män utfördes i Mellersta Finlands och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (2,2/1000), minst i Ålands landskap (0,2/1000) och i Vasa sjukvårdsdistrikt (0,5/1000).

Tabeller:

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp åren 1969–1970, 1975–2002

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2002

Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2002

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2002

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2002

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2002

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2002

Tabell 8: Preventivmedel som abortpatienterna har använt 1980, 1985, 1989–2002

Tabell 9: Abortmetoder 1998–2002

Tabell 10: Steriliseringar efter kön 1951–2002

Tabell 11: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2002

Tabell 12: Steriliseringar bland kvinnor efter åldersgrupp 1994–2002

Tabell 13: Steriliseringar bland män efter åldersgrupp 1994–2002

Tabell 14: Steriliseringar efter indikation, civilstånd, ålder och antalet förlossningar 2002

Källor:

Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den första juli 1950 och statistik över aborter har publicerats sedan år 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970.

Enligt lagen om avbrytande av havandeskap 239/1970 och steriliseringslagen 283/1970 samt de förordningar som utfärdats med stöd av dessa (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes).

Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar som Stakes upprätthåller i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och § 6 i förordningen (774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.

Medicinalstyrelsens publikationer som har utgivits som en del av den officiella statistiken har använts som källor för den statistik som gäller tidigare år. Från och med 1987 har registret funnits i Stakes databas. Materialet för åren 1987–2001 har preciserats, bl.a. genom att avlägsna dubbla registreringar och inkludera fall som inte förut har ingått i statistiken eftersom de har anlänt senare. Därför avviker en del av uppgifterna från den statistik som tidigare har publicerats.

När man granskar uppgifter efter åldersgrupp är det viktigt att beakta att de uppgifter om ålder som förekommer i registret sedan 1994 baserar sig på patientens ålder på operationsdagen, medan patientens ålder tidigare angavs som ålder vid slutet av året. I den här publikationen har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens ålder på operationsdagen.

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av havandeskap): En graviditet som har avbrutits artificiellt och som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte har dött intrauterint före ingreppet.

Med sterilisering avses ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående avsaknad av fortplantningsförmågan. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i behandlingen av somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.

30 September 2003

Induced abortions and sterilisations 2002

Induced abortions

Hanna Eronen
+358 9 3967 2346
hanna.eronen@stakes.fi

Anne Soimula
+358 9 3967 2359
anne.soimula@stakes.fi

Mika Gissler
+358 9 3967 2279
mika.gissler@stakes.fi

Telefax
+358 9 3967 2324

In April 2003, STAKES published preliminary data on induced abortions in Finland in 2002.

According to the final statistics, a total of 10 902 abortions were performed in 2002, representing 9.1 induced abortions per thousand women of fertile age. This represents some 200 induced abortions more than the year before. After 1973 the number of induced abortions declined until 1995, both in absolute terms and in proportion to the number of women of fertile age. In 1995 the total number of induced abortions remained below ten thousand, but since then induced abortions have totalled between 10 000 and 11 000 per year.

With the exception of 2001, most abortions have been performed on women aged between 20 and 24 years (2 626 in 2002). Most abortions (86.4% in 2002) are performed each year on social grounds, meaning that the birth of the child would cause considerable strain to the mother in view of her personal circumstances and living conditions. The other most common reasons are the patient being under 17 years old (6.8%), over 40 years old (3.8%), or having given birth to four children already (2.1%). Some 0.5% of induced abortions performed in 2002 were on medical grounds, meaning that the pregnancy would endanger the woman's life or health because of illness, a physical disability or debility (i.e. medical indication). The number of abortions performed because of a potential or detected foetal defect is slightly over 200 per year (2.0%).

Some 94% of abortions are performed before the end of the twelfth week of gestation. Today most abortions, 88% in 2002, are performed as day surgery or are induced by drugs. Abortions induced by drugs have increased rapidly, accounting for 27.2% of all induced abortions in 2002 compared with 16.4% the previous year. Annually some tens of pregnancies (0.4% in 2002) are terminated after the 20th week of gestation; most because of a detected serious foetal defect, and a few on the grounds of the risk caused to the woman's life or health.

Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus-
ja kehittämiskeskus

Forsknings- och utvecklings-
centralen för social- och
hälsovården

National Research and
Development Centre for Welfare
and Health


Puhelin (09) 39 671
Telefon +358 9 396 71
Phone +358 9 396 71

Telefaksi (09) 3967 2459
Telefax +358 9 3967 2459

www.stakes.fi

ISSN 1459-2355 (Internet)
ISSN 1459-2347
(painettu - printed)

Figure 1: Sterilisations per thousand 25-54 year-olds by sex, 1951–2002



Analysed by the patient's domicile, most abortions in relation to women of fertile age in 2002 were performed in the Länsipohja Hospital District and in Helsinki (over 11 per 1000). The lowest figures for induced abortions were in Southern Ostrobothnia, Central Ostrobothnia, Kainuu and Eastern Savo (below 7 per 1000).

Sterilisations

The number of sterilisations has declined among both men and women in recent years. A marked increase occurred after the legislative reform in 1985, peaking in 1987, 1989-1992 and 1996 at over 12 000 sterilisations. In 2002 only 6 728 women were sterilised; as many women in relative terms as in 1970. Male sterilisations peaked at a total of 2 202 in 1997, but in 2002 only 1 589 men were sterilised. Compared with the previous year, both male and female sterilisations declined by some 8% in 2002.

The number of sterilisations among women (81% of all sterilisations) is still considerably higher than among men (19%). Some 291 700 women had been sterilised by the end of 2002 under the provisions of the Acts on Sterilisation passed in 1950 and 1970, but only 23 400 men. The most common grounds for sterilisation have been age for both men (97% in 2002) and women (96%), that is, the patient is over 30 years of age.

In terms of the population, 6.2 sterilisations were performed per thousand women in the 25-54 age group, and 1.4 sterilisations per thousand men in the 25-54 age group. Most female sterilisations were performed in the Lapland Hospital District (13.3 per 1000) and fewest in Helsinki (2.1 per 1000). Most male sterilisations were performed in the Hospital Districts of Central Finland and Northern Ostrobothnia (2.2 per 1000), and fewest in the Province of Åland (0.2 per 1000) and Vaasa Hospital District (0.5 per 1000).

Tables:

Table 1: Induced abortions by age, 1969–1970, 1975–2002

Table 2: Induced abortions by hospital district and age, 2002

Table 3: Indications for induced abortions, 1970–2002

Table 4: Induced abortions by indication, 2002

Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2002

Table 6: Induced abortions by previous deliveries, 1987–2002

Table 7: Induced abortions by previous abortions, 1987–2002

Table 8: Contraceptives used by abortion patients, 1980, 1985, 1989–2002

Table 9: Methods for induced abortion, 1998–2002

Table 10: Sterilisations by sex, 1951–2002

Table 11: Sterilisations by hospital district, 2002

Table 12: Sterilisations by age group among women, 1994–2002

Table 13: Sterilisations among men by age group, 1994–2002

Table 14: Sterilisations by indication, marital status, age and number of deliveries, 2002

Sources:

In Finland the first Act on Induced Abortion came into force on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on Induced Abortion was passed in 1970.

According to current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970 as well as the Decree on Induced Abortion 359/1970; Act on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and Health.

The data are stored in the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).

Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the STAKES database. Data for 1987-2001 have been checked; for instance by removing data that had been entered twice and by adding cases that had arrived later and previously not been included. For these reasons, some of the data are at variance with previously published statistics.

With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the register refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years referred to the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986-1993 have been calculated retrospectively using the patient's age on the day of the procedure.

Terms and definitions

Induced abortion: Artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death prior to the termination.

Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability to produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded as necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations.

Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2002

Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2002

Table 1: Abortions by age in 1969-1970, 1975-2002

Vuosi År Year	Keskey- tyksiä Aborter Abortions	Per 1000 elävänä syntyneitä levande födda live births	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti ⁽¹⁾ Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
			15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
1969	8 175	121,2	3,6	8,1	10,2	10,8	9,9	6,9	1,0	7,0
1970	14 757	225,8	8,3	15,4	17,8	18,0	16,6	11,8	1,6	12,7
1975	21 547	327,9	21,2	26,0	22,0	17,6	17,1	13,2	1,7	17,9
1976	19 818	296,5	20,4	24,7	17,5	16,0	15,8	11,8	2,3	16,4
1977	17 772	270,7	19,5	22,0	16,1	14,6	13,4	10,3	1,8	14,7
1978	16 928	264,5	19,8	21,4	15,4	13,0	11,7	9,9	1,6	14,0
1979	15 849	249,9	19,5	20,2	13,6	12,1	10,4	9,1	1,7	13,0
1980	15 037	238,4	19,4	19,7	12,2	11,0	10,3	8,2	1,7	12,3
1981	14 120	222,5	17,9	18,3	11,5	10,2	9,9	7,9	1,4	11,5
1982	13 861	209,7	17,9	18,7	11,0	9,8	9,5	6,9	1,3	11,2
1983	13 360	119,7	17,1	18,4	10,9	9,2	9,1	6,2	1,4	10,7
1984	13 645	209,7	16,9	18,7	11,1	9,8	9,4	6,5	1,3	10,9
1985	13 833	220,3	16,5	19,5	11,8	9,9	9,3	6,6	1,3	11,0
1986	13 319	219,7	17,8	18,7	11,2	10,0	8,8	5,2	0,8	10,6
1987	12 986	217,4	17,9	18,3	11,7	9,3	8,2	5,5	0,8	10,3
1988	12 738	201,6	17,0	19,5	12,0	9,0	8,0	4,9	0,7	10,2
1989	12 647	199,8	17,2	18,5	12,8	9,4	7,8	4,9	0,7	10,1
1990	12 217	186,6	15,9	18,3	12,6	9,7	7,6	4,6	0,9	9,7
1991	11 737	179,7	13,9	17,6	13,1	9,7	7,7	4,2	0,7	9,3
1992	11 064	165,9	12,9	16,5	12,7	9,8	7,2	3,7	0,6	8,7
1993	10 370	160,1	11,2	15,6	12,6	9,6	7,0	3,2	0,5	8,1
1994	10 011	154,3	10,7	14,5	13,0	10,0	6,3	3,2	0,5	7,9
1995	9 871	157,1	11,0	14,5	12,9	9,6	6,6	3,0	0,4	7,8
1996	10 422	172,3	11,4	15,1	13,8	11,0	7,1	2,9	0,4	8,3
1997	10 250	173,6	12,0	14,6	13,3	10,9	7,1	2,9	0,3	8,2
1998	10 750	189,3	13,0	15,1	13,6	11,7	7,7	3,0	0,2	8,7
1999	10 833	188,6	14,1	15,7	13,7	10,9	7,7	2,9	0,3	8,8
2000	10 932	193,3	14,8	16,0	13,0	11,2	7,9	3,0	0,2	9,0
2001	10 700	191,8	15,4	15,0	13,1	10,7	7,5	3,2	0,2	8,8
2002	10 902	196,3	16,1	16,4	12,4	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1

1) Vuosina 1969-1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.

År 1969-1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.

Years 1969-1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.

2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2002

Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2002

Table 2. Abortions by hospital district and age 2002

Sairaanhoitopiiri ⁽¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti Efter åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder By age group per 1000 women of the same age							
	15-19 ⁽²⁾	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	18,8	18,4	13,6	12,2	9,0	4,1	0,2	10,4
- Uusimaa - Nyland	16,8	19,2	14,1	11,5	8,7	3,9	0,2	9,9
- Helsinki - Helsingfors	22,6	17,7	13,0	13,2	9,4	4,4	0,1	11,2
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	16,5	16,4	11,9	10,8	7,6	3,0	0,0	9,1
Satakunta - Satakunta	17,5	17,2	11,8	9,7	6,5	3,6	0,1	8,9
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	15,0	14,5	14,9	8,4	5,7	3,4	0,2	8,1
Pirkanmaa - Birkaland	15,9	14,5	12,6	11,1	7,3	2,6	0,4	8,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	13,8	19,1	14,3	9,0	6,5	2,9	0,0	8,6
Kymenlaakso - Kymmenedalen	18,1	18,1	11,9	11,4	8,3	3,6	0,6	9,4
Etelä-Karjala - Södra Karelen	13,0	15,5	11,8	13,1	6,7	2,5	0,0	8,2
Etelä-Savo - Södra Savolax	14,1	18,1	10,5	7,4	5,9	2,4	0,2	7,6
Itä-Savo - Östra Savolax	12,9	11,1	14,0	9,0	4,7	3,0	0,0	6,9
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	16,9	14,2	10,5	9,0	8,1	3,0	0,3	8,2
Pohjois-Savo - Norra Savolax	15,0	14,6	10,0	7,7	6,3	2,7	0,2	7,6
Keski-Suomi - Mellersta Finland	14,6	15,9	11,0	9,9	6,6	3,9	0,4	8,7
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	14,4	12,9	8,8	6,7	5,2	1,4	0,0	6,7
Vaasa - Vasa	11,9	16,4	11,1	10,1	9,0	3,4	0,5	8,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	8,2	13,7	9,3	7,4	7,9	3,2	0,0	6,8
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	15,4	12,5	10,9	9,0	6,7	2,5	0,1	8,1
Kainuu - Kajanaland	16,4	10,3	10,7	5,5	6,9	1,6	0,0	6,9
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	18,6	31,0	14,4	12,0	8,9	2,8	0,7	11,5
Lappi - Lappland	17,0	15,0	14,8	15,7	6,2	4,4	0,4	9,5
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	9,7	18,8	23,4	15,9	8,2	3,3	0,0	10,4
- Landskapet Åland								
Yhteensä - Totalt - Total	16,2	16,4	12,5	10,7	7,6	3,3	0,2	9,1

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Alle 20-vuotiaiden abortit tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden.**

Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15-19 år.

Number of abortions among 20-year-olds per thousand women aged 15-19 years.

Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970-2002, %

Tabell 3: Indikationer för abort 1970-2002, %

Table 3: Indications for induced abortion 1970-2002, %

Vuosi År Year	Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical	Sosi- aalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Täyttänyt 40 v. Fyllt 40 år Age 40 or more	Synnyttänyt 4 lasta Fött 4 barn Given birth to 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Lapsen- hoitokyvyn rajoittu- neisuus Begränsad förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Yhteensä Totalt Total	
1970 ⁽¹⁾	44,3	33,0	0,2	3,9	6,1	11,6	0,8	..	0,1	100	14 757
1971 ⁽²⁾	20 622
1972 ⁽²⁾	22 146
1973 ⁽³⁾	9,2	71,5	0,1	4,2	8,5	6,0	0,4	..	0,2	100	23 362
1974 ⁽³⁾	7,7	73,6	0,1	3,3	8,6	6,4	0,3	..	0,1	100	22 846
1975 ⁽³⁾	6,0	74,8	-	5,2	7,8	4,8	1,1	..	0,3	100	21 547
1976 ⁽³⁾	5,4	76,2	-	5,4	7,8	4,1	0,7	..	0,4	100	19 818
1977	5,4	76,4	0,0	6,4	7,1	3,9	0,7	..	0,2	100	17 772
1978	4,3	77,5	0,0	6,9	7,6	3,0	0,6	..	0,2	100	16 928
1979	3,0	78,1	0,0	7,0	8,0	2,6	0,5	..	0,2	100	15 849
1980	3,5	77,6	0,0	7,5	7,6	2,2	1,0	..	0,2	100	15 037
1981	3,4	78,6	0,0	7,0	7,5	2,4	0,9	..	0,2	100	14 120
1982	3,3	79,7	0,1	7,1	6,9	2,0	0,7	..	0,2	100	13 861
1983	3,0	80,7	0,1	6,9	6,7	1,8	0,6	..	0,2	100	13 360
1984	3,1	81,3	0,0	6,1	6,6	2,1	0,7	..	0,1	100	13 645
1985	2,4	82,9	0,1	5,5	6,2	2,1	0,6	..	0,1	100	13 833
1986	1,9	84,1	0,0	4,8	6,1	2,1	0,8	..	0,1	100	13 319
1987	1,7	83,4	-	4,8	7,1	1,8	0,1	..	1,1	100	12 986
1988	1,3	84,4	0,1	4,1	7,2	1,6	1,1	..	0,1	100	12 738
1989	1,1	84,0	0,0	4,0	7,7	1,7	1,4	..	0,1	100	12 647
1990	0,8	83,9	0,0	4,5	7,4	1,8	1,5	..	0,1	100	12 217
1991	0,8	84,3	0,1	4,4	7,3	1,7	1,4	..	0,1	100	11 737
1992	0,8	85,2	0,0	4,3	6,3	1,6	1,7	..	-	100	11 064
1993	0,6	85,5	0,0	4,2	6,1	1,9	1,6	..	0,0	100	10 370
1994	0,5	74,2	0,0	3,8	6,0	2,0	2,2	..	0,0	100	10 012
1995	0,5	77,5	0,0	3,9	5,5	2,0	2,0	0,1	0,0	100	9 871
1996	0,4	80,3	-	3,7	4,8	2,3	2,1	..	0,0	100	10 422
1997	0,3	80,8	0,0	4,4	4,5	2,0	1,9	..	0,0	100	10 250
1998	0,3	85,8	0,0	5,4	4,2	2,2	0,6	1,5	0,0	100	10 750
1999	0,2	85,8	0,1	6,1	4,2	1,7	0,7	1,2	0,0	100	10 833
2000	0,1	84,3	0,1	7,5	3,9	1,8	1,0	1,2	-	100	10 932
2001	0,4	84,8	0,1	7,1	4,2	2,0	0,9	1,2	0,0	100	10 781 ⁽⁴⁾
2002	0,5	86,4	0,1	6,8	3,8	2,1	0,6	1,4	0,0	100	11 092 ⁽⁴⁾

1) **Nykyisen lain aikana.** Under den gällande lagen. *Under the current law.*

2) **Vain kokonaismäärä tilastoitu.** Statistiken över total antalet. *Statistics on available total number only.*

3) **Perustuu otokseen.** Grundar sig på sampel. *Based on a sample.*

4) **Useampi peruste mahdollinen.** Mera än en indikation möjlig. *More than one indication possible.*

Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2002

Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2002

Table 4: Abortions by indication 2002

Siviilisäätö, ikä ja synnytysten määrä Civilstånd, ålder och antal förlossningar Marital status, age and number of deliveries	Peruste - Indikation - Indication									
	Lääketiet. Medicinsk Medical	Sosiaalinen Social Social	Eettinen Etisk Criminal	Alle 17 v. Under 17 år Age under 17	Yli 40 vuotta Över 40 år Age 40 or more	4 lasta 4 barn 4 children	Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal defect	Todettu sikiövaurio Konstaterad fosterskada Detected foetal defect	Yhteensä ⁽¹⁾ Totalt Total	
Siviilisäätö - Civilstånd - Marital status										
Naimisissa - Gift - Married	31	1 840	1	3	211	137	25	100	2 348	
Naimaton - Ogift - Single	22	6 704	5	737	96	41	32	51	7 688	
Leski - Änka - Widowed	-	34	-	-	6	4	-	-	44	
Eronnut - Frånskild - Divorced	5	834	2	-	107	49	5	5	1 007	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	5	-	-	-	-	-	-	5	
Yhteensä - Totalt - Total	58	9 417	8	740	420	231	62	156	11 092	
Ikä - Ålder - Age ⁽²⁾										
-13	-	-	-	9	-	-	-	-	9	
14	-	-	-	81	-	-	-	-	81	
15	-	1	-	188	-	-	-	-	189	
16	-	1	-	386	-	-	-	-	387	
17	-	457	1	76	-	-	-	-	534	
18	-	677	1	-	-	-	1	2	681	
19	2	694	-	-	-	-	1	3	700	
20-24	9	2 604	2	-	-	3	3	9	2 630	
25-29	8	1 850	1	-	-	25	17	35	1 936	
30-34	24	1 602	2	-	-	58	13	45	1 744	
35-39	11	1 280	-	-	-	88	14	39	1 432	
40-44	3	239	1	-	390	53	13	22	721	
45-49	1	10	-	-	30	4	-	1	46	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
Yhteensä - Totalt - Total	58	9 417	8	740	420	231	62	156	11 092	
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries										
0	15	4 827	5	734	43	-	34	66	5 724	
1	17	1 794	1	6	67	-	15	50	1 950	
2	20	1 836	1	-	150	-	8	30	2 045	
3	4	780	1	-	99	13	3	6	906	
4	1	140	-	-	40	157	2	2	342	
5	1	28	-	-	15	46	-	-	90	
6	-	8	-	-	3	10	-	1	22	
7	-	3	-	-	3	5	-	-	11	
8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
9-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Tuntematon - Okänd - Unknown	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
Yhteensä - Totalt - Total	58	9 417	8	740	420	231	62	156	11 092	

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.

Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985-2002

Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985-2002

Table 5: Induced abortions by gestation length 1985-2002

	Raskauden kesto, viikkoja												Tuntematon Yhteensä	
	Gestationslängd, veckor												Okänd	Totalt
	-6	7	8	9	10	11	12-13	14-15	16-17	18-19	20-21	22-	Unknown	Total
	Gestation length, weeks													
1985	1 853	2 597	3 086	2 647	1 987	949	156	216	191	139	7	4	0	13 833
1986	1 947	2 595	2 982	2 459	1 784	869	134	192	156	175	13	13	0	13 319
1987	1 801	2 329	2 951	2 486	1 765	962	142	204	128	166	30	9	13	12 986
1988	1 886	2 284	2 722	2 367	1 828	982	133	198	172	115	26	23	2	12 738
1989	1 893	2 245	2 693	2 448	1 799	858	144	221	152	157	17	16	4	12 647
1990	1 847	2 227	2 693	2 285	1 680	812	156	202	129	130	42	12	2	12 217
1991	1 939	2 327	2 565	2 126	1 466	669	164	191	119	128	29	14	0	11 737
1992	1 915	2 212	2 374	1 987	1 340	627	136	168	133	126	33	13	0	11 064
1993	1 875	2 117	2 306	1 808	1 158	550	129	159	133	102	24	9	0	10 370
1994	1 988	2 107	2 140	1 614	1 096	461	114	177	135	124	34	21	0	10 011
1995	1 887	2 130	2 089	1 661	1 079	436	144	170	124	108	29	14	0	9 871
1996	2 019	2 179	2 273	1 641	1 102	600	149	170	135	115	25	10	4	10 422
1997	2 084	2 223	2 253	1 556	1 087	465	163	173	109	101	26	9	1	10 250
1998	2 256	2 446	2 293	1 596	1 074	459	184	161	125	113	27	13	3	10 750
1999	2 319	2 447	2 318	1 550	1 098	456	174	200	134	98	25	13	1	10 833
2000	2 605	2 372	2 233	1 583	1 036	431	155	230	134	120	25	8	0	10 932
2001	3 553	2 290	1 726	1 213	916	356	179	179	144	101	30	13	0	10 700
2002	3 772	2 396	1 696	1 096	876	382	226	181	129	105	31	12	0	10 902
%														
1985	13,4	18,8	22,3	19,1	14,4	6,9	1,1	1,6	1,4	1,0	0,1	0,0	0,0	100
1986	14,6	19,5	22,4	18,5	13,4	6,5	1,0	1,4	1,2	1,3	0,1	0,1	0,0	100
1987	13,9	17,9	22,7	19,1	13,6	7,4	1,1	1,6	1,0	1,3	0,2	0,1	0,1	100
1988	14,8	17,9	21,4	18,6	14,4	7,7	1,0	1,6	1,4	0,9	0,2	0,2	0,0	100
1989	15,0	17,8	21,3	19,4	14,2	6,8	1,1	1,7	1,2	1,2	0,1	0,1	0,0	100
1990	15,1	18,2	22,0	18,7	13,8	6,6	1,3	1,7	1,1	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1991	16,5	19,8	21,9	18,1	12,5	5,7	1,4	1,6	1,0	1,1	0,2	0,1	0,0	100
1992	17,3	20,0	21,5	18,0	12,1	5,7	1,2	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1993	18,1	20,4	22,2	17,4	11,2	5,3	1,2	1,5	1,3	1,0	0,2	0,1	0,0	100
1994	19,9	21,0	21,4	16,1	10,9	4,6	1,1	1,8	1,3	1,2	0,3	0,2	0,0	100
1995	19,1	21,6	21,2	16,8	10,9	4,4	1,5	1,7	1,3	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1996	19,4	20,9	21,8	15,7	10,6	5,8	1,4	1,6	1,3	1,1	0,2	0,1	0,0	100
1997	20,3	21,7	22,0	15,2	10,6	4,5	1,6	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1	0,0	100
1998	21,0	22,8	21,3	14,8	10,0	4,3	1,7	1,5	1,2	1,1	0,3	0,1	0,0	100
1999	21,4	22,6	21,4	14,3	10,1	4,2	1,6	1,8	1,2	0,9	0,2	0,1	0,0	100
2000	23,8	21,7	20,4	14,5	9,5	3,9	1,4	2,1	1,2	1,1	0,2	0,1	0,0	100
2001	33,2	21,4	16,1	11,3	8,6	3,3	1,7	1,7	1,3	0,9	0,3	0,1	0,0	100
2002	34,6	22,0	15,6	10,1	8,0	3,5	2,1	1,7	1,2	1,0	0,3	0,1	0,0	100

Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987-2002

Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987-2002

Table 6: Induced abortions by previous deliveries 1987-2002

Aikaisemmat synnytykset								
Tidigare förlossningar								
<i>Previous deliveries</i>								
	0	1	2	3	4	5- Tuntematon	Yhteensä	
						Okänd	Totalt	
						<i>Unknown</i>	<i>Total</i>	
1987	6 468	2 190	2 649	1 207	321	81	70	12 986
1988	6 544	2165	2552	1105	283	51	38	12 738
1989	6 419	2 194	2 482	1 118	289	75	70	12 647
1990	6 149	2 111	2 480	1 097	287	65	28	12 217
1991	5 698	2 143	2 438	1 055	245	81	77	11 737
1992	5 329	2 133	2 254	991	262	77	18	11 064
1993	4 829	2 030	2 249	904	248	90	20	10 370
1994	4 594	1 957	2 171	945	239	94	11	10 011
1995	4 689	1 908	2 054	900	229	90	1	9 871
1996	4 876	1 986	2 195	998	287	78	2	10 422
1997	4 984	1 833	2 153	953	254	73	-	10 250
1998	5 243	1 991	2 146	1 011	274	85	-	10 750
1999	5 431	1 950	2 132	983	245	92	-	10 833
2000	5 673	1 901	2 064	938	271	85	-	10 932
2001	5 475	1 955	2 005	908	249	107	1	10 700
2002	5 707	1 937	2 014	881	269	94	-	10 902
%								
1987	49,8	16,9	20,4	9,3	2,5	0,6	0,5	100
1988	51,3	17,0	20,0	8,7	2,2	0,4	0,3	100
1989	50,7	17,3	19,6	8,8	2,3	0,6	0,6	100
1990	50,3	17,3	20,3	9,0	2,3	0,5	0,2	100
1991	48,5	18,2	20,8	9,0	2,1	0,7	0,7	100
1992	48,1	19,3	20,4	9,0	2,4	0,7	0,2	100
1993	46,7	19,6	21,7	8,7	2,4	0,9	0,2	100
1994	45,9	19,5	21,7	9,4	2,4	0,9	0,1	100
1995	47,5	19,3	20,8	9,1	2,3	0,9	0,0	100
1996	46,8	19,1	21,1	9,6	2,8	0,7	0,0	100
1997	48,6	17,9	21,0	9,3	2,5	0,7	-	100
1998	48,8	18,5	20,0	9,4	2,5	0,8	-	100
1999	50,1	18,0	19,7	9,1	2,3	0,8	-	100
2000	51,9	17,4	18,9	8,6	2,5	0,8	-	100
2001	51,2	18,3	18,7	8,5	2,3	1,0	0,0	100
2002	52,3	17,8	18,5	8,1	2,5	0,9	-	100

Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987-2002

Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987-2002

Table 7: Induced abortions by previous abortions 1987-2002

	Aikaisemmat keskeytykset						5-	Tuntematon	Yhteensä
	Tidigare aborter							Okänd	Totalt
	Previous abortions							Unknown	Total
	0	1	2	3	4				
1987	9 454	2 528	537	144	33	13	277	12 986	
1988	9 320	2 485	550	114	32	9	228	12 738	
1989	9 153	2 526	547	124	28	20	249	12 647	
1990	8 904	2 487	573	120	32	19	82	12 217	
1991	8 332	2 474	596	167	36	18	114	11 737	
1992	7 697	2 454	620	147	45	23	78	11 064	
1993	7 183	2 299	590	148	40	17	93	10 370	
1994	6 929	2 132	602	142	44	28	134	10 011	
1995	6 912	2 153	578	154	47	24	3	9 871	
1996	7 247	2 273	663	174	35	28	2	10 422	
1997	7 172	2 185	626	182	44	27	14	10 250	
1998	7 579	2 263	641	182	58	27	-	10 750	
1999	7 774	2 182	624	171	52	29	1	10 833	
2000	7 772	2 256	648	172	55	29	-	10 932	
2001	7 571	2 243	616	187	48	33	2	10 700	
2002	7 665	2 251	683	217	47	37	2	10 902	
%									
1987	73,2	19,5	4,3	0,9	0,3	0,1	1,8	100	
1988	72,4	20,0	4,3	1,0	0,2	0,2	2,0	100	
1989	72,9	20,4	4,7	1,0	0,3	0,2	0,7	100	
1990	71,0	21,1	5,1	1,4	0,3	0,2	1,0	100	
1991	69,6	22,2	5,6	1,3	0,4	0,2	0,7	100	
1992	69,3	22,2	5,7	1,4	0,4	0,2	0,9	100	
1993	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100	
1994	69,2	21,3	6,0	1,4	0,4	0,3	1,3	100	
1995	70,0	21,8	5,9	1,6	0,5	0,2	0,0	100	
1996	69,5	21,8	6,4	1,7	0,3	0,3	0,0	100	
1997	70,0	21,3	6,1	1,8	0,4	0,2	0,1	100	
1998	70,5	21,1	6,0	1,7	0,5	0,1	-	100	
1999	71,8	20,1	5,8	1,6	0,5	0,3	0,0	100	
2000	71,1	20,6	5,9	1,6	0,5	0,3	-	100	
2001	70,8	21,0	5,8	1,7	0,4	0,2	0,0	100	
2002	70,3	20,6	6,3	2,0	0,4	0,2	0,0	100	

Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy 1980, 1985, 1989-2002, %

Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter 1980, 1985, 1989-2002, %

Table 8: Contraceptives used by abortion patients 1980, 1985, 1989-2002, %

	Pilleri ¹⁾	Kohdunsisäinen hormoniekhäisin	Kierukka	Kondomi	Sterilointi	Muu	Ei mitään	Tuntematon	Jälkiehäisy ²⁾	Yhteensä ³⁾
	P-piller Pill	Hormonspiral Hormone releasing IUD	Spiral IUD	Kondom Condom	Sterilisering Sterilisation	Annat Other	Ingenting Nothing	Okänd Unknown	Akut p-piller Post-coital oral contraceptive	Totalt Total
1980	4,6	..	10,9	41,8	..	5,0	32,3	5,4	..	100,0
1985	5,9	..	8,0	41,6	..	6,1	33,5	4,9	..	100,0
1989	7,9	..	5,1	46,0	..	4,0	34,1	4,1	..	101,2
1990	7,7	..	5,2	45,7	..	3,9	33,7	4,5	..	100,7
1991	8,3	..	5,2	44,1	..	3,9	34,8	4,7	..	101,0
1992	8,1	..	4,6	46,9	0,5	3,3	32,6	4,6	..	100,6
1993	7,8	..	4,8	47,3	0,7	2,8	32,0	5,4	..	100,0
1994	7,1	..	3,8	47,1	0,5	2,7	35,9	8,6	..	105,7
1995	7,8	..	3,5	47,7	0,5	3,2	34,4	8,9	..	106,0
1996	7,4	..	3,1	49,1	0,4	2,9	33,6	8,6	..	100,0
1997	7,8	..	2,4	49,9	0,5	3,1	32,8	8,9	..	100,0
1998	7,2	0,2	1,9	50,0	0,6	2,2	35,1	7,4	1,0	105,6
1999	7,9	0,1	1,7	50,5	0,6	1,9	35,1	6,8	1,3	105,9
2000	8,5	0,2	1,5	49,7	0,4	1,9	35,5	7,1	0,9	105,7
2001	8,6	0,1	1,4	50,0	0,4	1,7	35,7	5,0	1,2	104,1
2002	9,1	0,2	1,3	49,9	0,4	1,8	35,7	6,8	1,6	106,8

1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. *From 1998 the pill or capsule.*

2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämnts. *No mention of other contraceptive.*

3) Useampi menetelmä mahdollinen. Mera än en medel möjlig. *More than one method possible.*

Taulukko 9: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 1998-2002

Tabell 9: Abortmetoder 1998-2002

Table 9: Methods for induced abortion 1998-2002

	Laajennus, imukaavinta	Laajennus, tyhjennys, imukaavinta	Varhaisimu Tidig utrymning med sug	Abortiivaine Abortiv- medel	Prostaglandiini tai muu lääke Prostaglandin eller annat läkemedel	Mifegyne	Keisarileikkaus Kejsarsnitt	Muu Annat	Tuntematon Okänd	Yhteensä Totalt
	<i>Dilation, suction currettage</i>	<i>Dilation, evacuation, suction currettage</i>	<i>Early suction</i>	<i>Abortion agent</i>	<i>Prostaglandin or other drug Mifegyne</i>		<i>Caesarean section</i>	<i>Other</i>	<i>Unknown</i>	<i>Total</i>
1998	9 436	366	403	288	230	-	5	22	-	10 750
1999	9 374	396	425	422	178	-	4	33	1	10 833
2000	9 228	338	191	481	348	333	3	10	-	10 932
2001	7 192	229	159	491	838	1 758	5	28	-	10 700
2002	5 996	134	142	557	1096	2 966	3	8	0	10 902
%										
1998	87,8	3,4	3,7	2,7	2,1	-	0,0	0,2	-	100
1999	86,5	3,7	3,9	3,9	1,6	-	0,0	0,3	0,0	100
2000	84,4	3,1	1,7	4,4	3,2	3,0	0,0	0,1	-	100
2001	67,2	2,1	1,5	4,6	7,8	16,4	0,0	0,3	-	100
2002	55,0	1,2	1,3	5,1	10,1	27,2	0,0	0,1	0,0	100
Ennen 13. viikkoa / Före 13:e vecka / Before 13th week										
1998	9 288	281	400	5	140	-	0	10	0	10 124
1999	9 282	328	423	7	130	-	0	18	0	10 188
2000	9 139	284	191	14	295	333		4	0	10 260
2001	7 117	195	159	22	797	1 756	0	8	0	10 054
2002	5 944	109	142	14	1 040	2 966	0	3	0	10 218
%										
1998	91,7	2,8	4,0	0,0	1,4	-	0,0	0,1	0,0	100
1999	91,1	3,2	4,2	0,1	1,3	-	0,0	0,2	0,0	100
2000	89,1	2,8	1,9	0,1	2,9	3,2	0,0	0,0	0,0	100
2001	70,8	1,9	1,6	0,2	7,9	17,5	0,0	0,1	0,0	100
2002	58,2	1,1	1,4	0,1	10,2	29,0	0,0	0,0	0,0	100
13. viikolla tai sen jälkeen / 13. vecka eller därefter / 13th week of thereafter										
1998	146	85	2	283	90	-	5	12	0	623
1999	91	68	2	415	48	-	4	15	1	644
2000	89	54		467	53	0	3	6	0	672
2001	75	34	0	469	41	2	5	20	0	646
2002	52	25	0	543	56	0	3	5	0	684
%										
1998	23,4	13,6	0,3	45,4	14,4	-	0,8	1,9	0,0	100
1999	14,1	10,6	0,3	64,4	7,5	-	0,6	2,3	0,2	100
2000	13,2	8,0	0,0	69,5	7,9	0,0	0,4	0,9	0,0	100
2001	11,6	5,3	0,0	72,6	6,3	0,3	0,8	3,1	0,0	100
2002	7,6	3,7	0,0	79,4	8,2	0,0	0,4	0,7	0,0	100

Taulukko 10: Steriloinnit sukupuolen mukaan 1951-2002

Tabell 10: Steriliseringar efter kön 1951-2002

Table 10: Sterilisations by sex 1951-2002

Vuosi	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä	Naiset	Miehet	Yhteensä
<i>År</i>	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>	<i>Totalt</i>	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>	<i>Totalt</i>	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>	<i>Totalt</i>
<i>Year</i>	<i>Women</i>	<i>Men</i>	<i>Total</i>	<i>Women</i>	<i>Men</i>	<i>Total</i>	<i>Women</i>	<i>Men</i>	<i>Total</i>
	N			%			Per 1000 25-54 v. / år / year		
1951	771	10	781	98,7	1,3	100	0,9	0,0	0,5
1952	1 006	10	1 016	99,0	1,0	100	1,2	0,0	0,6
1953	1 044	20	1 064	98,1	1,9	100	1,2	0,0	0,6
1954	1 048	21	1 069	98,0	2,0	100	1,2	0,0	0,6
1955	1 227	9	1 236	99,3	0,7	100	1,4	0,0	0,7
1956	1 548	34	1 582	97,9	2,1	100	1,8	0,0	0,9
1957	1 694	34	1 728	98,0	2,0	100	1,9	0,0	1,0
1958	2 176	32	2 208	98,6	1,4	100	2,5	0,0	1,3
1959	2 536	61	2 597	97,7	2,3	100	2,9	0,1	1,5
1960	3 154	46	3 200	98,6	1,4	100	3,6	0,1	1,9
1961	3 152	47	3 199	98,5	1,5	100	3,6	0,1	1,9
1962	3 350	39	3 389	98,8	1,2	100	3,8	0,0	2,0
1963	3 481	30	3 511	99,1	0,9	100	4,0	0,0	2,1
1964	3 256	42	3 298	98,7	1,3	100	3,7	0,1	2,0
1965	3 183	23	3 206	99,3	0,7	100	3,7	0,0	1,9
1966	3 516	27	3 543	99,2	0,8	100	4,1	0,0	2,1
1967	4 010	12	4 022	99,7	0,3	100	4,6	0,0	2,4
1968	4 276	18	4 294	99,6	0,4	100	4,9	0,0	2,5
1969	5 437	12	5 449	99,8	0,2	100	6,3	0,0	3,2
1970	5 677	50	5 727	99,1	0,9	100	6,6	0,1	3,4
1971	3 990	270	4 260	93,7	6,3	100	4,5	0,3	2,5
1972	3 330	377	3 707	89,8	10,2	100	3,7	0,4	2,1
1973	2 746	279	3 025	90,8	9,2	100	3,0	0,3	1,7
1974	2 214	209	2 423	91,4	8,6	100	2,4	0,2	1,3
1975	2 221	154	2 375	93,5	6,5	100	2,3	0,2	1,3
1976	1 970	188	2 158	91,3	8,7	100	2,1	0,2	1,1
1977	1 942	209	2 151	90,3	9,7	100	2,0	0,2	1,1
1978	2 085	225	2 310	90,3	9,7	100	2,1	0,2	1,2
1979	2 172	226	2 398	90,6	9,4	100	2,2	0,2	1,2
1980	2 747	188	2 935	93,6	6,4	100	2,8	0,2	1,5
1981	3 422	205	3 627	94,3	5,7	100	3,4	0,2	1,8
1982	4 493	214	4 707	95,5	4,5	100	4,5	0,2	2,3
1983	4 867	224	5 091	95,6	4,4	100	4,8	0,2	2,5
1984	5 585	225	5 810	96,1	3,9	100	5,5	0,2	2,8
1985	8 675	558	9 233	94,0	6,0	100	8,4	0,5	4,4
1986	11 753	853	12 606	93,2	6,8	100	11,3	0,8	6,0
1987	12 083	695	12 778	94,6	5,4	100	11,5	0,6	6,0
1988	11 954	589	12 543	95,3	4,7	100	11,3	0,5	5,8
1989	12 391	611	13 002	95,3	4,7	100	11,6	0,6	6,0
1990	12 864	593	13 457	95,6	4,4	100	11,9	0,5	6,1
1991	12 780	512	13 292	96,1	3,9	100	11,7	0,5	6,0
1992	12 234	505	12 739	96,0	4,0	100	11,1	0,4	5,7
1993	11 074	480	11 554	95,8	4,2	100	10,0	0,4	5,1
1994	10 926	598	11 524	94,8	5,2	100	9,8	0,5	5,1
1995	10 520	792	11 312	93,0	7,0	100	9,4	0,7	5,0
1996	12 561	1 809	14 370	87,4	12,6	100	11,3	1,6	6,3
1997	10 991	2 202	13 193	83,3	16,7	100	9,9	1,9	5,8
1998	9 594	1 921	11 515	83,3	16,7	100	8,6	1,7	5,1
1999	9 040	1 798	10 838	83,4	16,6	100	8,1	1,6	4,8
2000	8 699	1 771	10 470	83,1	16,9	100	7,9	1,5	4,7
2001	7 259	1 762	9 021	80,5	19,5	100	6,6	1,6	4,0
2002	6 728	1 589	8 317	80,9	19,1	100	6,2	1,4	3,8

Taulukko 11: Steriloinnit sairaanhoitopiireittäin 2002

Tabell 11: Steriliseringar efter sjukvårdsdistrikt 2002

Table 11: Sterilisations by hospital district 2002

Sairaanhoitopiiri ¹⁾ Sjukvårdsdistrikt Hospital district	Steriloinnit-steriliseringar-sterilisations				Yhteensä-totalt-total	
	Naiset-kvinnor-women		Miehet-män-men		N	Per 1000 ²⁾
	N	Per 1000 ²⁾	N	Per 1000 ²⁾		
Koko maa - Hela landet - <i>Whole country</i>	6 728	6,2	1 589	1,4	8 317	3,8
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland	1 440	4,4	410	1,3	1 850	2,8
- Uusimaa - Nyland	1 151	5,9	269	1,4	1 420	3,7
- Helsinki - Helsingfors	289	2,1	141	1,1	430	1,6
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland	667	7,0	160	1,7	827	4,3
Satakunta - Satakunta	241	5,3	80	1,7	321	3,5
Kanta-Häme - Centrala Tavastland	260	7,7	57	1,6	317	4,6
Pirkanmaa - Birkaland	522	5,5	131	1,3	653	3,4
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland	221	5,2	48	1,1	269	3,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen	263	7,2	53	1,4	316	4,2
Etelä-Karjala - Södra Karelen	199	7,8	28	1,0	227	4,3
Etelä-Savo - Södra Savolax	121	5,9	22	1,0	143	3,4
Itä-Savo - Östra Savolax	87	7,1	11	0,8	98	3,8
Pohjois-Karjala - Norra Karelen	227	6,8	62	1,7	289	4,1
Pohjois-Savo - Norra Savolax	362	7,2	56	1,0	418	4,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland	325	6,1	123	2,2	448	4,1
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten	274	7,5	57	1,4	331	4,3
Vaasa - Vasa	175	5,5	16	0,5	191	2,9
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten	99	6,7	19	1,2	118	3,9
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten	674	9,1	174	2,2	848	5,5
Kainuu - Kajanaland	83	5,1	21	1,2	104	3,1
Länsi-Pohja - Västra Österbotten	121	9,2	12	0,8	133	4,8
Lappi - Lappland	320	13,3	40	1,5	360	7,1
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland	41	7,4	1	0,2	42	3,8
Ulkomaat - Utlandet - <i>Foreign countries</i>	2	..	0	..	2	..
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	4	..	8	..	12	..

1) **Potilaan asuinkunnan mukaan.** Enligt hemkommun. *According to patient's domicile.*

2) **Tuhatta 25-54 v. naista/miestä kohti.** Per 1000 kvinnor/män i åldersgrupp 25-54 år
Per 1000 women/men aged 25-54 years

Taulukko 12: Naisten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2002

Tabell 12: Steriliseringar bland kvinnor efter åldersgrupp 1994-2002

Table 12: Sterilisations by age group among women 1994-2002

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
-24	35	41	43	36	25	30	29	23	23
25-29	428	382	467	343	322	269	263	209	201
30-34	2 485	2 387	2 766	2 411	2 054	2 022	1 771	1 469	1 334
35-39	4 247	3 998	4 903	4 252	3 769	3 656	3 579	2 862	2 765
40-44	3 146	3 143	3 734	3 410	2 930	2 661	2 642	2 383	2 106
45-49	579	565	643	527	489	398	409	309	295
50-54	6	3	5	11	5	4	6	4	0
Tuntematon -	-	1	-	1	-	-	-	-	4
Okänd - <i>Unknown</i>									
Yhteensä -	10 926	10 520	12 561	10 991	9 594	9 040	8 699	7 259	6 728
Totalt - <i>Total</i>									
%									
-24	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
25-29	3,9	3,6	3,7	3,1	3,4	3,0	3,0	2,9	3,0
30-34	22,7	22,7	22,0	21,9	21,4	22,4	20,4	20,2	19,8
35-39	38,9	38,0	39,0	38,7	39,3	40,4	41,1	39,4	41,1
40-44	28,8	29,9	29,7	31,0	30,5	29,4	30,4	32,8	31,3
45-49	5,3	5,4	5,1	4,8	5,1	4,4	4,7	4,3	4,4
50-54	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Tuntematon -	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-	-
Okänd - <i>Unknown</i>									
Yhteensä -	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Totalt - <i>Total</i>									
Per 1000									
25-29	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
30-34	2,3	2,1	2,5	1,9	1,8	1,5	1,5	1,2	1,2
35-39	13,0	12,6	14,7	13,0	11,0	10,8	9,5	7,9	7,2
40-44	21,0	20,0	24,7	21,6	19,4	19,1	18,9	15,3	14,9
45-49	15,2	14,8	17,6	16,3	14,3	13,2	13,3	12,1	10,7
50-54	4,0	3,7	4,0	3,0	2,5	1,9	1,9	1,5	1,4
25-54	9,8	9,4	11,3	9,9	8,6	8,1	7,9	6,6	6,2

Taulukko 13: Miesten steriloinnit ikäryhmittäin 1994-2002

Tabell 13: Steriliseringar bland män efter åldersgrupp 1994-2002

Table 13: Sterilisations among men by age group 1994-2002

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
-24	-	-	3	1	7	1	4	4	5
25-29	17	17	42	30	32	32	28	44	34
30-34	107	147	327	415	347	336	309	290	297
35-39	199	271	575	704	615	575	596	556	505
40-44	152	204	496	604	555	491	505	529	440
45-49	86	108	266	319	263	241	230	238	215
50-54	37	45	100	129	102	122	99	101	92
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	598	792	1 809	2 202	1 921	1 798	1 771	1 762	1 589
%									
-24	-	-	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,2	0,3
25-29	2,8	2,1	2,3	1,4	1,7	1,8	1,6	2,5	2,1
30-34	17,9	18,6	18,1	18,8	18,1	18,7	17,4	16,5	18,7
35-39	33,3	34,2	31,8	32,0	32,0	32,0	33,7	31,6	31,8
40-44	25,4	25,8	27,4	27,4	28,9	27,3	28,5	30,0	27,7
45-49	14,4	13,6	14,7	14,5	13,7	13,4	13,0	13,5	13,5
50-54	6,2	5,7	5,5	5,9	5,3	6,8	5,6	5,7	5,8
Tuntematon - Okänd - <i>Unknown</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yhteensä - Totalt - <i>Total</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Per 1000									
25-29	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30-34	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
35-39	0,5	0,7	1,7	2,1	1,8	1,7	1,6	1,5	1,6
40-44	0,9	1,3	2,8	3,5	3,1	2,9	3,1	2,9	2,6
45-49	0,7	0,9	2,3	2,8	2,6	2,4	2,5	2,6	2,2
50-54	0,6	0,7	1,6	1,8	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0
25-54	0,5	0,7	1,6	1,9	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4

Taulukko 14: Steriloinnit perusteen, siviilisäädyn, iän ja aiempien synnytysten mukaan 2002

Tabell 14: Steriliseringar efter indikation, civilstånd, ålder och antalet förlösningar 2002

Table 14: Sterilisations by indication, marital status, age and number of deliveries 2002

		Synnyttänyt 3 lasta	3 alaikäistä lasta	Yli 30 vuotta Över 30 år Age 30 or more	Lääketiet. Medicinsk Medical	Ehkäisy- vaikeudet Svårigheter att förhindra en graviditet Contraception difficult	Jälkeläisten vaikea sairaus tai ruumiinvika Risk för sjukdom eller kroppslite hos barn Serious disease or defect of offspring	Raj. kyky huolehtia lapsista Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to take care of children	Tuntematon Yhteensä ¹⁾ Okänd Totalt Unknown Total	
NAISET - Kvinnor - Women		Siviilisääty - Civilstånd - Marital status								
	Naimisissa - Gift - Married	2 266	42	4 287	20	137	0	1	1	6 754
	Naimaton - Ogift - Single	411	10	1 268	14	46	0	14	2	1 765
	Leski - Anka - Widowed	25	0	48	0	0	0	0	0	73
	Eronnut - Fränskild - Divorced	362	13	866	2	33	0	0	1	1 277
	Tuntematon - Okänd - Unknown	3	0	10	0	0	0	0	0	13
		Ikä - Ålder - Age²⁾								
	-19	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	20-24	14	1	0	1	2	0	5	0	23
	25-29	163	6	0	17	23	0	5	3	217
	30-34	722	25	1 323	5	49	0	1	0	2 125
	35-39	1 263	22	2 758	9	72	0	0	0	4 124
	40-44	798	10	2 100	3	62	0	2	1	2 976
	45-49	105	1	294	1	8	0	0	0	409
	50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tuntematon - Okänd - Unknown	2	0	4	0	0	0	0	0	6
		Aiemmat synnytykset - Tidigare förlösningar - Previous deliveries								
	0	0	0	294	6	12	0	14	0	326
	1	2	1	723	7	33	0	1	1	768
	2	66	10	2 633	14	100	0	0	1	2 824
	3	1 975	37	1 875	5	54	0	0	1	3 947
	4	695	10	634	2	14	0	0	1	1 356
	5	210	2	203	1	1	0	0	0	417
	6	60	1	59	0	0	0	0	0	120
	7	31	2	30	0	2	0	0	0	65
	8	14	1	14	1	0	0	0	0	30
	9-	14	1	14	0	0	0	0	0	29
	Tuntematon - Okänd - Unknown	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Yhteensä - Totalt - Total	3 067	65	6 479	36	216	0	15	4	9 882
MIEHET - Män - Men		Siviilisääty - Civilstånd - Marital status								
	Naimisissa - Gift - Married	..	333	1 196	0	89	0	0	1	1 619
	Naimaton - Ogift - Single	..	23	144	0	7	0	4	0	178
	Leski - Anka - Widowed	..	0	6	0	0	0	0	0	6
	Eronnut - Fränskild - Divorced	..	30	189	0	7	0	0	0	226
	Tuntematon - Okänd - Unknown	..	2	10	0	1	0	0	0	13
		Ikä - Ålder - Age²⁾								
	-19	..	0	0	0	0	0	0	0	0
	20-24	..	3	0	0	0	0	2	0	5
	25-29	..	27	0	0	6	0	2	0	35
	30-34	..	84	297	0	16	0	0	0	397
	35-39	..	132	501	0	35	0	0	0	668
	40-44	..	91	439	0	27	0	0	1	558
	45-49	..	41	215	0	16	0	0	0	272
	50-	..	10	92	0	4	0	0	0	106
	Tuntematon - Okänd - Unknown	..	0	1	0	0	0	0	0	1
	Yhteensä - Totalt - Total	..	388	1 545	0	104	0	4	1	2 042

1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.

2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä. Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.