

Pia Mäkelä & Janne Härkönen Suomalaisen alkoholinkulutus on vähentynyt – keiden ja millainen kulutus? (YP 5/2017)

Liitetaulukko 1. Alkoholinkäytön indikaattoreita sukupuolen, ikäryhmän ja tutkimusvuoden mukaan. Vuosia 2000 ja 2016 koskevilla riveillä olevat tilastolliset testit koskevat eroa vuoteen 2008 verrattuna. Kunkin muuttujan alla olevalla rivillä sulkeissa on interaktiotestien p-arvoja¹

	Miehet			Naiset		
	15–29	30–49	50–69	15–29	30–49	50–69
Raittiita, %						
	(p1=0,11; p2=0,31)					
2000	6*	7	10	8	5	17
2008	11	7	12	8	7	14
2016	14	9	13	15 *	16***	15
Alkoholia useammin kuin viikoittain käyttäviä, %						
	(p1=0,82; p2=0,21)					
2000	27	40	31**	9	18	16
2008	24	41	41	9	20	21
2016	16**	35	33**	7	12**	16
Syysviikon käyttökertojen keskimääräinen kerralla juotu annosmäärä (niillä joilla >0)						
	(p1=0,77; p2=0,53)					
2000	7.7	6.0	4.3	4.0 **	2.9*	2.1*
2008	8.0	5.7	4.4	5.5	3.5	2.6
2016	6.5*	5.1	4.5	4.8	3.8	2.7
Vastaajia, jotka ovat juoneet 5+ kuukausittain, %						
	(p1=0,58; p2=0,056)					
2000	68*	48	36	31	15	8
2008	62	53	40	31	19	8
2016	44***	45*	36	27	13*	11
Vastaajia, jotka ovat käyttäneet 13 annosta tai enemmän ainakin kerran vuodessa, %¹						
	(p1=0,04; p2=0,49)					
2000	65*	45	29	15 *	8	2*
2008	56	50	27	23	11	5
2016	46*	44	23	20	9	3
Korkean riskin käyttäjiä, %²						
	(p1=0,80; p2=0,01)					
2000	9	8	8	4	4	2
2008	8	8	9	4	6	4
2016	5	9	6	5	2	4

¹ Interaktio ajan, sukupuolen ja 3-luokkaisen ikämuuttujan välillä p1: 2000–2008 ja p2: 2008–2016. Malli, josta p-arvot on saatu, sisältää kaikki 2-suuntaiset interaktiot ja päävaikutukset.