

45
4
1

591
82-N2

NEOTROPICA

NOTAS ZOOLOGICAS AMERICANAS

1994

VOLUMEN 40
NUMEROS 103 y 104

Sociedad Zoológica del Plata

Aves nuevas o poco comunes de la Patagonia

En los últimos años han ingresado a las colecciones ornitológicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires (MACN), una serie de ejemplares de diversas especies de aves aún no citadas para la Patagonia y otras que son poco frecuentes o que muestran registros notables en cuanto a su distribución geográfica. Dicho material ha sido colectado en su mayoría por A. Kovacs e hijos, pero asimismo han aportado ejemplares interesantes, W. H. Partridge, A. Anziano y M. Rumboll.

Nothura darwinii darwinii G. R. Gray 1867. Inambú Pálido. Conover (1950, *Field. Zool.*, 31 (37): 343-345) manifiesta que el límite meridional de esta especie es el río Chubut inferior, sobre la base de un ejemplar coleccionado entre Gaiman y Trelew, pues las menciones más australes (Durnford, 1878, *Ibis*: 405 y Hartert y Venturi, 1909, *Novit. Zool.*, 26: 266) son consideradas erróneas o por lo menos dudosas, ya que no están representadas por ejemplares coleccionados. De todos modos, no se descarta totalmente que para esa época, la especie hubiera llegado hasta el sur del Chubut y Santa Cruz.

N. darwinii es mucho menos común que *N. maculosa*, pues en la Patagonia, por lo menos, se ve poco. En el MACN existe una piel procedente del valle inferior del río Chubut, en Trelew (Marzo 1913) y dos hembras de Río Negro colectadas por Partridge: una de General Conesa (Febrero 1962) y otra del valle superior del río Negro, en Ingeniero Julián Romero, Valle Azul (Mayo 1963). Esta última resulta ser ahora el registro más occidental de la raza *darwinii*, pues las demás citas publicadas se ubican en el este, hacia la costa.

Más recientemente, Kovacs coleccionó un macho y una hembra en Puerto Pirámides, golfo Nuevo, provincia del Chubut (Abril 1980), localidad ya mencionada por Conover (*loc. cit.*) pero de muy antigua data.

También en Ingeniero Julián Romero, Partridge capturó trece ejemplares de *N. maculosa*, lo que vuelve a demostrar que ambas especies conviven.

Phalacrocorax gaimardi cirriger King 1828. Cormorán Gris. Esta subespecie ha sido señalada por Jehl y Rumboll (1976, *Trans. San Diego Soc. Hist. Nat.*, 18 (8): 151) en el cabo Aristizábal, ba-

hía Bustamante, provincia del Chubut, el cual es entonces el sitio más norteño que se conoce hasta ahora de su área de dispersión.

Kovacs coleccionó una hembra en Punta León, en la misma provincia (Septiembre 1981), lugar situado a unos 300 km al norte de aquel cabo. Por consiguiente, esta cita es el hallazgo más septentrional, llegando allí en sus desplazamientos de invierno por la costa patagónica. El lugar más austral conocido para esta raza es en las cercanías de la desembocadura del río Santa Cruz (Murphy, 1936, *Oceanic birds of South America*, 2: 875).

Nycticryphes semicollaris (Vieillot 1816). Aguatero. Ha sido mencionada para la Patagonia sólo en dos oportunidades: la primera, en 1876 por Durnford (1877, *Ibis*: 42) en el valle inferior del río Chubut, cerca de la antigua colonia galesa, mencionó que es raro pues observó un solo individuo. La segunda cita corresponde a Peters (1923, *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 65 (9): 298) quien la registró como rara en la estancia Huanuluán, en los alrededores de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro en los años 1920 y 21. En la colección del MACN hay un ejemplar capturado por Anziano en Quemquemtreu (arroyo y estancia), provincia del Neuquén, en enero 1943. Kovacs colectó un macho en Punta Ninfas, golfo Nuevo, provincia del Chubut, en noviembre 1975. Aparentemente, esta especie es ocasional en la Patagonia.

Stercorarius parasiticus (Linnaeus 1758). Salteador Chico. Grant (1911, *Ibis*: 476) fue el primer autor que mencionó esta especie en la Argentina, en el "Tuyú, Ajó", partido de General Lavalle, Buenos Aires, en 1909. Wetmore (1926, *U. S. Natl. Mus. Bull.* 133: 129) y Murphy (*op. cit.*: 1037) también la registraron en las costas bonaerenses. Humphrey *et al.* (1970, *Prelim. Smith. Manual*: 219) citan cuatro individuos en Viamonte, Tierra del Fuego. En cambio, no existe mención concreta para la Patagonia propiamente dicha. En la colección del MACN existen dos pieles de esta especie: una de fase oscura, hembra adulta, procedente de Punta Norte, península Valdés, Chubut, colectada por Rumboll en marzo de 1975, y un macho subadulto de fase oscura, capturado por Kovacs en Puerto Melo, cabo Dos Bahías, en la misma provincia, en marzo de 1981.

Coccyzus melacoryphus Vieillot 1817. Cuclillo Canela. El registro más austral para la Argentina es un macho obtenido en las islas Malvinas (Bennet, 1937, *Hornero*, 6 (3): 541). Este ejemplar se encontró muy agotado y maltrecho, llevado allí tal vez por una fuerte tormenta que lo extravió fuera de la costa patagónica y resulta ser completamente accidental. Las dos citas más antiguas son Rosas, partido de Las Flores, Buenos Aires (Daguerre, 1922, *Hornero*, 2 (4): 267) y La Pampa, basado seguramente en un macho del MACN capturado por Pereyra, en Conhelo (Zotta, 1937, *Hornero*, 6 (3): 541). Más recientemente, Nores (1986, *Hornero*, 12 (4): 305) menciona este cuclillo más al sur, en Viedma, provincia de Río Negro. Un nuevo y más austral registro, es un macho coleccionado por Kovacs, en noviembre de 1982 en bahía Cracker, golfo Nuevo, provincia del Chubut. Es muy probable que esta especie se esté expandiendo hacia el sur en sus desplazamientos de primavera, como lo están haciendo muchas otras aves aprovechando mejores condiciones ecológicas que el hombre les ofrece al poblar y modificar el hábitat norpatagónico.

Phytotoma rutila rutila Vieillot 1818. Cortarramas. Fue citada en el valle inferior del río Negro por Hudson (1872, *Proc. Zool. Soc. London*: 537, 549) en los alrededores de Carmen de Patagones o quizás de Viedma y ha figurado siempre en los catálogos como "Río Negro". Camperi (1992, *Neotrópica*, 38 (100): 135) la menciona para varias localidades de los partidos de Bahía Blanca, Villarino y Patagones, provincia de Buenos Aires, donde es

relativamente común. Nores (1986, *Hornero*, 12 (4): 306) cita dos pieles del Cortarramas obtenidas en estación Baltusca (no localizada, tal vez estancia), a 60 km de Colonia Sarmiento, Chubut, la cual es el registro más austral de la especie. No existen otras menciones concretas para la Patagonia, por lo que considero es de interés dar a conocer un macho capturado por Kovacs en noviembre de 1978, en el valle Los Mártires, cerca de Las Plumas, río Chubut.

Mimus saturninus modulator (Gould 1836). Calandria Grande. Olrog (1979, *Op. Lilloana*, 27: 242) extiende hasta la provincia de Río Negro el límite sur de la distribución geográfica, sin saberse en qué información se fundamentó. Camperi (1992, *Neotrópica*, 38 (100): 135) la señala en Juan A. Pradere, partido de Patagones, Buenos Aires. En las colecciones del MACN hay un ejemplar hembra coleccionado por Kovacs en junio de 1986, en Gaiman, Chubut, que es así la mención más austral conocida hasta el presente.

Paula pitiayumi pitiayumi (Vieillot 1817). Pitiayumí. La cita más meridional de la Argentina correspondió a Camperi (1992, *Neotrópica*, 38 (100): 136) quien mencionó dos ejemplares de Bahía San Blas. El Pitiayumí sigue, aparentemente, extendiéndose hacia el sur, pues Kovacs capturó un macho en agosto de 1986, en Puerto Madryn, Chubut.

Jorge R. Navas
Museo Argentino de Ciencias Naturales