


Prostaglandines per tractar l'asma

07/2009 - **Medicina i Salut.** Aproximadament 150 milions de persones arreu del món pateixen asma, sent a les societats més avançades on la incidència és més elevada. I no s'atura. Dades que s'han de tenir molt presents, donat que actualment manquem d'un fàrmac curatiu. A més, si no és correctament avaluada i tractada, aquesta malaltia pot mermar considerablement la qualitat de vida de les persones afectades. En la recerca de nous camins terapèutics, les prostaglandines (PG) han aparegut a escena. Mol·lècules en origen, constitueixen tota una família de mediadors cel·lulars amb múltiples funcions: intervenen en la resposta inflamatòria, provoquen la contracció de la musculatura llisa o regulen la temperatura corporal, entre d'altres. Aquest article analitza la possibilitat que la PGE₂ (la dinoprostona, un tipus de PG) actuï com una molècula antiasmàtica a la regió pulmonar. Per estudiar-ho, d'una banda han exposat ratolins a extractes d'àcars de la pols com a nou model d'asma al·lèrgica induïda. I de l'altra, els han inoculat agonistes de receptors de PGE₂. Els resultats de l'experiment evidencien una disminució inflamatòria i una inhibició de l'activitat mastocitària en els pulmons, és a dir, la PGE₂ disminueix la sensibilització de l'organisme davant la presència d'un al·lèrgen. Aquests resultats permeten consolidar el model d'estudi, i obren les portes a futurs tractaments.



Talls de pulmó de ratolins asmàtics. a) i b) no estan tractats amb PGE₂, c) i d) sí. Es veu clarament que l'infiltrat inflamatori al voltant de les vies aèries és molt menor en els animals tractats.

La complexitat i el desconeixement de gran part de la patogènia de l'asma al·lèrgica dificulten la identificació de noves dianes terapèutiques, un objectiu fonamental per una malaltia amb una incidència en augment en els països més desenvolupats. En la inducció de la disfunció respiratòria i de la inflamació al·lèrgica característiques de l'asma hi participen un entramat de mol·lècules i de cèl·lules immunitàries. Entre les moltes mol·lècules estudiades destaquen les prostaglandines (PG), productes de l'activitat de les ciclooxigenases (COX). Investigacions recents en pacients asmàtics i en models d'asma en ratolí apunten cap al possible efecte protector d'algunes PG com la PGE₂, particularment en el pulmó. No obstant això no es coneixen els mecanismes mitjançant els quals la PGE₂ exerceix les seves accions beneficioses. A partir de nombrosos experiments in vitro i alguns in vivo es dedueix que l'efecte protector de la PGE₂ en l'asma pot deure's als seus efectes antiinflamatoris i immunosupressors. S'ha demostrat per exemple que aquesta PG és capaç d'atenuar l'activitat mastocitària in vitro, mitjançant la seva interacció directa amb els receptors prostanoids (EP) presents en la seva superfície. Se sap que l'activació d'aquestes cèl·lules desencadena l'alliberament de diversitat de mediadors, molts dels quals podrien induir els fenòmens de hiperreactivitat bronquial (AHR: contracció exagerada de la musculatura llisa bronquial) i inflamació. Per tant, es pot pensar en la possibilitat de modificar in vivo la resposta asmàtica actuant sobre els mastòcits mitjançant l'ús d'agonistes o antagonistes dels receptors EP.

L'objectiu d'aquest estudi, ha estat avançar en el coneixement dels mecanismes protectors de la PGE₂ en l'asma, per a la futura identificació de noves dianes terapèutiques antiasmàtiques. Per a això es va utilitzar un nou model d'asma al·lèrgica aguda induïda mitjançant l'exposició via intranasal de ratolins Balb/c a extractes d'àcars de la pols. En aquest model es va estudiar l'impacte de l'administració via subcutània d'agonistes dels receptors prostanoids PGE₂ i sulprostona, un agonista dels

receptors EP₁/EP₃, en la resposta respiratòria induïda per l'exposició a àcars de la pols en relació a la reactivitat bronquial, l'infiltrat cel·lular pulmonar, el perfil de citosines Th1/Th2 i l'activitat dels mastòcits pulmonars en les vies respiratòries d'aquests ratolins.

L'exposició intranasal a àcars de la pols induïx una clara disfunció respiratòria (AHR) i una intensa inflamació de tipus Th2 amb predominança de eosinòfils i increment de la producció pulmonar de les citosines, IL-5 i IL-13. Paral·lelament a aquestes alteracions s'observa un marcat augment de l'activitat, però no del nombre, de mastòcits. El tractament dels ratolins amb PGE₂ via subcutània atenua clarament el procés inflamatori, reduint sobretot el nombre d'eosinòfils. La disminució de la inflamació en els animals tractats s'acompanya d'una disminució de les citosines Th2, IL-5 i IL-13, la qual cosa suggereix que l'efecte de la PGE₂ sobre la inflamació es deu en part a la seva capacitat d'atenuar la resposta Th2. A més, en els mateixos ratolins la PGE₂ inhibeix amb claredat l'activitat dels mastòcits pulmonars, la qual cosa apunta directament cap als mastòcits com mediadors del paper atenuador de la inflamació que exerceix la PG. La sulprostona no reproduïx l'efecte de la PGE₂ ni sobre la resposta inflamatòria ni sobre l'activitat dels mastòcits. Sota les condicions experimentals utilitzades, ni la PGE₂ ni la sulprostona administrades via subcutània, alteren la AHR induïda per exposició a l'al·lèrgen.

Els nostres resultats contribueixen a consolidar el model induït per àcars de la pols com idoni per a la investigació bàsica dels mecanismes implicats en l'asma al·lèrgica i per a la recerca de dianes en el sistema COX/PGE₂. Hem demostrat en el model de ratolí sensible a àcars de la pols l'efecte inhibitori de la PGE₂ en la inflamació Th2 i hem suggerit que aquest efecte pot estar mediat per la reducció de l'activitat dels mastòcits pulmonars. Les troballes obtingudes en aquest treball conjuntament amb l'avanç en el coneixement dels mecanismes pels quals la PGE₂ exerceix el seu efecte protector en l'asma, poden ajudar a identificar en el futur noves dianes terapèutiques.

Aida Herrerias

Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia

Universitat Autònoma de Barcelona

Aida Herrerias, Rosa Torres, Mariona Serra, Alberto Marco, Jordi Roca-Ferrer, César Picado, Fernando de Mora. Subcutaneous prostaglandin E2 restrains airway mast cell activity in vivo and reduces airway eosinophilia and lung Th2 cytokine overproduction in a house dust mite-induced mouse model of asthma. *Int Arch Allergy Immunol* 2009 Mar 17, 149(4):323-332.