

**СУПУТНІ ЗАХВОРЮВАННЯ З БОКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ХВОРИХ З
ДУОДЕНАЛЬНОЮ ВИРАЗКОЮ
РІЗНОЇ ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ**

*Орловський О.В., асистент
Науковий керівник – проф. Фадєєнко Г.Д.
СумДУ, медичний інститут,*

кафедра внутрішньої медицини з курсом пропедевтики

Метою дослідження було вивчення частоти супутніх захворювань з боку шлунково-кишкового тракту у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (ПВ ДПК) ускладнену кровотечею у порівнянні з неускладненим перебігом.

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 87 хворих з неускладненою ПВ ДПК (І група), та 100 хворих, що мали в анамнезі шлунково-кишкову кровотечу (ІІ група). Діагностика супутніх захворювань з боку шлунково-кишкового тракту проводилась в результаті комплексного обстеження: фіброгастроскопія, УЗД органів черевної порожнини, біохімічні та клінічні лабораторні дослідження.

Результати дослідження. Найчастіше серед обстежених хворих виявлялась дискінезія жовчовивідних шляхів: 36,8 % у хворих І групи та 39,0 % у хворих ІІ групи ($p>0,05$). На другому місці за частотою діагностувалась гастроєзофагальна рефлексна хвороба, відповідно 32,2 % та 34,0 % ($p>0,05$). Хронічний панкреатит займав третє місце з частотою 27,7 % у хворих І групи та 31,0 % у хворих ІІ групи ($p>0,05$). Хронічний холецистит діагностувався значно рідше, відповідно 11,5 % та 14,0 % хворих ($p>0,05$). В жодному випадку не знайдено суттєвої різниці у частоті супутніх захворювань між групами, що порівнювались.

Висновок. Частота супутніх захворювань з боку шлунково-кишкового тракту у хворих з ПВ ДПК не залежить від тяжкості перебігу захворювання.