

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СНІДУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

*Шевченко Т.В., Шкіра О.В., студ. 5-го курсу
Науковий керівник – доцент Ільїна Н.І.
СумДУ, медичний інститут, кафедра інфекційних хвороб*

Пандемія ВІЛ/СНІДу охопила майже всі країни світу, 42 млн осіб сьогодні живуть із ВІЛ/СНІДом.

Метою нашої роботи стало вивчення клініко-епідеміологічних особливостей перебігу СНІДу в Сумській області. Для її досягнення визначені такі задачі: виявити групи ризику та закономірності поширення СНІДу серед них, визначити віковий склад ВІЛ-інфікованих, з'ясувати шляхи передавання інфекції, проаналізувати особливості перебігу захворюваності в Сумській області.

Проведено ретроспективний аналіз історій хвороби хворих на СНІД, що перебували на лікуванні у Сумській обласній клінічній інфекційній лікарні у 1998-2005 рр., використані параметричні та непараметричні методи обробки матеріалу та зроблені такі висновки: серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД переважають особи, що вживають наркотики ін'єкційним шляхом (79 %); вік пацієнтів з ВІЛ-інфекцією знаходиться в межах 25-28 років; переважають особи чоловічої статі. У 40,3 % осіб ВІЛ-інфекція мала безсимптомний перебіг. Найчастіше (37,1 %) хворі зверталися за медичною допомогою на II стадії перебігу хвороби. Серед опортуністичних інфекцій переважали вірусні гепатити В і С, ротоглотковий кандидоз і різні бактеріальні хвороби. Найбільш частими проявами захворювання були: тривала гарячка, втрата маси тіла, хронічна діарея, генералізована лімфаденопатія, ротоглотковий кандидоз, дисбактеріоз, анемія, дискінезія жовчовивідних шляхів. Для II – IV стадії хвороби характерна панцитопенія, що пов'язано з ураженням кровотворення. Значно порушуються фільтраційна і концентраційна функції нирок.