

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРЕМОРБИДНЫМ ФОНОМ

Рудя А. А., врач-интерн

Научный руководитель – доцент Сичненко П. И.

Сумский государственный университет, кафедра педиатрии №1

Обследовано 113 детей с обструктивным бронхитом, в возрасте от 1 месяца до одного года, находящихся на лечении в Сумской городской детской клинической больнице в 2003 году. Неблагоприятный преморбидный фон был отмечен у 82 детей (72,6%). Отягощенный акушерский анамнез встречался у 42% детей, анемия у 40%, явления экссудативно - катарального диатеза и аллергические реакции на пищу 19% детей, отягощение наследственности по аллергическим заболеваниям встречалась у 12% детей. Значительный удельный вес у детей с обструктивным бронхитом занимали перинатальные поражения ЦНС. У всех детей, имеющих неблагоприятный преморбидный фон, отмечалось более длительное и более тяжелое течение заболевания. Стандартная терапия применяемая для лечения обструктивного бронхита не всегда оказывала положительный эффект, поэтому у 90% таких детей бронхообструктивный синдром купировался только после введения глюкокортикоидов. Более часто развивались осложнения в виде отитов. Сроки выздоровления удлиннялись до 11 дней, а у некоторых до 2 – 3 недель.

Таким образом, неблагоприятные преморбидные факторы у детей раннего возраста играют существенную роль в развитии и течении бронхообструктивного синдрома.