

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Лыхобаба Н.П., студ. 5-го курса

Научный руководитель – доц. Шищук В.Д.

СумГУ, кафедра анестезиологии и реаниматологии

Около 10 % всех травм опорно-двигательной системы составляют травмы позвоночника. Среди всех повреждений позвоночника наибольшую группу представляют переломы в нижнегрудном (Th₉ – Th₁₂) и поясничном (L₁ – L₅) отделах позвоночника 80 – 87,5 %.

Проведен анализ лечения переломов нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника у 56 пациентов находившихся в областном ортопедо–травматологическом центре за 2003 год. Мужчин было 42 (75%), женщин – 14 (25%). Возраст пострадавших колебался от 17 до 65 лет. Чаще всего травмировались лица до 35 лет – 44 (78,5%) человек.

У обследованных нами больных наиболее часто повреждался I поясничный – у 19 (34 %) и XII грудной позвонки – 15 (26,8%), L₂ позвонок был травмирован у 8 (14,3 %), Th₁₂ – у 5 (9 %), L₃ – у 3 (5,4%); одинаково часто встречался перелом L₄ и L₅ позвонков – по 2 (3,6 %), а также - Th₁₀ и Th₉ позвонков - по 1 (1,8 %).

Консервативная терапия была проведена у всех пациентов. Из консервативных способов лечения мы применяли укладку пострадавших на функциональную койку со щитом, на реклинатор, блокаду мест переломов, активное физио-терапевтическое воздействие, проводили симптоматические мероприятия.