

## АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОШИРЕННЯ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ СНІДу В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

*Небоян С.Б., студ. 3-го курсу*

*Наукові керівники – к.мед.н., доц. Л.І. Карпенко, к.мед.н., доц. Г.Ю. Будко  
СумДУ, кафедра патоморфології, з курсами судової медицини, медичного законодавства,  
гістології, цитології та ембріології*

За рівнем поширення ВІЛ/СНІДу в Європі Україна, на жаль, займає перше місце. За останніх п'ять років кількість випадків ВІЛ-інфікованих в Україні зросла у 20 разів і нині становить майже 400 000. Серед дорослого населення України рівень розповсюдження ВІЛ становить майже 1,33%, що дозволяє говорити про перед епідемічний стан захворюваності. Щодня реєструється 48 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією. Питома вага померлих від СНІДу в Україні у загальному числі померлих за 2010 рік становить близько 10%, абсолютна більшість яких – віком до 40 років. Найбільше ВІЛ-інфікованих в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях.

За даними управління охорони здоров'я Сумської державної адміністрації, обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом, Сумська область відноситься до регіонів з низьким рівнем поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу. З часу виявлення першого випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році і до 2009 року включно, в нашій області офіційно зареєстровано 1325 випадків ВІЛ-інфекції (Україна – 161 119), у тому числі 280 випадків захворювання на СНІД (Україна – 31241) та 98 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом (Україна – 17791). За рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію Сумська область посідала 5-е рангове місце серед 27-ми адміністративних територій України. При цьому, кількість вперше виявлених випадків ВІЛ-інфекції серед жителів Сумської області у порівнянні з 2008 збільшилась зі 185 до 214 випадків, що у показниках становить відповідно 15,3 та 18,0 на 100 тис. населення ( Україна-43,2). Зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію відбулося у 8 районах області: Буринському, Глухівському, Кролевецькому, Недригайлівському, Охтирському, С.-Будському, Сумському, Шосткинському та обласному центрі. За рівнем захворюваності на СНІД у 2009 р. Сумська область посіла 10- місце. Кількість хворих на СНІД збільшилась у порівнянні з попереднім роком з 52 до 65 випадків. У 35 із 65 хворих на СНІД діагнози «ВІЛ-інфекція» та « СНІД» були встановлені одночасно. Серед хворих на СНІД було діагностовано у 66,2% легеневий та позалегеневий туберкульоз. За темпами приросту показника захворюваності на СНІД Сумська область у 2009 році зайняла 24 рангове місце. Зростання захворюваності на СНІД відмічалось у Білопільському, Конотопському, Недригайлівському, Охтирському, Шосткинському, Краснопільському, Кролевецькому районах та м. Суми.

За рівнем смертності від СНІДу у 2009р. Сумська область посідала 8 рангове місце. У 14 померлих від СНІДу основним захворюванням, яке стало причиною смерті став легеневий та поза легеневий туберкульоз. Серед СНІД-індикаторних захворювань, які спричинили смерть були зареєстровані неходжкінська лімфома, розповсюджений кандидоз, синдром виснаження, пневмоцистна пневмонія, токсоплазмоз мозку та бактеріальний сепсис.

Виходячи з того, що хвороба СНІД є смертельно небезпечною, її виявлення, лікування накладає значну відповідальність на людей, які мають відношення до цього: як хворих, так і тих, хто лікує.