



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: helpdesk.lib@unsyiah.ac.id

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

ANALISIS PROFIL PENGGUNAAN ANTIPIPSIKOTIK PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI ACEH

ABSTRACT

ABSTRAK

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang dapat diterapi dengan antipsikotik untuk menurunkan gejala penyakit. Antipsikotik berdasarkan jenisnya terdiri dari antipsikotik tipikal dan atipikal yang digunakan secara tunggal atau kombinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan profil penggunaan antipsikotik yang meliputi pola penggunaan tunggal maupun kombinasi dan tingkat kesembuhan pasien (ditinjau dari lama perawatan), serta menentukan hubungan antara profil penggunaan antipsikotik terhadap tingkat kesembuhan pasien skizofrenia. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Aceh, dan bersifat deskriptif dengan desain cross sectional. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini sebanyak 87 pasien rawat inap. Pengambilan data menggunakan teknik cluster sampling yang diperoleh dari catatan rekam medik. Profil penggunaan antipsikotik memperlihatkan bahwa mayoritas pasien skizofrenia menggunakan antipsikotik secara tunggal (57,5%), dimana jenis antipsikotik yang dominan digunakan adalah antipsikotik atipikal (52,9%) dengan risperidon merupakan obat yang paling sering digunakan (40,2%). Sebagian besar pasien dirawat dalam jangka waktu ≤ 43 hari (55,2%). Penggunaan antipsikotik baik pola tunggal maupun pola kombinasi menunjukkan tidak adanya hubungan terhadap tingkat kesembuhan pasien skizofrenia ($P > 0,05$).

Kata Kunci: Skizofrenia, Antipsikotik, Lama Perawatan, RSJ Provinsi Aceh

ABSTRACT

Schizophrenia is a mental disorder that can be treated with antipsychotic to reduce disease symptoms. Antipsychotic are divided into two groups, typical and atypical, which can be used as mono therapy or combination. The aims of this research is to determine the profile of antipsychotic use, which include the use of single-agent therapy, combination therapy and patients' outcome (measured by patient length of treatment), and to determine the correlation between the single or combination use of antipsychotic with patients' outcome. The research was conducted at Aceh Mental Hospital using descriptive method with cross sectional analytic design. The samples were 87 inpatients who met the inclusion criteria. Retrieving data using cluster sampling technique obtained from medical record. The result showed that the majority of schizophrenia patients used single antipsychotic agent (57.5%), dominated by atypical type (52.9%) with risperidone as the most frequently used medication (40.2%). The majority of patient were treated for less than 43 days (55.2%). The statistical analysis showed that the single or combination use of antipsychotic has no correlation with patient outcome ($P > 0.05$).

Keywords: Schizophrenia, Antipsychotics, Patients' Outcome, Aceh Mental Hospital