

mu je osigurati sidrište za restorativnu stomatologiju. Usadcima se mogu riješiti različiti klinički slučajevi, od potpune ili djelomične bezubosti do nadomjestka jednoga zuba. Danas se osobita pozornost daje estetskom, fonetskom i higijenskom aspektu takve terapije, a ne samo restauracije pacijentove mastikatorne funkcije.

U kojim slučajevima možemo upotrijebiti usadak ovisi o mnogim čimbenicima. Prikazati ćemo nekoliko slučajeva potpune bezubosti, djelomične bezubosti (manjka distalnih zuba jednostrano i obostrano), manjka jednoga zuba te traumatski gubitak dijela čeljusti.

Ankylos Dental Implant System - for Which Cases are Implants Suitable?

Macan D.

*Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
University Hospital "Dubrava", School of Dental
Medicine, Zagreb, Croatia
E-mail: darkom@kdb.hr*

The target for every prosthodontic treatment - due to tooth decay or tooth loss was and is, to construct and simulate the natural dentition as close as possible. Decreasing the number of teeth means increasing difficulties to achieve such a target. It is often impossible to achieve perfect function with dentures over a long period because of permanent soft tissue and bone changes. By then, the denture does not fit any more and has lost its retention. Tooth implants can be the favourable solution in most of these cases.

Ankylos implants are manufactured from biologically neutral pure Titanium and they have a rough surface. The special design ensures excellent anchorage even immediately after implantation (primary stability) and the protection of the jaw bone under chewing pressure.

For which cases are implants suitable? This depends very much on the situation. We will show you a few examples when it is suitable to use an implant as a solution to conventional prostheses. If a single tooth is to be replaced; if teeth are missing on the end of the arch in either the upper or lower jaw; if there are large gaps between the few remaining teeth, and if there are no more teeth remaining.

Usporedba značajki molara u krapinskoga hominida i današnjega čovjeka

Mačešić M¹, Kaić Z²

¹Zdravstveni dom Krško, Krško, Slovenija

²Zavod za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Svrha ovoga istraživanja bila je utvrditi morfološke značajke okluzalnih ploha trajnih molara u krapinskoga hominida (KH) te dobivene rezultate usporediti s nalazima današnje populacije koja je činila kontrolnu skupinu (KS). Klasifikacija značajki okluzalnih ploha molara određena je prema standardima za karakterizaciju morfoloških varijanti trajnih zuba po ASU (Arizona State University) - Dentoantropološki sustav Državnog sveučilišta u Arizoni). Ukupno je obrađeno 77 molara KH, od toga 34 gornja i 43 donja. U KS ukupno je obrađeno 4836 molara, od toga 2548 gornjih i 2288 donjih. Raščlambom okluzalnih ploha molara utvrđeno je : u trećih i drugih gornjih molara KS smanjenje čestoće distolingvalne kvržice; nestankom ili redukcijom veličine distolingvalne kvržice nastala je promjena obrisa okluzalne plohe iz romboidnog u trokutast, te gubitka H-sustava brazdi, koji je znatno češći nalaz u KH ($p < 0,05$). Na prvoj gornjem molaru nađeno je najmanje razlika između dviju promatranih skupina. Samo po obilježju Carabellijevo svojstvo nađena je znatna razlika u zastupljenosti i to s većom čestoćom u KH ($p < 0,01$). U donjih molara (M1, M2, M3) KS utvrđena je smanjenja čestoća distalne kvržice ($p < 0,01$). Na M3 i M2 u objema promatranim skupinama najzastupljeniji crtež brazdi je oblika +. Oblik X postoji samo u KS. Na M1 dominantan crtež brazdi u objema skupinama je oblika Y. Na osnovi navedenih rezultata može se zaključiti da je u današnjega čovjeka na molarima nastala redukcija broja kvržica i promjena oblika okluzalnih ploha, što je dovelo do smanjenja ukupne žvačne površine zuba. Kako je prema stajalištima antropologa crtež brazdi oblika Y najkonzervativniji, a oblik X najrazvijeniji, može se zaključiti da je M1 najkonzervativniji i da u evolutivnom smislu nije postignuo gotovo nikakav napredak. U M2 dominantan crtež brazdi je oblika +. Kako crtež brazdi oblika + predstavlja razvojni međuoblik i može se uzeti kao najviši evolutivni stadij oblika Y, tj. kao početak oblika X, taj zub glede evolutivnih procesa spada u prijelaznu razvojnu fazu. Oblik X na M2 nađen je samo u KS, što potvrđuje