

Original Article

Study of antibiotic resistance pattern and incidence of pathogenic genes of *mgtC*, *spi4R*, *agfA*, *invE/A* and *ttrC* in *Salmonella infantis* isolated from clinical specimens

Aghdasi-Araghinezhad R, Amini K*

Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, I. R. Iran.

Received November 13, 2016; Accepted May 29, 2017

Abstract:

Background: The importance of the health of red meat, poultry and eggs in human nutrition is very high. One of the factors that jeopardize the health of poultry food products is the bacterial family of *Enterobacteriaceae*, especially *Salmonella*. The aim of this study was to detect pathogenic genes in *Salmonella* infectious bacteria isolated from stool specimens using the multiple PCR assay.

Materials and Methods: Selective and specific media for isolation of *Salmonella* were used. Primary isolation was carried out using Peptone water, Rapaport, selenite cysteine, MacConky agar and xylose-lysine deoxycholate agar. To confirm the diagnosis, biochemical tests including TSI, urea, endodontic, and citrate were used. The *Salmonella* Polyvalent Kit was used to determine *Salmonella* groups and *mgtC*, *spi4R*, *agfA*, *invE/A* and *ttrC* genes were studied in 60 samples by the multiple PCR method.

Results: The results showed that all samples had 2 genes *mgtC* and *ttrC*, and none of the samples showed resistance to cefepime. Of the 60 samples of *Salmonella*, none were resistant to cefepime and ceftriaxone; 38.8% of the samples were resistant to amoxicillin, 53% to erythromycin and 38.3% to sulfamethoxazole.

Conclusion: It can be concluded that cefepime is the best selective drug for the treatment of *Salmonella* infections. Identification and validation of genes in the region's bacteria can play a role in the broad epidemiological examination, antibiotic resistance, vaccine production, level of virulence, prevention and treatment. Also, evaluation of these genes in the samples for their virulence index is very important.

Keywords: *Salmonella infantis*, Pathogenic genes, Antibiotic resistance, Multiple PCR

* Corresponding Author.

Email: dr_kumarss_amini@yahoo.com

Tel: 0098 912 545 4074

Fax: 0098 8642 241 511

Conflict of Interests: No

Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, December, 2017; Vol. 21, No 5, Pages 442-449

Please cite this article as: Aghdasi-Araghinezhad R, Amini K. Study of antibiotic resistance pattern and incidence of pathogenic genes of *mgtC*, *spi4R*, *agfA*, *invE/A* and *ttrC* in *Salmonella infantis* isolated from clinical specimens. *Feyz* 2017; 21(5): 442-9.

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و بروز ژن‌های بیماری‌زا در باکتری سالمونلا اینفنتیس جدا شده از نمونه‌های بالینی *agfA*, *spi4R*, *mgtC*, *ttrC* و *invE/A*

رویا اقدسی عراقی‌نژاد^۱، کیومرث امینی^{۲*}

خلاصه:

سابقه و هدف: اهمیت سلامت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در تغذیه انسان بسیار زیاد است. یکی از علی که سلامت فرآورده‌های غذایی طیور را به مخاطره می‌اندازد باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه به ویژه سالمونلا می‌باشد. هدف از این تحقیق شناسایی ژن‌های بیماری‌زا در باکتری‌های سالمونلا اینفنتیس جدا شده از نمونه‌های مدفعه با روش PCR چندگانه بود.

مواد و روش‌ها: از محیط‌های پیش‌اختبایی و اختصاصی برای جداسازی سالمونلا استفاده شد. به منظور جداسازی اولیه از محیط‌های آب پیتوئه، ریابیورت، سلنتیت میستین، مک‌کانگی آگار و XLD استفاده شد. جهت تأیید تشخیص از تست‌های بیوشیمیایی شامل TSI، اوره، اندول و سیترات، و حرکت استفاده گردید. برای تعیین گروه سالمونلای جدا شده، از کیت پلی‌والان سالمونلا استفاده شد و ژن‌های

بررسی *agfA*, *spi4R*, *mgtC*, *invE/A* در ۶۰ نمونه مورد مطالعه با روش PCR چندگانه بود.

نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که تمام نمونه‌ها دارای ۲ ژن *mgtC* و *ttrC* بوده و هیچکدام از نمونه‌ها مقاومتی نسبت به سفپیم نشان ندادند. از مجموع ۶۰ نمونه سالمونلا، هیچ کدام به سفپیم و سفتریاکسون مقاوم نبودند، ۳۸/۸ درصد آن‌ها به آموکسیسیلین، ۵۳ درصد به اریتروماسین و ۳۸/۳ درصد به سولفامتوکسازول مقاومت نشان دادند.

نتیجه‌گیری: در مجموع می‌توان گفت سفپیم به عنوان بهترین داروی انتخابی برای درمان ابتلا به سالمونلا اینفنتیس می‌باشد. شناسایی و تایید ژن‌ها در باکتری‌های منطقه می‌تواند در بررسی اپیدمیولوژیکی وسیع، مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی، تولید واکسن، میزان حدت، پیشگیری و درمان نقش داشته و بررسی این ژن‌ها در نمونه‌ها به دلیل فراوانی شاخص حدت بسیار اهمیت دارد.

وازگان کلیدی: سالمونلا اینفنتیس، ژن‌های بیماری‌زا، مقاومت آنتی‌بیوتیکی، PCR چندگانه

دو ماهنامه علمی- پژوهشی فیض، دوره پیست و یکم، شماره ۵، آذر و دی ۱۳۹۶، صفحات ۴۴۲-۴۴۹

مقدمه

علی‌رغم پیچیدگی خانواده انتروباکتریاسه، کمتر از ۲۰ جنس آن‌ها عامل بیش از ۹۵ درصد از عفونت‌های ایجاد شده می‌باشند. برخی از اعضای این خانواده علاوه بر اینکه فلور طبیعی روده انسان و حیوانات می‌باشند، به طور گسترده از آب، خاک، و سبزی‌ها جدا می‌گردند، و همچنین بعضی از اعضای این خانواده بیماری‌زا بوده و بعضی دیگر عامل عفونت فرست طلب می‌باشند. در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از عفونت‌های خون، بیش از ۷۰ درصد از عفونت‌های مجاری ادراری و بسیاری از عفونت‌های روده‌ای در اثر آلودگی به باکتری‌های این خانواده ایجاد می‌شوند.

^۱ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

^۲ استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

* لشان ذیسنه مسلمل:

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی
تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۴۰۷۴ - ۰۸۶۴۲۲۴۱۵۱۱

پست الکترونیک: dr_kumarss_amini@yahoo.com

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۶/۳/۸ تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۳

عفونت‌های ایجاد شده توسط باکتری‌های خانواده انتروباکتریاسه می‌توانند از یک مخزن حیوانی مانند اغلب گونه‌های سالمونلا و یرسینیا، یک ناقل انسانی مانند گونه‌های شیگلا و سالمونلا و نیز از انتشار درونی ارگانیسم در بیماران مستعد مانند اشریشیاکلی متشه گرفته و در واقع می‌توانند هر جایی از بدن انسان و حیوان را در گیر نمایند [۱]. روش‌های مولکولی آن‌هایی که به طور وسیع در مطالعات اپیدمیولوژیک سالمونلایها استفاده می‌گردد عبارتند از: پلاسمید تایپینگ، ریبوتاپینگ، RCCS تایپینگ، انگشت‌نگاری AFLP و اخیراً انگشت‌نگاری‌های IS200 و PFGE عناصر پیشرفت‌های اخیر در روش‌های مولکولی شناسایی ژن‌ها این امکان را فراهم نموده است تا بتوان باکتری‌ها را براساس خصوصیات ژنتیکی دسته‌بندی کرد. روش‌های مولکولی بر مبنای DNA پلاسمیدی و شناسایی ژن‌های حدت پلاسمیدی جهت تفرقی سویه‌های سالمونلا به کار می‌آیند. در یک تحقیق مشابه نیز از روش PCR چندگانه جهت تعیین هویت سالمونلا تیفی‌موریوم و سالمونلا انتریتیدیس و تعیین ژن‌های پلاسمیدی حدت (SPV) استفاده شده است [۲]. روش‌های متداول تشخیص سالمونلا بین ۳ الی ۵ روز وقت می‌گیرد و امروز سعی بر این است که از روش‌های سریع اما حساس و با ویژگی بالا استفاده شود. آزمایشات

جدازی و تأیید بیوشیمیا پی سالمونلا

همه ایزوله‌ها توسط روش‌های متداول بیوشیمیابی و میکروسکوپی شناسایی شدند (جدول شماره ۱)؛ بدین ترتیب که ابتدا نمونه‌ها روی محیط‌های کشت انتخابی سالمونلا-شیگلا آگار انتقال یافته و پس از ۲۴ ساعت گرمخانه‌گذاری در 37°C از روی آگوچست برین‌هارت روی ژلوز لوریا برتانی (LB) به صورت خطی جهت به دست آوردن کلونی منفرد کشت داده شد و در نهایت حفظ کارهای، موکول، استفاده شدند.

جدول شماره ۱ - خصوصیات بیوشیمیایی سالمونلا

نوع تست	نتیجه تست	نوع تست	نتیجه تست	نوع تست
اندول	-	لیزین	لیزین	+
سیترات	+	مانیتول	مانیتول	+
اورنیتین	+	سوکروز	سوکروز	-
vp	-	گلوکوز	گلوکوز	+
TSI	k/gas	لاکتوز	لاکتوز	-
H2S	+	اوره آز	اوره آز	-
ONPG	-	MR	MR	+

مراحل جداسازی باکتری‌ها از نمونه‌های محیطی و بالیتی از نمونه‌های انتقال داده شده به آزمایشگاه در زیر هود و در کنار شعله با رعایت اصول استریل بودن، در محیط غنی کننده راپاپورت واسیلیادیس (Rappaport Vassiliadis) کشت انجام شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷°C انکوبه گردید. پس از گذشت زمان مورد نظر با استفاده از لوپ در محیط‌های انتخابی-افترافقی، سالمونلا-شیگلا آگار، کروم-آگار سالمونلا، رامباخ و XLD به صورت خطی کشت انجام شد. بعد از گذشت ۲۴ ساعت از پرگنه‌های سیاه رنگ به محیط‌های بیوشیمیابی نظری TSI، اوره، سیمون سیترات، آبگوشت MR-VP و محیط SIM انتقال صورت گرفت. بعد از تأیید بیوشیمیابی باکتری سالمونلا، در ادامه با روش استاندارد آگلوتیناسیون و استفاده از آنتی سرم‌های اختصاصی O و H با دستورالعمل مربوطه، سرووار باکتری تعیین شده و نیز به-وسله PCR جندگانه سالمونلا / انفتکس، تأیید شد [۶,۴].

تعیین حساسیت آتنی بیوتیکی به روش دیسکدیفیوژن از مایش دیسکدیفیوژن که روش کربی با تئر نیز نامیده می‌شود، از سال ۱۹۶۶ در آزمایشگاهها به طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اغلب آزمایشگاه‌ها برای تعیین حساسیت آتنی بیوتیکی از این روش و بر اساس استانداردهای NCCLS استفاده می‌کنند. عوامل اصلی این آزمایش عبارتند از دیسک‌های حاوی آتنی به تک، محیط کشت مناسب و سه سانسیونه باکتری‌پاک، که هر آتنی به تک، محیط کشت مناسب و سه سانسیونه باکتری‌پاک، که هر

PCR متنوعی جهت تشخیص سریع سالمونلاها در نمونه‌های بالینی و مواد غذایی استفاده شده است. PCR چندگانه علاوه بر حساسیت بالا در تشخیص سالمونلا در نمونه مدفعی، نیاز به نمونه کمتر داشته و ۲۴ ساعت پس از دریافت نمونه قابل پاسخ‌دهی می‌باشد [۴,۲]. ژن‌های هدف در PCR سالمونلاها بسیار متنوع هستند و در مطالعات زیادی ارزیابی شده‌اند. در این میان می‌توان ژن ST141 با قطعه افزوده‌سازی *invA* و آغازگرهای آن، ST139 و شده ۲۸۴ bp را نام برد. همچنین، ژن *oriC* و ژن *agfA* که شده ۳۹۴ و ۱۶۳ bp را به ترتیب افزوده‌سازی می‌کنند. همین قطعات طور ژن *OmpC* که پروتئین *OmpC* را در غشاء سیتوپلاسمیک کد می‌کند و دو آغازگر ۱۸ و ۱۹ S با قطعه ۱۵۹ bp، و ژن *fimA* که ژن مربوط به فیبریه می‌باشد و قطعه ۸۵ bp را افزوده می‌نماید. همچنین، ژن‌های *invE*, *fimW*, *fimY*, *fimZ*, *invE* و *invA* آزمایش قرار گرفته‌اند [۵,۲]. لزوم این تحقیق شناسایی ژن‌های *ttrC*, *invE/A*, *agfA*, *spi4R*, *mgtC* سالمونلا /ینفتیس از نمونه‌های بالینی مدفعی با روش PCR چندگانه بوده تا بدین‌گونه مقاومت این باکتری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مورد نظر آزمایش قرار گرفته‌اند [۵,۲]. از جمله ژن‌های ویرولانس می‌توان به *ttrC*, *invA*, *agfA*, *spi4R*, *mgtC* در جنس سالمونلا اشاره کرد. این ژن‌ها پروتئین‌هایی را کد می‌کنند که در مقابله با سیستم ایمنی، کمپلمان مرگ داخل سلولی نقش دارند. عنصر ژنتیکی مهم دیگری که نقش اساسی در پاتوژن این باکتری دارد، جزایر پاتوژنیستی سالمونلاها به نام SPIs می‌باشد که واسطه تهاجم اولیه به مخاط روده است. ژن *spi4R* برای بقای درون ماکروفاژها و ترشح توکسین نقش اساسی دارد. گروهی از ژن‌ها تحت عنوان *invA* وجود دارند که در ورود سالمونلا به سلول‌های اپی‌تیال نقش ایفا می‌کنند. این جزایر هم از نظر اندازه و هم از نظر محتوى ژنی بسیار مهم هستند [۲]. هدف از انجام این تحقیق شناسایی ژن‌های *ttrC*, *invE/A*, *agfA*, *spi4R*, *mgtC* سالمونلا /ینفتیس از نمونه‌های بالینی مدفعی با روش PCR چندگانه می‌باشد.

مواد و روش‌ها

در این پژوهش مقطعی-توصیفی تعداد ۶۰ نمونه از نمونه‌های انسانی از بیمارستان امام خمینی (ره) تهران در ظروف استریل مخصوص جمع‌آوری و کدگذاری گردیده و با رعایت کلیه نکات حمل و نقل نمونه‌های عفونی، به آزمایشگاه گروه میکروب شناسی، یاسار، گاد منتقل شد.

تهیه گردد. پس از گذشت ۲۰-۳۰ دقیقه، ۲۵ میکرولیتر محلول تریس ۱ مولار به محلول فوق اضافه گردید تا عمل هضم باکتری توسط NaOH متوقف گردد و محلول با pH نهایی ۷/۵ تهیه شود. بل拉斯له با افزودن ۴۵۰ میکرولیتر آب مقطر استریل، حجم محلول به ۵۰۰ میکرولیتر رسیده و رفت نهایی از عصاره DNA جهت انجام آزمایش PCR آماده گردید.

آغازگرها (پرایمرها)

پرایمر الیگونوکلئوتیدی اساسی ترین عامل موثر بر راندمان و اختصاصی شدن واکنش PCR می‌باشد. طراحی دقیق پرایمر برای به دست آوردن محصولات مورد نظر در مقادیر مطلوب و جلوگیری از تکثیر توالی‌های غیراختصاصی ضروری است. معمولاً ۰/۱ M پرایمر در هو واکنش مورد نیاز است (جدول شماره ۲).

جدول شماره ۲- پرایمرها و سویه‌های استاندارد به کار رفته در PCR ژن‌های مورد مطالعه [۷]

پرایمر	سکانس پرایمر (از ۵ به ۳*)
<i>InvE/A</i> (500 bp)	F:TGCCTACAAGCATGAAATGG / R:AAACTGGACCACGGTACAA
<i>ttrC</i> (920 bp)	F:GTGGGCGGTACAATATTTCTTTT / R:TCACGAATAATACTAGTAGCGC
<i>mgtC</i> (655 bp)	F:TGACTATCAATGCTCCAGTGAAT / R:ATTACTGGCCGTATGCTGTTG
<i>spi4R</i> (1269 bp)	F:GAATAGAAGACAAAGCGATCATC / R:GCTTGTCCACGCCTTCATC
<i>agfA</i> (261 bp)	F:TCCGGCCCGGACTCAACG / R:CAGCGGGCGTTATACCG

۳/۸ درصد آنها به آموکسیسیلین، ۵۳ درصد به اریتروماسین و ۳/۳ درصد به سولفامتوکسازول مقاومت نشان دادند (جدول شماره ۳). امروزه افزایش به مقاومت آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها یک معضل جهانی است که در اثر مصرف بی‌رویه و روزافرون داروها اتفاق افتاده و متأسفانه کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. نتیجه آزمایش PCR چندگانه جهت شناسایی ژن‌های *spi4R*, *mgtC*, *invE/A*, *ttrC* و *agfA* نشان داد که تمام نمونه‌ها دارای ژن‌های *spi4R* و *ttrC* بوده و ژن *invE/A* در هیچ‌کدام از ایزوگلهای یافت نشد (شکل‌های شماره ۱ و ۲).

جدول شماره ۳- نتایج دیسک دیفیوژن بر حسب تعداد نمونه (I: intermediate S: sensitive R: resistance)

(R) Mm	(I) Mm	(S) Mm	آنتی‌بیوتیک‌ها
۲۲	.	۲۸	اریتروماسین
۱۰	.	۵۰	سولفامتوکسازول
۲۳	.	۳۷	آموکسیسیلین
.	.	۶۰	سفپیم
.	۸	۵۲	سفتریاکسون

یک از موارد فوق بایستی مطابق با معیارهای NCCLS فراهم شوند [۶]. آزمایشات صورت گرفته با روش دیسک دیفیوژن برای ایزوگلهای سالمونلا/ینفتیس با استفاده از ۵ دیسک آنتی‌بیوتیکی تهیه شده از شرکت پادتن طب که شامل: اریتروماسین، سفپیم، سفتریاکسون، سولفامتوکسازول و آموکسیسیلین بود، انجام گردید.

استخراج DNA از باکتری‌ها


برای استخراج DNA در این پژوهش از روش لیز NaOH نیم‌نرمال استفاده گردید؛ بدین صورت که ابتدا از ذخیره باکتری‌ای پس از خروج از حالت انجاماد در محیط کشت لوریا-برتانی براث به مدت ۱۸-۲۴ ساعت کشت داده شد. سپس، از محیط کشت یک کلونی انتخاب شده و به میکروب‌های ۷۰۰ میکرو-لیتری حاوی ۲۵ میکرولیتر NaOH نیم‌نرمال اضافه گردید تا شیرابه

جدول شماره ۲- پرایمرها و سویه‌های استاندارد به کار رفته در PCR ژن‌های مورد مطالعه [۷]


الکتروفورز و آنالیز محصولات PCR آمپلیکون‌ها یا فرآوردهای حاصل از واکنش PCR شامل میلیون‌ها قطعه از DNA مورد هدف است که به طور طبیعی وجود طول مشخصی در ناحیه بین دو پرایمر می‌باشد. یکی از روش‌های شناسایی محصولات PCR الکتروفورز روی ژل آگاروز است [۶].

نتایج

بعد از کشت دادن نمونه‌های جمع‌آوری شده، در نهایت نمونه‌های آلووده به باکتری سالمونلا براساس آزمون‌های بیوشیمیابی جداسازی گردید. پس از کشت‌های اولیه به منظور بالا بردن دقت از تست‌های بیوشیمیابی استفاده شد که تست‌های بیوشیمیابی مورد استفاده ما شامل سیترات، تست TSI، تست SIM، MR/VP و اوره بودند (جدول شماره ۱). اغلب آزمایشگاه‌ها برای تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی از روش دیسک دیفیوژن براساس استاندارد NCCLS استفاده می‌کنند. همچنان، با توجه به اهمیت مقوله ایجاد مقاومت دارویی، در این مطالعه جدایه‌ها از نظر مقاومت دارویی مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن به شرح زیر است: از مجموع ۶۰ نمونه سالمونلا، هیچ‌کدام به سفپیم و سفتریاکسون مقاوم نبودند،



شکل شماره ۱- نتایج PCR چندگانه روی ژل از چپ به راست: مارکر (۱۰۰ bp)، کنترل مثبت، کنترل منفی، نمونه‌های ۲۵-۳۶ حاوی ژن *ttrC* و *agfA* دارای ژن *invA* و *mgtC* نمونه ۲۷ می‌باشد.



شکل شماره ۲- نتایج PCR چندگانه روی ژل از چپ به راست: مارکر (۱۰۰ bp)، کنترل مثبت، کنترل منفی، نمونه‌های ۴۹-۶۰ حاوی ژن *ttrC* و *agfA* دارای ژن *invA* و *mgtC* نمونه‌های ۵۲ و ۵۳ و ۶۰ می‌باشد.

بالینی و مواد غذایی استفاده شده است. در اغلب این روش‌ها قبل از انجام PCR یک مرحله غنی‌سازی بهمنظور بالا بردن حساسیت آزمایش پیشنهاد گردیده است. سروتاپی‌های سالمونولا از جمله سروتاپی اینفتیسیس جزء رایج ترین سروتاپی‌ها در اکثر نقاط جهان از جمله ایران است. این سروتاپی طی زمان دچار تغییرات ژنتیکی شده و از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف دارای ویژگی‌های زنو-تیپی متفاوت می‌باشد. بنابراین، ژنوتاپینگ دقیق این سروتاپ، اطلاعات زیادی در مورد اپیدیمیولوژی و شناسایی منابع عفونت آن در اختیار قرار می‌دهد [۹]. محققین مجارتانی در سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۴ سویه سالمونولا/اینفتیسیس از نمونه‌های مدفوع انسان و ۱۸۲ سویه از نمونه‌های مدفوع جوجه‌ها جدا کردند و در این مطالعه نیز این سروتاپ از فراوانی بیشتری برخوردار بود. بیشترین میزان مقاومت دارویی نیز مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های استرپتومایسین، فوراژولیدون، نالیدیکسیک اسید، تتراسایکلین، لینکواپیکتین، فلومکوئین و سولفامتوکسازول تری‌متیپریم بود [۱۰]. زهرانی و همکاران (۱۳۸۲) با استفاده از PCR ساده به بررسی حضور ژن *spi4D* در سروتاپ‌های متفاوت سالمونولا پرداخته و عنوان کردند

بحث

سالمونلوز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های عفونی است که گسترش جهانی داشته و در انسان و گونه‌های مختلف حیوانات به صورت بیماری‌های متفاوتی ظاهر می‌گردد. دو سرووار شایع این باکتری در حیوانات و انسان سالمونولا اتریتیدیس و تیفیموریوم می‌باشد [۶]. Morshed و همکاران در سال ۲۰۱۱ بالاترین مقاومت جدایه‌ها را نسبت به آمپیسیلین، آموکسی‌کلارو و سولفو-متوكسازول، تتراسایکلین و کلرامفینیکل گزارش کردند. بیشترین مقاومت نسبت به سولفومتوکسازول گزارش شده که با نتایج این تحقیق مطابقت ندارد. دلایل این اختلاف می‌تواند به تفاوت در نوع سویه‌ها، زمان نمونه‌گیری و میزان شیوع پلاسمیدهای حاوی ژن‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی مرتبط باشد [۸]. Ross و همکاران با انجام روش PCR روی ایزووله‌های سالمونولا تیفیموریوم جدا شده طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ از بچه‌خوک‌های دارای اسهال نشان دادند که همه ایزووله‌ها دارای ژن *invA* بوده و فقط ۱۴ درصد از ایزووله‌ها دارای ژن *ttrC* می‌باشد [۹]. آزمایشات PCR متنوعی جهت تشخیص سریع سالمونولاها در نمونه‌های

می‌گردد [۱۵]. همچنین، به وسیله ایجاد جهش در ژن‌های سکانس *ttrC* صفت ایجاد حدت در سالمونولا تیفی موریوم به اثبات رسیده است. قسمت *BttrC* از پلاسمید حدت این توانایی را دارد که همانند یک *ttrC* کامل و دست‌غخوردۀ باعث ایجاد عفونت سیستمیک به واسطه سالمونولا تیفی موریوم در موش‌های BALB/C بعد از ایجاد عفونت به شکل زیرپوستی گردد [۱۶، ۱۷]. در مطالعه‌ای که Chiu و همکاران (۲۰۰۲) روی سویه‌های جدا شده سالمونولا تیفی موریوم و انتریتیدیس انجام دادند، نشان دادند که PCR چندگانه در شناخت ایزوله‌های سالمونلای دارای مقاومت چندگانه به خصوص سالمونولا تیفی موریوم نوع ACSSUT و همچنین در شناسایی توزیع ژن بتالاکتاماز در بین ایزوله‌های سالمونلا بسیار سودمند است. در این روش از سه جفت پرایمر *blaPSE-1*, *cmlA/tetR* و *blaTEM* و یک جفت پرایمر مربوط به ژن *sipB/C* که ژن ویژه چنس سالمونولا است، استفاده گردید [۱۸]. بیان شده است که سن، ژنتیک و محیط فاکتورهای اصلی در میزان حدت باکتری بوده و پلاسمیدهای حدت و یا فاکتورهای حدت به طور مستقیم دخالتی در واکنش بین میزان و باکتری ندارند، اما اغلب این ژن‌ها پروتئین‌هایی را کد می‌نمایند که در واکنش بین میزان و باکتری دخالت نموده و این پروتئین‌های تأثیرگذار نقش مهمی در بقاء و تکثیر سالمونولا دارند [۱۹]. Chashni و همکاران با انجام PCR چندگانه روی ۱۱۲۵ نمونه جدا شده از جوجه‌های خانگی نشان دادند که ۵۵/۵ درصد از نمونه‌ها سالمونلا انتریتیدیس و ۲۲/۲ درصد سالمونولا تیفی موریوم هستند. تمام سروتیپ‌های سالمونولا تیفی موریوم برای چهار ژن *rfbj* (پادگن O), *fliC* (پادگن H1)، *fliB* (پادگن H2) و *invA* (تهاجم) مثبت بودند. همچنین، تمام سروتیپ‌های سالمونلا انتریتیدیس برای ژن‌های *spi* و *SefA* (انتروتوکسین) مثبت بودند. ایشان نتیجه گرفتند که دقت و حساسیت روش مذکور آن را به یک ابزار ارزشمند برای تعیین گونه‌های سالمونولا تبدیل کرده است [۲۰]. اینی و همکاران نیز از روش PCR چندگانه برای تعیین و شناسایی هم‌زمان ژن‌های *inv* و *ttrC* و از روش PCR ساده برای تعیین ژن‌های *mgtC* و *A* در سالمونولا انتریتیدیس استفاده کردند. آنالیز نمونه‌ها نشان داد که ژن‌های *ttrC* و *mgtC* در ۹۰ درصد از سالمونولا انتریتیدیس‌های جدا شده از منابع انسانی و ۱۰۰ درصد گونه‌های جدا شده از منابع گاوی وجود دارد [۲۱]. مقایسه نتیجه تحقیق اینی با تحقیق حاضر در ارتباط با میزان شیوع ژن‌های *ttrC* و *mgtC* و *inv A* نشان از شیوع بالای این ژن‌ها در گونه‌های سالمونولا/ینفنتیس و انتریتیدیس می‌باشد. برخلاف نتایج حاصل از

که از این ژن می‌توان در شناسایی سویه‌های مختلف سالمونولا استفاده کرد [۱۱]. اما با توجه به نتیجه تحقیق ما ژن مذکور نمی‌تواند دارای حساسیت و ویژگی مناسب جهت تشخیص این باکتری باشد. محققین با افزوده‌سازی PCR ژن *InVA* در ۶۰ جدایه سالمونولا، حضور قطعه ۲۸۴ bp این ژن را در تمام جدایه‌ها مورد تأیید قرار دادند و استفاده از این روش را که کمتر از ۱۲ ساعت زمان نیاز دارد، در جهت تشخیص جنس سالمونولا توصیه نمودند. همچنین، در دیگر مطالعات با افزوده‌سازی PCR ژن *OmpC* در ۲۰۰ نمونه مدفعه گاو اخذ شده از نقاط مختلف ایران و نیز ۲۵ جدایه‌های بالینی سالمونولا، حضور قطعه ۱۵۹ bp این ژن تأیید شده و تعیین ژن *OmpC* با روش PCR به دنبال غنی‌سازی مدفعه روش مناسبی جهت جستجوی سالمونولا در نمونه‌های مدفعه نشان داده است [۱۱، ۳، ۲]. در مصر طی سال ۲۰۰۹ از مجموع ۱۴۱ ایزوله سالمونولا جدا شده از نمونه‌های مواد غذایی ۸۱ ایزوله مربوط به سالمونولا/ینفنتیس بود که نسبت به سایر سروتیپ‌های سالمونولا بیشترین موارد جدا شده از نمونه‌های مواد غذایی بود. همچنین، در سال ۲۰۰۳ در آرژانتین، سالمونولا اشتریکا سرووار اینفنتیس دومین عامل شایع در میان سروتیپ‌های سالمونولا در میان کودکان بستری شده در بیمارستان بوده است [۱۲]. در یک مطالعه که به جستجوی سروتیپ سالمونولا/ینفنتیس با استفاده از PCR در بین جدایه‌های گروه C سالمونلا طبور و تعیین الگوی مقاومت دارویی جدایه‌ها پرداخته است، همه جدایه‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های فلوروفنیکل و دانوفلوکسازین حساس بوده و کمترین مقاومت دارویی به آنتی‌بیوتیک‌های لووفلوکسازین، سفتازیدیم، سفترياکسون و نورفلوکسازین مربوط می‌شده که با نتایج به دست آمده در مطالعه ما هم خوانی دارد [۱۳]. داشتمدان به‌منظور ارائه یک روش اختصاصی و سریع برای شناسایی سالمونولا انتریتیدیس و سایر سروتیپ‌های واجد پلاسمید حدت از روش *spi4R* PCR چندگانه با استفاده از آغازگرهای مربوط به ژن‌های *invA* و *invA* که به ترتیب قطعات ۲۴۴ و ۵۷۱ bp را افزوده‌سازی می‌نمایند، استفاده کردند. در این روش سروتیپ‌های واجد پلاسمید حدت نظیر سالمونولا تیفی موریوم، سالمونولا انتریتیدیس، سالمونولا کلاراسوئیس، سالمونولا دابلین و سالمونولا سنتائی دو قطعه و سالمونولا‌های قادر پلاسمید حدت تنها یک قطعه مربوط به ژن *invA* را مشخص کردند [۱۴]. عنوان شده است که در عفونت‌های سیستمیک سالمونولا تیفی موریوم ژن‌های حدت یا پلاسمید حدت باعث تکثیر و افزایش باکتری‌ها در سیستم ریتیکولاندوتلیال و ماقروفاژها شده و حذف ژن‌های *ttrC* باعث کاهش میزان حدت

لوژیکی وسیع، مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی، تولید واکسن، میزان حدت، پیشگیری و درمان نقش داشته و بررسی این ژن‌ها در نمونه‌ها بهدلیل شاخص حدت بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

تشکر و قدردانی

از کلیه عزیزانی که در مراحل مختلف انجام این پژوهش ما را یاری نمودند کمال قدردانی را به عمل آورده و مراتب سپاسگزاری فراوان خود را از مسئول محترم آزمایشگاه میکروب شناسی و آزمایشگاه تحقیقاتی پاسارگاد جناب آقای مهندس مقدم، اعلام می‌داریم.

References:

- [1] Wannaprasat W, Padungtod P, Chuanchuen R. Class 1 integrons and virulence genes in *Salmonella enterica* isolates from pork and humans. *Int J Antimicrob Agents* 2011; 37(5): 457-61.
- [2] Naghly B, MoghadasPour, Majidpour A, Pahlevanzdeh H. Evaluation of different strains of *Salmonella* to antibiotics, infectious diseases, tropical Conference, Tehran, December database computer Congresses, Research Department of the Ministry of Health, Treatment Med Education 3rd ed. 1990; 647-8. [in Persian]
- [3] Madadgar Omid, molecular identification of *Salmonella* isolates to electrophoresis in alternating electric field, Dissertation in Microbiology. Tehran. Faculty of Vet Med University. 1998. [in Persian]
- [4] Hojati P, Isolation and identification of *Salmonella* poultry ERic-PCR and serological methods, Dissertation of Poultry Veterinary. Tehran. Science and Research Azad University. 1997. [in Persian]
- [5] Hudson CR, Garcia M, Gast RK, Maurer JJ. Determination of close genetic relatedness of the major *Salmonella enteritidis* phage types by pulsed-field gel electrophoresis and DNA sequence analysis of several *Salmonella* virulence genes. *Avian Dis* 2001; 45(4): 875-86.
- [6] Mahon CR, Lehman DC, Manuselis G. Textbook of Diagnostic Microbiology-E-Book: Elsevier Health Sciences; 2014. P. 450-720
- [7] Soto SM, Rodríguez I, Rodicio MR, Vila J, Mendoza MC. Detection of virulence determinants in clinical strains of *Salmonella enterica* serovar Enteritidis and mapping on macrorestriction profiles. *J Med Microbiol* 2006; 55(4): 365-73.
- [8] Morshed R, Peighambari SM. *Salmonella* infections in poultry flocks in the vicinity of Tehran. *Iran J Vet Med* 2010; 4(4): 273-6. [in Persian]
- [9] Ross IL, Heuzenroeder MW. A comparison of three molecular typing methods for the discrimination of *Salmonella enterica* serovar Infantis. *FEMS Immunol Med Microbiol* 2008; 53(3): 375-84.
- [10] NÓGRÁDY N, Kardos G, Bisták A, Turcsányi I, Mészáros J, Galántai Z, et al. Prevalence and characterization of *Salmonella infantis* isolates originating from different points of the broiler chicken-human food chain in Hungary. *Int J Food Microbiol* 2008; 127(1): 162-7.
- [11] Zahraei Salehi MT, Study of the antigenic *Salmonella typhimurium* and use it to detect and track infections caused by this bacterium. Dissertation. Tehran University. 1995. [in Persian]
- [12] Ahmed A, Ishida Y, Shimamoto T. Molecular characterization of antimicrobial resistance in *Salmonella* isolated from animals in Japan. *J Appl Microbiol* 2009; 106(2): 402-9.
- [13] Aviv G, Tsypa K, Steck N, Salmon-Divon M, Cornelius A, Rahav G, et al. A unique megaplasmid contributes to stress tolerance and pathogenicity of an emergent *Salmonella enterica* serovar Infantis strain. *Environ Microbiol* 2014; 16(4): 977-94.
- [14] Shanmugasamy M, Velayutham T, Rajeswar J. InvA gene specific PCR for detection of *Salmonella* from broilers. *Vet World* 2011; 4(12): 562-4.
- [15] Matsui H, Kawakami T, Ishikawa S, Danbara H, Gulig PA. Constitutively Expressed phoP Inhibits Mouse-Virulence of *Salmonella typhimurium* in an Spv-Dependent Manner. *Microbiol Immunol* 2000; 44(6): 447-54.
- [16] Reed GH, Kent JO, Wittwer CT. High-resolution DNA melting analysis for simple and efficient molecular diagnostics. 2007.
- [17] Robbe-Saule V, Schaeffer F, Kowarz L, Norel F. Relationships between H-NS, σ S, SpvR and growth phase in the control of spvR, the regulatory gene of the *Salmonella* plasmid virulence operon. *Mol Gen Genet* 1997; 256(4): 333-47.
- [18] Chiu CH, Wu TL, Su LH, Chu C, Chia JH, Kuo AJ, et al. The emergence in Taiwan of fluoroquinolone resistance in *Salmonella enterica*

این مطالعه، در بررسی سالمونلا تیفی موریوم نشان از تفاوت زیاد در درصد فراوانی ژن‌های *ttrC* و *inv A* در مقایسه با گونه‌های تیفی موریوم و اینفتیس می‌باشد.

نتیجه‌گیری

بازدید ژن‌ها در باکتری‌های منطقه می‌تواند در بررسی ایندیکاتور می‌باشد.

- serotype Choleraesuis. *N Engl J Med* 2002; 346(6): 413-9.
- [19] Asten AJ, Dijk JE. Distribution of “classic” virulence factors among *Salmonella* spp. *Pathog Dis* 2005; 44(3): 251-9.
- [20] Chashni S, Hassanzadeh M, Fard M, Mirzaie S. Characterization of the *Salmonella* isolates from backyard chickens in north of Iran, by serotyping, multiplex PCR and antibiotic resistance analysis. *Arch Razi Inst* 2009; 64(2): 77-83.
- [21] Amini K, Salehi TZ, Nikbakht G, Ranjbar R, Amini J, Ashrafganjooei SB. Molecular detection of invA and spv virulence genes in *Salmonella enteritidis* isolated from human and animals in Iran. *Afr J Microbiol Res* 2010; 4(21): 2202-10.