

مقاله پژوهشی

مطالعه و ارزیابی استفاده از لنتی ویروس ها به عنوان حامل های انتقال (HDFs) دهنده ژن در سلول های فیbroblast انسانی

مهدی الله بخشیان فارسانی^{۱*}، پیام قاسمی دهکردی^۱، نرگس عبدالیان^۱، سمیه خسروی فارسانی^۱، امین میرزائیان^۲، مسعود نصری^۱، علیرضا کریمی طاقانکی^۳، گشتاسب مردانی^۴، سیده بهشته امیری^۱

مرتضی هاشم زاده چالشتری^{۱*}

^۱ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ ^۲ گروه هماتولوژی و بانک خون، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ ^۳ مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران؛ ^۴ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

تاریخ پذیرش: ۹۲/۰۶/۲۱ تاریخ دریافت: ۹۲/۰۶/۰۸

چکیده:

زمینه و هدف: سلول های بنیادی پرتوان القایی (Induced pluripotent stem cells= iPSCs) سلول های اولیه و تمایز نیافرده ای هستند که قادر به ایجاد تقریباً هر نوع سلولی در بدن می باشند. هدف از پژوهش حاضر تولید و استفاده مؤثر از وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM جهت انتقال ژن ها به سلول های فیbroblast انسانی (Human fibroblast cells= HDFs) و در نهایت ارزیابی عملکرد این وکتور بود.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی پس از جداسازی و کشت سلول های **HDF**، وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM (به عنوان پلاسمید انتقال دهنده) حاوی ژن های برنامه ریزی مجدد همراه با پلاسمیدهای **PMDG2** و **PsPAX2** (به عنوان پلاسمیدهای کمکی لازم برای بسته بنده ویروس) به لاین سلولی **HEK-293T** جهت تولید ویروس ها ترانسفکت شدند. محیط روبی سلول های **HEK-293T** حاوی ویروس های تولید شده پس از ۴۸ و ۷۲ ساعت برداشت شد و این ویروس ها جهت برنامه ریزی مجدد سلول های **HDF** به این سلول ها ترانس داکت گردیدند.

یافته ها: نتایج این مطالعه نشان دهنده تولید موفقیت آمیز وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM، کارایی مؤثر روش انتقال ژن با استفاده از وکتورهای لنتی ویروسی و بیان مناسب فاکتورهای رونویسی در سلول های **HDF** پس از ترانس داکشن بود.

نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها می توان از وکتورهای لنتی ویروسی جهت انتقال ژن و برنامه ریزی مجدد سلول های بالغ از قبیل **HDF** در مطالعات بعدی و تولید سلول های **iPS** استفاده کرد.

واژه های کلیدی: سلول های فیbroblast انسانی، وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM، برنامه ریزی مجدد، سلول های بنیادی پرتوان القایی، RT-PCR.

مقدمه:

که سبب بیان مدام ژن ها در سلول های میزان می شوند. با حذف بخشی از ژن های یماری زا و همچنین ژن های غیر ضروری برای انتقال ژن، وکتورهای لنتی ویرال نسل سوم تولید می شوند که این و مناسب اهداف انتقال ژن های نوترکیب می باشند (۲،۱).

وکتورهای لنتی ویرال قابلیت انتقال ژن های نوترکیب به سلول های در حال تکثیر و سلول های خفتگه دارند. سلول های هدف وکتورهای لنتی ویرال طیف وسیعی

وکتورهای مختلفی جهت انتقال ژن ها در فرآیندهای دستکاری زنتیکی سلول ها مورد استفاده قرار می گیرند. این وکتورها شامل باکتریوفاژها، پلاسمیدها، لنتی ویروس ها، وکتورهای هرپس سیمپلکس و سایر ناقل های انتقال ژن می باشند که نحوه آلووده سازی و وارد شدن آن ها به سلول و همچنین پایداری آنها در سلول میزان با یکدیگر متفاوت می باشد. یکی از مناسب ترین وکتورها برای انتقال و بیان ژن های نوترکیب، وکتورهای لنتی ویرال می باشند

*نوسننه مسئول: شهرکرد- رحمتیه- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی- تلفن: ۰۳۳۴۶۶۹۹۲-۰۳۸۱

رویانی می‌شود می‌توان توانایی تکثیر زیاد و طولانی مدت (۷)، فعالیت بالای تلومراز و آلکالین فسفاتاز (۸)، افزایش بیان در انکوژن‌هایی مانند MYC و KLF4 (۹، ۱۰) و تشابه‌های ساختاری در الگوهای بیان ژن (۱۱-۱۳)، شکل کلونی سلولی و همین طور الگوی اپی ژنتیک این سلول‌ها اشاره کرد (۱۴). به علاوه این سلول‌ها مارکرهای حالت پرتوانی را از جمله مارکرهای سطح سلولی مانند SSEA-3 SSEA-4، TRA-1-81 و TRA-1-60، SOX2 و فاکتورهای رونویسی OCT4 و NANOG بیان می‌کنند (۱۵).

به منظور ایجاد سلول‌های بنیادی پرتوان القابی از سلول‌های سوماتیک بالغین چندین فاکتور رونویسی جهت برنامه ریزی مجدد آن‌ها استفاده می‌شود. وکتورهای لنتی ویرال به دلیل قابلیت درج ژنومی و یکی شدن ماده ژنتیکی آن‌ها (Insertion) در ژنوم سلول هدف قادر خواهند بود برای زمان‌های طولانی ژن نوترکیب را بیان نمایند. همچنین مطالعات مختلف نشان دهنده‌ی قابلیت بسیار بالای لنتی ویروس‌ها از نظر درصد سلول‌های ترانس‌داکت شده و میزان بیان ژن‌های انتقال یافته می‌باشد. دو دسته وکتورهای لنتی ویروسی شامل فاکتورهای C-MYC، SOX2، OCT4، Yamanaka و KLF4 (TetO-FUW-OSKM) توسط LIN28 و NANOG، SOX2، OCT4 و همچنین C-MYC، SOX2، OCT3/4، KLF4 و C-MYC به وسیله‌ی Thomson و همکاران جهت برنامه ریزی مجدد سلول‌های سوماتیک انسانی و ایجاد سلول‌های بنیادی پرتوان القابی (iPSC) معرفی و استفاده شده است (۱۶). در مطالعه حاضر کارایی وکتور لنتی ویروسی حاوی ژن‌های OCT3/4، SOX2، KLF4 و C-MYC جهت برنامه ریزی مجدد سلول‌های فیربلاست انسانی جدا شده از نمونه‌های پوست ختنه گاه (Foreskin)، مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش بررسی:

مطالعه حاضر از نوع تجربی بود و با هدف استفاده از وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM و C-MYC حاوی ژن‌های OCT3/4، SOX2، KLF4 و

از سلول‌های از جمله سلول‌های دستگاه اعصاب مرکزی، شبکیه، سلول‌های فیربلاست، سلول‌های عضلات اسکلتی و قلبی، سلول‌های غدد درون ریز، کبدی و همچنین سلول‌های بنیادی مختلف می‌باشند. از این رو تقریباً هر سلولی را می‌توان به شکل مؤثری با استفاده از آن‌ها مورد هدف قرار داد (۴، ۳).

سلول‌های بنیادی پرتوان القابی یا سلول‌های بنیادی (Induced pluripotent stem cells= iPSCs) ابتدایی و تمایز نیافه ای هستند که به صورت بالقوه توانایی تکثیر بالایی دارند و می‌توانند با فعالیت خود نوزایی شان سلول‌های کاملاً شبیه به خود را ایجاد نمایند. با توجه به پتانسیل تمایزی و میزان اولیه بودن، این سلول‌ها قابلیت تبدیل به رده‌های مختلف سلولی را خواهند داشت. این سلول‌ها پس از تمایز می‌توانند وظایف ویژه ای را در بافت‌های مختلف انجام دهند. چنین خصوصیت‌های برجسته‌ای جایگاهی ویژه را به این سلول‌ها در ژن درمانی و درمان‌های احیاء کننده پزشکی، بخشیده است (۳۵). در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در دانش سلول‌های بنیادی با برنامه ریزی مجدد (R erogramming) سلول‌های سوماتیک بالغ و تمایز یافته مانند سلول فیربلاست انسانی (HDF) به یک سلول iPS پذیرفته است. سلول‌های iPS، سلول‌هایی با ویژگی‌های بسیار مشابه با سلول‌های بنیادی روانی (ESCs =Embryonic stem cells= EScs) هستند و در عین حال مشکلات اخلاقی ناشی از تهیه سلول‌های بنیادی روانی را ندارند و همچنین امکان رد پیوند این سلول‌ها توسط سیستم ایمنی میزان به دلیل استفاده از سلول‌های سوماتیک خود فرد که به عنوان منبع تولید سلول‌های پرتوان القابی استفاده شده‌اند، وجود ندارد. از این رو تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القابی انسان یا (human Induced pluripotent stem cells= hiPSCs) انقلاب بزرگی در مطالعات سلول‌های بنیادی بود و استباط دانشمندان را در خصوص چگونگی برنامه ریزی سلولی به شدت تحت تأثیر قرار داد (۶). از جمله خصوصیت‌این سلول‌ها که سبب مشابهت این سلول‌ها با سلول‌های بنیادی

همکاران گرفته شد (۱۷) و صحت اتصال پرایمرها به توالی ژن های مربوطه با استفاده از نرم افزار Oligo و نرم افزار DNASTAR Lasergene 10 (۱۸) مورد بررسی قرار گرفت (جدول شماره ۱).

به منظور برنامه ریزی مجدد سلول های HDF و ارزیابی عملکرد وکتورها، صورت پذیرفت. توالی ژن های C-MYC، SOX2، OCT4 و همچنین ژن GAPDH به عنوان کنترل مثبت RT-PCR ابتدا از سایت NCBI گرفته شد. توالی پرایمر ژن ها از مقاله Takahashi و

جدول شماره ۱: توالی پرایمرهای SOX2، C-MYC، OCT4 و GAPDH جهت تکثیر این ژن ها

نام پرایمر	توالی پرایمر	طول قطعه (bp)
SOX2-F	5'-ACAGATGCAACCGATGCACC-3'	۵۳
SOX2-R	5'-TGGAGTTGTACTGCAGGGCG-3'	
OCT4-F	5'-ACATGCCAACATCAGCTTG-3'	۵۱
OCT4-R	5'-AGAACCATACTCGAACACATCC-3'	
C-MYC-F	5'-GGCTGGAGATGTTGAGAGCAA-3'	۵۲
C-MYC-R	5'-AAAGGAAATCCAGTGGCGC-3'	
GAPDH-F	5'-TTCACCACCATGGAGAGGGC-3'	۵۲
GAPDH-R	5'-CCCTTTGGCTCCACCCCT-3'	

انجام شد و نتایج برش آنژیمی با الکتروفورز بر روی ژل آگارز ۱٪ مشخص گردید. سپس به منظور تهیه پلاسمیدها به مقدار زیاد (Large scale) از کیت QIAGEN Plasmid Maxi Kit(QIAGEN®) طبق پروتکل شرکت سازنده استفاده گردید.

جهت جداسازی سلول های HDF ابتدا نمونه های پوست ختنه گاه (Foreskin) از بیمارستان کاشانی شهرکرد در محیط انتقال (Transfer media) (Transfer media) حاوی DMEM و ۱٪ آنتی بیوتیک پنی سیلین G و استرپتومایسین به آزمایشگاه منتقل گردید. سپس نمونه ها در الکل ۷۰٪ به مدت ۳۰ ثانیه قرار گرفتند و با ۲ PBS تا ۳ بار شستشو و به قطعات کوچکتر برش داده شدند. قطعات پوست بدست آمده را در محلول ۰/۲۵٪ Trypsin-EDTA (Gibco®, آلمان) به مدت ۲۰ دقیقه در ۳۷°C قرار داده و پس از اتمام گرمانخه گذاری (incubation) محیط رویی را خارج و مجدداً ۵ میلی لیتر محلول Trypsin به رسوب اضافه می شود. پس از ۱۵ دقیقه گرمانخه گذاری در انکوباتور در دمای ۳۷°C آنژیم مورد استفاده با FBS خنثی گردید. سوسپانسیون سلولی بدست آمده را پس از ورتكس و

وکتورهای psPAX و pMD2.G از آزمایشگاه Trono و همچنین وکتورهای TetO-FUW-OSKM از Rudolf Jaenisch تهیه گردیدند.

برای تأیید پلاسمیدهای لنتی ویروسی موجود ابتدا توالی هر پلاسمید از سایت Addgene گرفته شد و توسط نرم افزار 10 DNASTAR® Lasergene جایگاه برش آنژیم های محدود کننده مشخص گردید و نقشه برش پلاسمید توسط آنژیم های موجود در آزمایشگاه به دست آمد. در ادامه با استفاده از آنژیم های HindIII، XbaI، BamHI، PvuI، EcoRI، AfIII و PvuII (همگی شرکت فرمانتاس، آلمان) اختصاصی برای هر پلاسمید، عمل برش صورت پذیرفت و محصول هضم آنژیمی هر پلاسمید با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگارز ۱٪ مورد بررسی قرار گرفت.

در مرحله اول ترانسفورماسیون پلاسمیدهای لنتی ویروسی حاوی ژن های مورد نظر با استفاده از کیت T/A Cloning (فرماتاس، آلمان) طبق دستور العمل شرکت سازنده انجام شد. استخراج پلاسمیدها با استفاده از کیت Plasmid Mini Extraction Kit (BIONEER، کره جنوبی) صورت پذیرفت. هضم آنژیمی بر روی پلاسمیدهای TetO-FUW-OSKM،

ترانسفکشن به این ترتیب انجام شد که پس از رسیدن تراکم سلول‌ها به حدود ۸۰٪ محلول رویی سلول‌ها با محیط DMEM فاقد سرم تعویض گردید و به مدت ۲ ساعت در انکوباتور با دمای ۳۷°C حاوی CO₂ قرار داده شد. از آنجایی که TetO-FUW-OSKM فاقد یک Reporter می‌باشد به عنوان گزارشگر کنترل تولید و انتقال GFP می‌باشد به عنوان گزارشگر ترانسفکشن از پلاسمیدهای GFP می‌باشد به عنوان OCT-GFP و TetO-FUW-OSKM به عنوان گزارشگر) هر کدام جداگانه با غلظت mg ۲۲/۵ و از پلاسمیدهای psPAX و pMD2.G با غلظت به ترتیب mg ۱۴/۵ و ۷/۹ mg استفاده شد. سپس جداگانه هر محلول ترانسفکشن با ۱۱۴ میکرولیتر CaCl₂ ۲M در یک فالکون ۱۵ میلی لیتر مخلوط گردید و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد. به محلول فوق ۱۱۶۰ میکرولیتر بافر 2X HBS اضافه و به مدت ۵ دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت و سپس قطره قطره به پلیت حاوی سلول‌های HEK-293T اضافه شد. بعد از ۲۴ ساعت محیط رویی خارج و با محیط جدید DMEM دارای ۱۰٪ FBS جایگزین گردید. همچنین با کمک میکروسکوپ فلورسنت میزان سبز شدن سلول‌هایی که وکتور حاوی ژن به آن‌ها انتقال یافته مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در دو نوبت پس از ۲۴ و ۴۸ ساعت محیط رویی را جمع آوری و سپس با فیلتر ۰/۴۵μm فیلتر کرده و به منظور تغییل کردن ویروس‌ها، با دور G ۶۰۰۰ به مدت ۱/۵ ساعت اولترا سانتریفیوژ انجام گردید.

به منظور بررسی تولید ویروس در محیط رویی سلول‌ها و همچنین تعیین حدودی مقدار پارتیکل‌های HIV AB & Ag (DIA.PRO) طبق دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شد. به منظور ترانس‌داکشن سلول‌های HDF مقدار ۴۰۰×۱۰^۳ سلول را به هر خانه پلیت ۶ خانه اضافه کرده و یک شب در

ارزیابی استفاده از لنتی ویروس‌ها به عنوان حامل‌های انتقال ژن سانتریفیوژ به مدت ۵ دقیقه در دور ۱۲۰۰ rpm کشت DMEM حاوی ۲۰٪ FBS انتقال داده و در انکوباتور ۳۷°C دارای ۵٪ CO₂ قرار داده شد. پس از ۲۴ ساعت میزان چسبندگی و مورفوЛОژی سلول‌های HDF بررسی گردید و گلbul‌های قرمز و همچنین سلول‌های مرده و نچسبیده از محیط رویی خارج گردید و با محیط کشت DMEM حاوی ۱۰٪ FBS جایگزین شد. در نهایت ۴ تا ۵ روز پس از جداسازی، سلول‌ها آماده اولین پاساز شدند.

به منظور تولید ویروس‌های لنتی حاوی ژن‌های مورد نظر جهت برنامه ریزی سلول‌های HDF از سلول‌های لاین HEK-293T (جدا شده از کلیه جنین انسان) به عنوان Packaging cell line استفاده گردید. ابتدا یک ویال از سلول‌های فریز شده HEK-293T از تانک ازت بیرون آورده شد و پس از ذوب، تمامی محیط را به ۱۰ میلی لیتر محیط جدید حاوی ۱۰٪ سرم منتقل و ۵ دقیقه با دور ۱۲۰۰ rpm سانتریفیوژ گردید. سپس رسوب بدست آمده را در ۵ میلی لیتر محیط کشت DMEM حاوی ۱۰٪ FBS منتقل و در انکوباتور CO₂ با دمای ۳۷°C گرمانه گذاری شد. پس از رسیدن سلول‌های HEK-293T به تراکم ۸۰٪ محیط روی سلول‌ها جمع آوری و شستشو با PBS انجام شد. ۲۵۰ میکرولیتر Trypsin/EDTA به فلاسک مربوطه اضافه و پس از جدا شدن سلول‌های مورد نظر، با یک میلی لیتر محیط کامل حاوی FBS فعالیت آنزیم متوقف گردید. پس از سانتریفیوژ با دور ۱۲۰۰ rpm به مدت ۵ دقیقه محیط رویی را خارج و به رسوب حاصله یک میلی لیتر محیط تازه اضافه شد. سلول بدست آمده را به کمک لام نتوبار شمارش کرده و ۸۰۰×۱۰^۳ سلول در هر پلیت ۱۰cm^۲ کشت شد. پس از گذشت ۲ روز و رسیدن تراکم سلولی به ۸۰٪ پلیت آماده ترانسفکت جهت تولید ویروس گردید. برای تهیه ویروس‌های لنتی و انتقال (ترانسفکشن) آنها به سلول‌های هدف از بافر 2X HBS و 2.5M CaCl₂ استفاده شد. مراحل


واکنش PCR از دستگاه Thermal Cycler Astec Co, Ltd: Gene Atlas نهایی ۲۵ میکرولیتر به صورت ۲۰ نانوگرم cDNA الگو، ۲ میلی مولار MgCl₂, ۲۵ پیکومول از هر پرایمر، یک واحد آنزیم DNA پلیمراز Taq و ۲۰۰ میکرو مولار dNTP Mix تکثیر ژن ها شامل یک سیکل حرارتی ۹۵°C به مدت ۵ دقیقه، ۳۰ سیکل تکراری ۹۴°C به مدت ۳۰ ثانیه، ۵۸°C به مدت ۳۰ ثانیه، ۷۲°C به مدت ۳۰ ثانیه و یک سیکل انتهایی ۷۲°C به مدت ۵ دقیقه بود. محصولات RT-PCR به دست آمده، بر روی ژل پلی اکریل آمید ۸٪/۸٪ الکتروفورز و با رنگ آمیزی نیترات نقره مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها:

به منظور تأیید صحت کلنجی های ترانسفورم شده با پلاسمید Colony-PCR از تکنیک TetO-FUW-OSKM استفاده گردید (تصویر شماره ۱).

انکوباتور دارای CO₂ با دمای ۳۷°C قرار داده شد. پس از اینکه تراکم سلولی به ۷۰٪ رسید مقدار ۲۰۰ میکرولیتر از ویروس تولید شده به HDF های کشت داده شده اضافه گردید و به مدت ۸-۱۲ ساعت در انکوباتور دارای CO₂ با دمای ۳۷°C گرمانه گذاری شد. پس از تعویض محیط رویی سلول های HDF، به هر خانه ۲ میلی لیتر محیط DMEM دارای ۱۰٪ FBS افزوده شد.

ارزیابی بیان ژن های وارد شده در سلول های HDF پس از ترانسداکشن ابتدا با تخلیص RNA سلولی و سپس تهیه cDNA و انجام RT-PCR بررسی گردید. تخلیص RNA با استفاده از کیت تخلیص RNX Plus شرکت سیناژن (سیناژن، ایران) صورت پذیرفت. نمونه های RNA بلا فاصله پس از استخراج به فریزر ۷۰°C-جهت نگهداری آن ها تا مراحل بعدی منتقل گردید. برای تهیه cDNA از کیت cDNA Synthesis (Takara, Bio Inc.) Takara Kit شرکت سازنده استفاده شد و نمونه های cDNA با استفاده از تکنیک RT-PCR تکثیر شدند. جهت انجام




تصویر شماره ۱: تصویر قطعات تکثیر شده برای ژن های OCT4 (۵۲ bp), SOX2 (۵۱ bp) و C-MYC (۵۳ bp) بر روی ژل پلی اکریل آمید ۸٪/۸٪ (M: مارکر با سایز ۵۰ bp (ساخت پلاسمید TetO-FUW-OSKM) تولیدی شرکت فرمتوس، آلمان)، Negative Control: نمونه کنترل منفی)

به دست آمد و سپس به کمک اطلاعات بدست آورده تعداد برش هر آنزیم بر روی هر پلاسمید مشخص گردید. نتایج به دست آمده از برش آنژیمی بر روی هر پلاسمید در جدول و تصویر شماره ۲ خلاصه شده است.


انجام هضم آنژیمی جهت تأیید هر نمونه پلاسمید با استفاده از برنامه ۱۰ DNASTAR® Lasergene ابتدا الگوی برش با آنژیم های مختلف بر روی پلاسمیدهای OCT-GFP و pMD2.G qPAX، TetO-FUW-OSKM

مقاله پژوهشی**جدول شماره ۲: تعداد برش های آنزیم های مختلف بر روی هر نمونه پلاسمید**

نام آنزیم	تعداد قطعات به دست آمده	سایز قطعات پس از هضم آنزیمی (bp)	پلاسمید
<i>EcoRI</i>	۲	۸۳۷۶، ۵۰۸۱	TetO-FUW-OSKM (۱۳۴۵۷ bp)
<i>EcoRI</i>	۲	۶۳۳۸، ۴۳۷۴	psPAX (۱۰۷۱۲ bp)
<i>PvuII</i>	۳	۷۵۱۴، ۱۰۴۴، ۲۱۵۴	
<i>XbaI</i>	۲	۴۶۲۹، ۶۰۸۳	
<i>EcoRI</i>	۲	۴۱۵۳، ۱۶۷۱	pMD2.G (۵۸۲۴ bp)
<i>PvuI</i>	۱	۵۸۲۴	
<i>XbaI</i>	۰	فاقد جایگاه برش	
<i>HindIII</i>	۴	۵۸۵۸، ۴۲، ۱۲، ۱۶۳۷	OCT-GFP (۷۵۴۹ bp)
<i>AflIII</i>	۱	۷۵۴۹	
<i>PvuII</i>	۵	۲۶۱۸، ۳۶۰، ۵۹۳، ۱۸۱۸، ۲۱۶۰	
<i>BamHI</i>	۲	۵۵۳۳، ۲۰۱۶	



تصویر شماره ۲: قطعات به دست آمده از هضم آنزیمی پلاسمیدهای تخلیص شده شامل TetO-FUW-OSKM و OCT-GFP و pMD2.G، psPAX بر روی ژل آگارز ۱٪ (M: مارکر یک کیلو جفت بازی ساخت شرکت فرمتوس آلمان)



تصویر شماره ۳: سلول های لاین ۷۲ HEK-293T ساعت پس از ترانسفکت با پلاسمید OCT-GFP در حال تولید ویروس با میکروسکوپ در حالت نور معمولی (A) و فلورسانس (تولید نور سبز رنگ) (B)


جدول شماره ۳: نتایج تست الایزا جهت تأیید ویروس های لنتی تولید شده

نمونه	(Blank)	شاهد	کنترل منفی	کنترل مثبت	کالیبراتور	OCT-GFP	TetO-FUW-OSKM
جذب نوری (OD)	۰/۴۵۰	۰/۸۱۱	۳/۰۲۱	۰/۹۳۴	۳/۰۶۷	۳/۰۷۲	

شاهد (Blank): فاقد هر نوع نمونه یا محلول conjugate و هر معرف تولید کننده رنگ به جز سوبسترا، کنترل منفی: فاقد هر گونه آنتی بادی یا آنتی ژن ویروس، کنترل مثبت: دارای آنتی ژن ویروس، کالیبراتور: حاوی آنتی ژن 24 pba غلاظت حدود ۱۰۰ پیکوگرم در هر میلی لیتر، OCT-GFP و TetO-FUW-OSKM و کنورهای ویروسی تولید شده که در مقایسه با نمونه کنترل مثبت تولید خوبی داشته اند.

سلول های HDF بعد از جداسازی در پاساژ اول جهت برنامه ریزی مجدد مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تولید موفق ویروس های OCT-GFP و TetO-FUW-OSKM، سلول های HDF توسط ویروس های تولید شده آلوده گردید (تصویر شماره ۴) و پس از ۴۸ ساعت با جداسازی RNA و تولید cDNA، تکثیر ژن های مورد نظر به روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت (تصویر شماره ۵).

به منظور تولید وکنورهای ویروسی لنتی از لاین HEK-293T استفاده شد که تصویر شماره ۳ نشان دهنده وکنور OCT-GFP حاوی ژن GFP به عنوان گزارشگر (تولید نور سبز) و ترانسفکشن موققیت آمیز جهت تولید ویروس های لنتی می باشد و ۷۰-۸۰٪ این سلول ها تولید ویروس را نشان دادند. تعیین تیتر و تأیید ویروس های تولید شده توسط تست الایزا انجام شد. نتایج جدول شماره ۳ نشان می دهد که ویروس با تیتر بالا تولید شده است.



تصویر شماره ۴: سلول های HDF پس از پاساژ اول (راست) و پس از ترانسداکشن با پلاسمید OCT-GFP حاوی ژن فلورسانت (چپ)

نام ژن	Tranducted HDF	کنترل منفی
SOX ₂		
OCT ₄		
C-MYC		
GAPDH		

تصویر شماره ۵: تصویر قطعات تکثیر شده به روش RT-PCR نمونه های cDNA ستر شده برای ژن های ویروسی تولیدی بر روی ژل پلی اکریل آمید ۸٪ (SOX₂ ۵۳ bp)، OCT₄ (۵۲ bp)، C-MYC (۵۱ bp)، GAPDH: نمونه کنترل مثبت (قطعه bp)، سلول های ترانس داکت شده با ویروس و کنترل منفی: نمونه های فاقد (DNA) (۵۲)، Tranducted HDF (۵۲)

بحث:

تولید iPSC انسانی را با استفاده از رتروویروس ها گزارش کردند، Yu و همکاران در سال ۲۰۰۷ موفق به ایجاد iPSC انسانی با استفاده از روش های لنتی ویروسی جهت بیان مجموعه ای متفاوتی از فاکتورهای SOX2، OCT4، NANOG، Aoi و LIN28 شدند (۱۹). تحقیق انجام شده توسط Aoi و همکاران در سال ۲۰۰۸ موجب برنامه ریزی مجدد سلول های فیروblast موشی با استفاده از ویروس های Moloney که سه فاکتور از فاکتورهای OCT3/4، NANOG، SOX2 و C-MYC را بیان می کردند، گردید اما میزان کارایی این روش به طور قابل توجهی پایین بود. در مطالعه ای دیگر از آدنو ویروس برای انتقال ژن های برنامه ریزی مجدد به سلول های هدف فیروblast موشی استفاده شد. البته کارآمدی این روش نسبت به روش های لنتی ویروسی به طور قابل توجهی پایین تر بود (۲۰). به علاوه Aoi و همکاران در تلاشی دیگر در سال ۲۰۰۸ توانستند فیروblast های جنینی موشی را با استفاده از چندین ترانس فکشن موقتی با کمک دو پلاسمید بیان C-MYC OCT4-KLF4-SOX2 و همچنین OCT4 و KLF4 کننده برنامه ریزی مجدد نمایند. اگر چه در این روش کارایی تولید سلول های iPSC پایین بود اما بدون درج شدن وکتور در ژنوم بیمار به انجام رسید. این موضوع جالب توجه است که بسیاری از رده های سلولی تولید شده پس از ترانس فکشن موقتی دارای پلاسمیدهای درج شده در ژنوم سلول بودند. این موضوع پیشنهاد می کند که ادغام شدن پایدار توالی های خارجی در ژنوم سلول می تواند اتفاق افتد (۲۱). Zhao و همکاران در سال ۲۰۰۸ با استفاده از وکتورهای رترو ویروسی حاوی فاکتورهای OCT3/4، NANOG، SOX2 و C-MYC اقدام به تولید سلول های iPSC از سلول های فیروblast جدا شده از پوست گوش میمون های نر بالغ نمودند (۲۲). H0 و همکاران در سال ۲۰۱۰ در مطالعه ای به بررسی برنامه ریزی مجدد سلول های

در مطالعه حاضر از وکتور لنتی ویروسی SOX2، OCT3/4، TetO-FUW-OSKM و C-MYC KLF4 فیروblast جدا شده از نمونه های Foreskin استفاده گردید. نتایج حاصل از ترانسفکشن سلول های لاین-HEK-293T نشان داد که در ۷۰-۸۰٪ این سلول ها ترانسفکت شده اند که بیانگر تولید موفقیت آمیز وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM بود. همچنین ژن های پرتوانی در سلول های HDF پس از ترانس داکشن بیان مناسبی داشتند که می تواند جهت برنامه ریزی مجدد سلول های HDF و تولید سلول های iPSC با خاصیت تکثیری بالا استفاده شود.

به منظور ایجاد سلول های سوماتیک بالغین چندین فاکتور رونویسی جهت برنامه ریزی مجدد آن ها استفاده می شود. دو گروه از این فاکتورها شامل OCT4 و KLF4 و C-MYC، SOX2 و همکاران Yamanaka توسط Thomson و همکاران جهت برنامه ریزی مجدد سلول های سوماتیک انسانی و ایجاد سلول های iPSC معرفی و استفاده شده است (۱۶). Yamanaka و همکاران در سال ۲۰۰۷ اقدام به تولید سلول های iPSC از سلول های OCT4 با استفاده از ۴ فاکتور رونویسی شامل HDF KLF4 و C-MYC، SOX2 و مودند و از سلول های (Mouse embryonic fibroblasts= MEF) به عنوان لایه تغذیه کننده (Feeder) جهت تولید سلول های iPSC استفاده کردند (۱۷). روش پژوهش حاضر بر اساس مطالعه Yamanaka و همکاران استوار گردید و کارایی وکتور لنتی ویروسی TetO-FUW-OSKM جهت برنامه ریزی سلول ها مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین مطالعه آن ها پس از ترانسفکشن سلول های لاین HEK-293T نشان داد که در ۷۰-۸۰٪ این سلول ها ویروس تولید شده است که شبیه مشاهدات مطالعه حاضر بود. در همان زمان که Yamanaka و همکاران

DNA غیر ویروسی است که در سال ۱۹۶۰ برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. این روش بر پایه به همکنش DNA با یون کلسیم و ایجاد رسوب استوار است. انتقال DNA در این روش به صورت اندوستیوز انجام می شود و با اینکه بازدهی حدود ۱۰٪ دارد ولی یک روش ارزان بوده که با کمترین امکانات قابل اجرا است (۲۶،۱۷). در این تحقیق برای تولید ویروس ابتدا پلاسمیدهای تولید کننده لنتی ویروس به روش فسفات کلسیم وارد لاین سلولی HEK-293T شده و تولید ویروس توسط تست الایزا تأیید گردید. سپس ویروس های تولید شده حاوی فاکتورهای مورد نظر به سلول های HDF به منظور برنامه ریزی مجدد آن ها جهت تولید سلول های iPS iTransس داکت شد.

بازدهی پایین ریز تزریقی (Micro injection)

برای انتقال ژن باعث ایجاد روش های جدید انتقال ژن گردیده است که از جمله این روش ها استفاده از لنتی ویروس ها و زیر مجموعه این خانواده رترووویروس ها می باشد. وکتورهای لنتی با توانایی انتقال DNA بازدهی بالا به خصوص در سلول هایی که به طور فعال در حال تقسیم نیستند در این مطالعه مورد توجه قرار گرفت. انتقال و بیان ژن ها از طریق وکتورهای لنتی می تواند در سلول های هدف به صورت پایدار اتفاق افتد. تهیه وکتورهای انتقال دهنده فاکتورهای رونویسی مؤثر در برنامه ریزی مجدد سلول های میزبان، به عنوان iPS مهمترین و اولین قدم در تولید سلول های می باشد. در مطالعه حاضر نیز برای انتقال ژن های مورد نظر از لنتی ویروس استفاده شد. در این پژوهش از ژن های psPAX و pMD2.G به عنوان ژن های کمکی در انتقال و تنظیم بیان اپران وکتور لنتی ویروسی OCT3/4 TetO-FUW-OSKM استفاده شد. در این مطالعه ژن های مورد نیاز با استفاده از یک وکتور پلی سیسترونیک واحد در HDF بیان شد. این موضوع سبب می شود تا نسبت به استفاده از ۴ وکتور جداگانه

(Human umbilical vein endothelial cells= HUVEC) تولید سلول های iPS توسط دو فاکتور غیر تومورزای SOX2 و OCT3/4 پرداختند (۲۳). پژوهش آن ها از لحاظ نوع روش مورد استفاده تا حدودی شبیه روش کار مطالعه حاضر بود با این تفاوت که در پژوهش حاضر از ویروس های لنتی جهت انتقال ژن های مورد نظر به سلول های HDF استفاده گردید. Thomson و همکاران جهت برنامه ریزی مجدد سلول های سوماتیک انسانی و ایجاد سلول های iPS فاکتورهای OCT4، NANOG، SOX2، C-MYC و KLF4 برای این منظور استفاده گردید (۱۶). مطالعات زیادی در سال های اخیر بر روی ژن درمانی بتالاسمی با استفاده از وکتورهای آدنوویروسی، رترووویروسی و به تازگی لنتی ویروسی در طیف وسیعی از سلول ها از قبیل رده های سلولی پستانداران، سلول های بنیادی جنینی موش و سلول های بنیادی خون ساز موش و انسان صورت گرفته است (۲۴،۴). نادریان و همکاران در سال ۲۰۰۷ با ساب کلونینگ ژن آنزیم گلوکوسریوزیداز موش سوری در وکتور لنتی ویرال و انتقال آن به رده سلولی HEK نشان دادند که یکی از مناسب ترین وکتورها برای انتقال و بیان ژن های نوترکیب، وکتور لنتی ویرال است که مطالعه حاضر نیز کارایی بالای این وکتورها را در ترانسداکشن سلول های HDF نشان داد. همچنین وکتورهای لنتی ویرال مشتق از HIV-1 قابلیت انتقال ژن های نوترکیب را به سلول های قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم دارند (۲۵). مطالعه بی خوف تربیتی و همکاران در سال ۲۰۰۹ به منظور ژن درمانی بیماران بتا تالاسمی استفاده موفق لنتی وکتورها به عنوان انتقال مؤثر، کارآمد و پایدار ژن به سلول های هدف را نشان داد و آنها بیان کردند که از لنتی وکتورها در ژن درمانی بسیاری از بیماری های ژنتیکی و همچنین سرطان ها که امروزه شیوع بالایی دارند، می توان استفاده کرد (۴). روش فسفات کلسیم یکی از روش های انتقال

برنامه ریزی مجدد را نشان می‌دهند، نتایج آنها بیان کوتاه مدت این ژن‌ها در سلول‌های رت به منظور تولید iPSC نشان داد (۲۷).

نتیجه‌گیری:

با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر و کتورهای لنتی ویروسی به دلیل قابلیت درج ژنوم خود در ژنوم سلول هدف قادر خواهند بود برای زمان‌های طولانی ژن‌های لازم جهت باقی ماندن سلول‌ها در حالت بنیادی را بیان کنند و همچنین به دلیل استفاده از یک وکتور لنتی پلی سیسترونیک TetO-FUW-OSKM به جای چهار وکتور ویروسی جداگانه امکان درج‌های خود به خودی در ژنوم سلول‌های HDF کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه تولید وکتورهای لنتی ویروسی با تیتر بالا یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای ایجاد سلول‌های iPSC می‌باشد، این نتایج نشان دهنده استفاده موفق از وکتورهای لنتی ویروسی به عنوان یک روش ساده و ارزان به منظور برنامه ریزی مجدد سلول‌ها بود.

تشکر و قدردانی:

بدینوسیله نویسندهای این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (شماره گرانت: ۹۰-۱۲-۱۲) و مرکز تحقیقات سلوکی و مولکولی به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام این پژوهه تحقیقاتی اعلام می‌نمایند. همچنین از زحمات آزمایشگاه‌های Rudolf Jaenisch و Trono به منظور فراهم نمودن پلاسمیدها قدردانی می‌گردد.

ارزیابی استفاده از لنتی ویروس‌ها به عنوان حامل‌های انتقال ژن درج‌های ژنی (insertion) کمتری در ژنوم میزان رخداده. درج‌های ژنی احتمال بروز بدخیمی ناشی از درج شدن‌های تصادفی در طول ژنوم سلول میزان و آسیب به آن را در سلول برنامه ریزی شده افزایش می‌دهند. از سوی دیگر بر خلاف سایر روش‌هایی که از IRES (Internal ribosomal entry site) ژن‌های مختلف از یک پرومотор استفاده می‌کنند، در این مطالعه از پپتیدهای 2A جهت بیان ژن‌های مختلف توسط یک پرومotor استفاده گردید که نسبت به IRES اندازه کوچک و کارایی بالاتری در بیان ژن‌های بالا دست و پایین دست پرومотор داشته و موجب می‌شود که حتی ژن‌هایی که از پرومотор فاصله‌ی دوری دارند به خوبی بیان شوند. این موضوع برای موقوفیت در القاء برنامه ریزی در سلول‌هایی که ژن به آنها وارد شده است حیاتی می‌باشد. به علاوه استفاده از یک وکتور لنتی پلی سیسترونیک به جهت تولید تنها یک مرحله لنتی ویروس نسبت به چهار ویروس جداگانه، بسیار آسان‌تر است و همچنین در صورتی که ویروس وارد سلول میزان شود می‌توان مطمئن شد که حتماً در یک زمان‌هر چهار ژن ضروری جهت برنامه ریزی مجدد در این سلول‌ها بیان خواهند شد (۲۶). Merkl و همکاران در سال ۲۰۱۳ با استفاده از وکتورهای القایی غیر ویروسی حاوی ژن‌های OCT4، SOX2، C-MYC و KLF4 اقدام به تولید iPSC‌های کارا در رت نمودند. آنها نشان دادند که برنامه ریزی مجدد سلول‌ها بر پایه پلاسمیدها منجر به تولید iPSC‌های شبیه ES در رت می‌شود. انتقال DNA با این روش نشان دهنده درج کمتر در ژنوم سلول‌ها در مقایسه با استفاده از وکتورهای لنتی و رتروویروسی بود و بر خلاف استفاده از وکتورهای لنتی که بیان مدام فاکتورهای

منابع:

1. Delenada C. Lentiviral vectors: optimization of packaging, transduction and gene expression. J Gene Med. 2004; 6: 125-38.

2. Van Damme A, Chuah MK, Collen D, Vanden Driessche T. Oncoretroviral and lentiviral vector-base gene therapy for hemophilia: preclinical studies. *Semin Thromb Hemost*. 2004; 30: 185-95.
3. Naldini L, Blumer U, Gallay P, Ory D, Mulligan R, Gage FH, et al. In vivo gene delivery and stable transduction of nondividing cells by a lentiviral vector. *Science*. 1996; 272(5259): 263-67.
4. Bikhof-Torbati M, Khanahmad H, Jamshidi F, Karimipor M, Sadeghizadeh M, Shokrgozar MA, et al. HIV type 1-based particles effect in transduction of HT1080 cell line: A technique in β-thalassemia gene therapy. *Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch*, 2009; 19(3): 160-67.
5. Takahashi K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. *Cell*. 2006; 126(4): 663-76.
6. Ben-David U, Benvenisty N. The tumorigenicity of human embryonic and induced pluripotent stem cells. *Nat Rev Cancer*. 2011; 11(4): 268-77.
7. Amit M, Carpenter MK, Inokuma MS, Chiu CP, Harris CP, Waknitz MA, et al. Clonally derived human embryonic stem cell lines maintain pluripotency and proliferative potential for prolonged periods of culture. *Dev Biol*. 2000; 227(2): 271-8.
8. Hiyama E, Hiyama K. Telomere and telomerase in stem cells. *Br J Cancer*. 2007; 96: 1020-4.
9. Eilers M, Eisenman RN. Myc's broad reach. *Genes Dev*. 2008; 22(20): 2755-66.
10. Evans PM, Liu C. Roles of Krupel-like factor 4 in normal homeostasis, cancer and stem cells. *Acta Biochim Biophys Sin*. 2008; 40: 554-64.
11. Sperger JM, Chen X, Draper JS, Antosiewicz JE, Chon CH, Jones SB, et al. Gene expression patterns in human embryonic stem cells and human pluripotent germ cell tumors. *Proc Natl Acad Sci*. 2003; 100(23): 13350-5.
12. Ben-Porath I, Thomson MW, Carey VJ, Ge R, Bell GW, Regev A, et al. An embryonic stem cell-like gene expression signature in poorly differentiated aggressive human tumors. *Nature Genet*. 2008; 40(5): 499-507.
13. Wong DJ, Liu H, Ridky TW, Cassarino D, Segal E, Chang HY. Module map of stem cell genes guides creation of epithelial cancer stem cells. *Cell Stem Cell*. 2008; 2(4): 333-44.
14. Calvanese V, Horrillo A, Hmadcha A, Suarez-Álvarez B, Fernandez AF, Lara E, et al. Cancer genes hypermethylated in human embryonic stem cells. *PLoS One*, 2008; 3(9): e3294.
15. Hoffman LM, Carpenter MK. Characterization and culture of humanembryonic stem cells. *Nat Biotechnol*. 2005; 23(6): 699-708.
16. Liao J, Wu Z, Wang Y, Cheng L, Cui C, Gao Y, et al. Enhanced efficiency of generating induced pluripotent stem (iPS) cells from human somatic cells by a combination of six transcription factors. *Cell Res*. 2008; 18(5): 600-3.
17. Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, Narita M, Ichisaka T, Tomoda K, et al. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors. *Cell*, 2007; 131(5): 861-72.
18. Plasmid 20321: TetO-FUW-OSKM [Internet] Available from: <http://www.addgene.org/20321>.
19. Yu J, Vodyanik MA, Smuga-Otto K, Antosiewicz-Bourget J, Frane JL, Tian S, et al. Induced pluripotent stem cell lines derived from human somatic cells. *Science*. 2007; 318(5858): 1917-20.
20. Stadtfeld M, Nagaya M, Utikal J, Weir G, Hochedlinger K. Induced pluripotent stem cells generated without viral integration. *Science*. 2008; 322(5903): 945-9.

21. Aoi T, Yae K, Nakagawa M, Ichisaka T, Okita K, Takahashi K, et al. Generation of pluripotent stem cells from adult mouse liver and stomach cells. *Science*. 2008; 321(5889): 699-702.
22. Zhao Y, Yin X, Qin H, Zhu F, Liu H, Yang W, et al. Two supporting factors greatly improve the efficiency of human iPSC generation. *Cell stem cell*. 2008; 3(5): 475-9.
23. Ho PJ, Yen ML, Lin JD, Chen LS, Hu HI, Yeh CK, et al. Endogenous KLF4 expression in human fetal endothelial cells allows for reprogramming to pluripotency with just OCT3/4 and SOX2--brief report. *Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology*. 2010; 30(10): 1905-7.
24. Wang H, Shayakhmetov DM, Leege T, Harkey M, Li Q, Papayannopoulou T, et al. A capsid-modified helper-dependent adenovirus vector containing the beta-globin locus control region displays a nonrandom integration pattern and allows stable, erythroid-specific gene expression. *J Virol*. 2005; 79(17): 10999-1013.
25. Naderian H, Kazemi B, De Vries A. Sub cloning of mouse mousculus glucocerebrosidase enzyme gene in lentiviral vector and transfer to HEK cell line. *FEYZ*. 2007; 11(1): 1-7.
26. Hyun I, Hochedlinger K, Jaenisch R, Yamanaka S. New advances in iPS cell research do not obviate the need for human embryonic stem cells. *Cell Stem Cell*. 2007 Oct; 1(4):367-8.
27. Merkl C, Saalfrank A, Riesen N, Kuhn R, Pertek A, Eser S, et al. Efficient generation of rat induced pluripotent stem cells using a non-viral inducible vector. *PLOS ONE*. 2013; 8(1): e55170.

The assessment of lentiviral vectors application for gene transformation in human dermal fibroblasts (HDFs)

Allahbakhshian-Farsani M^{1,2}, Ghasemi-Dehkordi P¹, Abdian N¹, Khosravi-Farsani S¹, Mirzaeian A³, Nasri M¹, Karimi-Taghanaki A⁴, Mardani G⁴, Amiri SB¹, Hashemzadeh-Chaleshtori M^{1*}

¹ Cellular and Molecular Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran; ² Hematology and Blood Banking Dept., Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran; ³ Clinical Biochemistry Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Sharekord, I.R. Iran; ⁴ Medical Plants Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran.

Received: 28/Apr/2013

Accepted: 20/Oct/2013

Background and aims: Induced pluripotent stem cells (iPSC) are primary, undifferentiated cells that are able to create almost any type of cells in the body. The purpose of the present study was to produce and transmit TetO-FUW-OSKM lentiviral vector to human dermal fibroblast cells (HDFs) and to investigate the application of this vector.

Methods: In this experimental study after isolation and culture of HDF cells, TetO-FUW-OSKM lentiviral vector (as transfer vector) containing the reprogramming genes and PsPAX2 and PMDG2 vectors (as packaging plasmids) were transfected to HEK-293T cell line for virus production. The supernatants of packaging cells were harvested 48 h and 72 h after transfection. Then, these viruses were transduced to HDF for reprogramming these cells.

Results: The results of this study demonstrated successful production of TetO-FUW-OSKM lentiviral vector, efficiency of transmission method of gene via lentiviral vectors, and suitable expression of the transcription factors in HDF cells after transduction.

Conclusion: According to these findings lentiviral vectors could be used for gene transmission and reprogramming of adult cells such as HDF in future studies and to generate iPS cells.

Keywords: Human dermal fibroblast cells, TetO-FUW-OSKM lent viral vector, Reprogramming, Induced pluripotent stem cell, RT-PCR.

Cite this article as: Allahbakhshian-Farsani M, Ghasemi-Dehkordi P, Abdian N, Khosravi-Farsani S, Mirzaeian A, Nasri M, Karimi-Taghanaki A, Mardani G, Amiri SB, Hashemzadeh-Chaleshtori M. The assessment of lentiviral vectors application for gene transformation in human dermal fibroblasts (HDFs). J Shahrekord Univ Med Sci. 2014; 15(Suppl): 12-24.

*Corresponding author:

Cellular and Molecular Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Rahmatieh, Shahrekord, I.R. Iran, Tel: 00983813346692, E-mail: biotechnologyskums@gmail.com.