



دانشگاه علوم نرسکی کرمان «انشگاه علوم نرسکی کرمان

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی عنوان:

بررسی ارتباط استرس شغلی و تصمیم گیری بالینی در پرستاران بخش های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۵

توسط: نجمه خاتون شعاعي

استاد راهنما: دكتر عصمت نوحي

اساتید مشاور: دکتر رقیه مهدی پور ، دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

سال تحصيلي:١٣٩٧–١٣٩٤



Kerman University of Medical Sciences

Faculty of Nursing and Midwifery

in Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree (MSc)

Title:

The relationship between occupational stress and clinical decision making in critical care nurses of Hospitals of Kerman University of Medical Sciences 2016

By:

Najmeh khatoon Shoaei

Supervisor:

Dr Esmat Noohi

Advisor/s:

1-Dr Roghayeh Mehdipour

2- Dr Armita Shahesmaeili

Year:

2017



مقدمه: پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی در محیط کاری خود دچار استرس های فراوانی هستند، که این خود به طور مستقیم بر روی کیفیت مراقبت تأثیر می گذارد. با توجه به اینکه تصمیم گیری بالینی صحیح در بالا بردن کیفیت مراقبت پرستاری تأثیر بسزایی دارد و به نوبه ی خود در اقدامات پرستاری موجب طرح ریزی منطقی مراقبتی با حداکثر احتمال موفقیت می شود، و با توجه به اهمیت روز افزون موضوع تصمیم گیری بالینی، شناخت عوامل مرتبط با آن و از جمله استرس شغلی ضروری به نظر می رسد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین استرس شغلی با تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش های ویژه (آی سی یو ، سی سی یو) با هدف تعیین ارتباط بین استرس شغلی کرمان در سال ۱۳۹۵ پرداخته است.

مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی است، جامعه پژوهش شامل کل پرستاران بخش مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی کرمان در سال ۱۳۹۵می باشد. تعداد کل جامعه ۲۷۳ می ویژه (آی سی یو، سی سی یو) بیمارستان های علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۵می باشد. تعداد کل جامعه شد می باشد، حجم نمونه پژوهش نیز با استفاده از فرمول استاندارد مطالعات همبستگی و با توجه به اندازه گیری می باشد. حجمت جمع آوری داده ها از دو پرسشامه استرس شغلی معنی مانید گیری بالینی Lauri &Salantera استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها براساس اهداف میشن با استفاده از آمار توصیفی مانند توزیع فراوانی (تعداد و درصد) و انحراف معیار و آمار استنباطی مانند آزمون تی

و میانگین کل نمره استرس شغلی (۱۹۰/۲۶ \pm ۳۹/۴۳) و میانگین کل نمره تصمیم گیری بالینی r = -0.77 و میانگین کل نمره تصمیم گیری بالینی r = -0.77 و منفی بین استرس شغلی و تصمیم گیری بالینی r = -0.77

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر در صورت افزایش استرس شغلی سطح تصمیم گیری بالینی کاهش می

یلد، لذا باید تصمیماتی اتخاذ شود تا بتوان سطح استرس شغلی پرستاران را کاهش و توانایی تصمیم گیری صحیح را در

آنها بالا برده، که از آن طریق بتوان کیفیت مراقبت های پرستاری ارائه شده به بیماران را افزایش دهیم.

كلمات كليدى: پرستار، بخش ويژه، استرس شغلى، تصميم گيرى بالينى

Abstract

Background & Objective: Nurses, as the largest group of health care providers suffer from a lot of stress in their work environment which directly affects the quality of care. Considering that proper clinical decision making has a significant impact on the quality of nursing care and in turn, leads to logical care planning with the maximum probability of success in nursing practices, given the increasing importance of clinical decision making, the recognition of relevant factors with it including job stress seems necessary. The aim of this study was to determine the relationship between job stress and clinical decision making of nurses in special departments (ICU, ICU) in Kerman University of Medical Sciences hospital in 2016.

Methods: This cross-sectional study was a descriptive-correlational study. The research population included all nursing staff of intensive care units (ICU, CCU) in Kerman Medical Sciences Hospital in 2016. The total number of the population is 273 people. The sample size of the research was also calculated as 130 people using the standard formula of correlation studies and according to simultaneous measurements of demographic variables. Two Osipow Job Stress and Lauri & Salantera Clinical Decision Making questionnaires were used for data collection. Data analysis was performed using descriptive statistics such as frequency distribution (number and percentage) and standard deviation and inferential statistics such as independent t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation coefficient.

Results: The mean of total score of job stress was (190.26 ± 39.43) and the mean of total clinical decision-making score was (78.85 ± 18.48) and there was a significant and negative correlation between job stress and clinical decision making (r=-027 and p.value= 0.001) so that the clinical decision-making is reduced by increasing the level of occupational stress.

Conclusion: According to the results of this study in the event of increased occupational stress, the level of clinical decision-making is reduced; therefore, decisions should be made to reduce the level of occupational stress in nurses and increase the ability to make the right decision to enhance the nursing care provided to patients.

Keywords: Nurse, Intensive care unit, Occupational stress, Clinical decision making





	تاریخ <u>۹ ۸ بر ۹۳</u>
94/	شماره کی کی کی کی ایر این این ا
	ىيەست

in a service service.

بسمه تعالى صور تجلسه دفاع از پایان نامه

المسامع يزشكي كرمان

ات تکمیلی دانشگاه

می این نامه تحصیلی خانم نجمه خاتون شعاعی حرجندی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی (پردیس خودگردان) ورودی ۹۴ - 💨 "بررسی ارتباط استرس شغلی و تصمیم گیری بالینی در پرستاران بخش های ویژه (آی سی یو،سی سی یو) بیمارستانهای علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۵ " به راهنمایی خانم دکتر عصمت نوحی در ساعت ۱۲ روزسه شنبه مورخ ۹/ ۹۶/۸ با حضور اعضای محترم متشكل از:

	امضا	نام و نام خانوادگی	سمت
	3	خانم دکتر عصمت نوحی	الف : استاد راهنما
	مراحفرر درطب	خانم دکتررقیه مهدی پور خانم دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی	ب : اساتیدمشاور
) خانم دکتر بتول تیرگری	ج : عضو هیات داوران (داخلی)
		خانم دكترمژگان تائبي	د : عضو هیات داوران (خارجی)
~		خانم گلناز فروغ عامری	ه : نماینده تحصیلات تکمیلی

(1) 9'

المالكان بستاري و مامائي رازي و ا مضاء معاون آموزشي دانشكده تحسيلات تكميلي