

Liste der Spinnen Baden-Württembergs (Araneae)

Teil 1: Bibliographie und Liste der Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und Mysmenidae

zusammengestellt von Franz RENNER

unter Mitarbeit von Karl Hermann HARMS sowie Elisabeth BAUCHHENS, Helko BELLMANN, Theo BLICK, Claudia GACK, Ambros HÄNGGI, Josef KIECHLE, Angelika KOBEL-LAMPARSKI, Norbert LEIST, Andreas MALTEN, Dieter NÄHRIG, Ralph PLATEN, Werner ROSE, Günter SCHMIDT, Gaby TÖPFER-HOFMANN, Andreas WOLF und Jörg WUNDERLICH

Abstract. List of the Spiders of Baden-Württemberg (Germany). Part 1: Bibliography and list of Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae and Mysmenidae. The checklist contains informations about the spiders recorded from Baden-Württemberg since 1895 and includes a bibliography of the spider fauna of Baden-Württemberg.

Key words: Araneae, checklist, faunistics, bibliography, Baden-Württemberg, Germany

Danksagung: Ich danke Gerd ALBERTI, Klaus DUMPERT, Otto von HELVERSEN, Horst KORGE, Ingetraut KÜHN, Helmut STUMPF für die Erlaubnis, unpublizierte Daten aus ihren Sammlungen verwenden zu dürfen. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart hat die Datenerhebung und Auswertung teilweise durch Bereitstellung von Finanzmitteln unterstützt. Ich danke Herrn Prof. Dr. Bernhard ZIEGLER, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart. Für technische Assistenten danke ich Matthias BUCHWEITZ, Karin MAYER und Glsela NEUBER.

In den letzten Jahren gewannen Spinnen in der angewandten Ökologie immer mehr an Bedeutung, da sie als Bioindikatoren bei landschaftsökologischen Fragestellungen verwendet werden können (KIECHLE 1992). Hierbei ist nicht nur das Arteninventar des Untersuchungsgebietes relevant, sondern auch die Kenntnis von Verbreitung und Gefährdung der Spinnen in der entsprechenden Region von Bedeutung. Nachdem für Bayern (BLICK & SCHEIDLER 1991), Berlin (PLATEN et al. 1991) und für die SCHWEIZ (MAURER & HÄNGGI 1990) Artenlisten vorliegen, soll nun für Baden-Württemberg eine Artenliste und eine Bibliographie zur Spinnenfauna vorgestellt werden. Da der Kenntnisstand über Verbreitung und Ökologie der Spinnen in Baden-Württemberg noch unbefriedigend ist,

soll die erarbeitete Liste ein erster Schritt zur Verbesserung dieser Situation sein. Teil 1 umfaßt die Bibliographie zur Spinnenfauna Baden-Württembergs und die Liste der Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und Mysmenidae. Teil 2 wird die Artenliste der übrigen Familien und eine Auswertung des vorliegenden Datenmaterials enthalten.

BIBLIOGRAPHIE ZUR SPINNENFAUNA BADEN-WÜRTTEMBERGS

Die Bibliographie umfaßt alle Arbeiten seit MÜLLER & SCHENKEL 1895, die faunistische Daten aus Baden-Württemberg enthalten. Diplomarbeiten und unpublizierte Arbeiten (Gutachten usw.) wurden nicht berücksichtigt. Vollständigkeit wurde angestrebt, dennoch erhebt die Liste keinen Anspruch darauf. Sie versteht sich als Arbeitsgrundlage für weitere faunistische Arbeiten. Ergänzungen bzw. eine regelmäßige Fortschreibung in den Arachnologischen Mitteilungen werden angestrebt. Der Übergang zwischen Gebietsmonographien mit wissenschaftlichem Anspruch und allgemeinverständlichen populären Führern oder Bildbänden über einzelne Gebiete ist manchmal fließend. In diesem Grenzbereich erfolgte die Auswahl der Arbeiten, die in die Bibliographie Eingang fanden, nach subjektiven Gesichtspunkten.

- ALBERT, A., H. HILPERT & R. ALBERT (1987): Sind zoophag Arthropoden als Zelgerindikatoren für Belastungen von Ökosystemen geeignet. - Verh. Ges. Ökol. 16: 69-78
- BAEHR, B. (1982): Die Spinnen (Araneae). In: Stadt Münsingen (Hrsg): Geschichte, Landschaft, Kultur; Festschrift zum Jubiläum des württembergischen Landeserbnungsvertrags von 1482. Thorbecke, Sigmaringen. S. 750-764
Bemerkung: Artenliste ist identisch mit BAEHR & BAEHR 1984
- BAEHR, B. (1983a): Vergleichende Untersuchungen zur Struktur der Spinnengemeinschaften (Araneae) im Bereich stehender Kleingewässer und der angrenzenden Waldhabitate im Schönbuch bei Tübingen. - Diss. Universität Tübingen. 199 S.
- BAEHR, B. (1983b): Bedingungen für die Entstehung einer eigenständigen Spinnenfauna an Rändern stehender Kleingewässer im Schönbuch. - Verh. Ges. Ökol. 10: 83-88
Bemerkung: Artenliste ist Auszug aus BAEHR 1983a
- BAEHR, B. (1984): *Erigone jaegeri* sp. nov. aus Südwestdeutschland (Araneae, Ergonidae). - Spixiana 7: 245-249
- BAEHR, B. & M. BAEHR (1984): Die Spinnen des Lautertales bei Münsingen (Arachnida, Araneae). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58: 375-406
- BAEHR, B. (1985a): Bemerkenswerte Spinnenfunde aus dem Schönbuch bei Tübingen (Araneae: Linyphiidae, Micryphantidae). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60: 563-570
Bemerkung: Artenliste ist Auszug aus BAEHR 1983a

- BAEHR, B. (1985b): Vergleichende Untersuchungen zur Temperatur-, Feuchtigkeits- und Helligkeitspräferenz bei einigen Arten der Lycosidae, Hahnildae und Linyphildae (Araneae). - Spixlana 8: 101-118
Bemerkung: Artenliste ist Auszug aus BAEHR 1983a
- BAEHR, B. (1986): Untersuchungen zur Habitatbindung von Spinnen (Araneae) im Schönbuch bei Tübingen. In: G. EINSELE (Hrsg): Das landschaftsökologische Forschungsprojekt Naturpark Schönbuch. VCH, Weinheim, S. 507-534
Bemerkung: Artenliste ist Auszug aus BAEHR 1983a
- BAEHR, B. & G. EISENBEIS (1985): Comparative Investigations on Resistance to Desiccation in Lycosidae, Hahnildae, Linyphildae and Micryphantidae (Arachnida, Araneae). - Zool. Jb. Syst. 112: 225-234
Bemerkung: Artenliste Auszug aus BAEHR 1983a
- BAUCHHENS, E. & G. SCHOLL (1985): Bodenspinnen einer Weinbergsbrache im Maintal (Steinberg, Lkr. Haßberge). Ein Beitrag zur Spinnenfaunistik Unterfrankens. - Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 23/24: 3-23
- BAUCHHENS, E., W. DEHLER & G. SCHOLL (1987): Bodenspinnen aus dem Veldensteiner Forst (Naturpark "Fränkische Schweiz / Veldensteiner Forst). - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth 29: 7-44
Bemerkung: Die Fundorte von *Latithorax faustus* und *Clubiona kulczynskii* wurden von BAUCHHENS (in litt.) präzisiert
- BAUCHHENS, E. (1988): Neue und bemerkenswerte w-deutsche Spinnenfunde in Aufsammlungen aus Bayern. - Senckenbergiana biol. 68: 377-388
- BAUER, S. (1982): Pflegemaßnahmen in Streuwiesengebieten; Entstehung, Wert und frühere Bewirtschaftung von Streuwiesen sowie Auswirkungen heutiger Pflege auf Ihre Tierwelt. - Diss. Univ. Tübingen. 201 S.
- BAUR, D. P. (1961): Die Wasserfauna des Federsees. 15. Arachnoidea. In: W. ZIMMERMANN (Hrsg): Der Federsee. - Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 2: 94
- BELLMANN, H. (1980): Insekten und übrige Gliederfüßer. In: Landschaftsschutzgebiet Osterried bei Laupheim. - Führer Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 54-61
- BELLMANN, H. (1980/81): Die Lebensgemeinschaft Trockenrasen im Jahreslauf. - Mitt. Ver. Naturwiss. u. Math. Ulm (Donau) 31: 35-44
Bemerkung: Keine detaillierten Fundortangaben, daher bei der Auswertung nicht berücksichtigt
- BELLMANN, H. (1982): Spinnen in Höhlen der Schwäbischen Alb. - Lachinger Höhlenfreund 17(2): 61-68
Bemerkung: Keine detaillierten Fundortangaben, daher bei der Auswertung nicht berücksichtigt
- BELLMANN, H. (1984): Spinnen: beobachten, bestimmen. Neumann-Neudamm, Melsungen, Berlin, Basel, Wien. 160 S.
- BELLMANN, H. (1989): Entomologische Spezialitäten im Raum Ulm. - Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent. 7: 30-32
Bemerkung: Fund von *Dolomedes plantarius* Zitat aus RENNER 1987
- BLICK, T. (1991a): Zur Ökologie, Phänologie und Verbreitung von *Centromerus persimilis* (O. PICKARD-CAMBRIGDE 1921) (Arachnida: Araneae: Linyphildae). - Senckenbergiana biol. 71: 129-137
- BLICK, T. (1991b): *Bathyphantes eumenis*, neu für Deutschland und Frankreich, sowie *Leptyphantes notabilis* aus Blockhalden (Araneae: Linyphildae). - Arachnol. Mitt. 2: 31-32

- BÖSENBERG, W. (1901-1903): Die Spinnen Deutschlands. - *Zoologica* 14(35): 1-465
- BRAUN, R. (1956): Zur Spinnenfauna von Mainz und Umgebung, mit besonderer Berücksichtigung des Gonsenheimer Waldes und Sandes. - *Jb. Nass. Ver. Naturk.* 92: 50-79
- BRAUN, R. (1957): Die Spinnen des Rhein-Main-Gebietes und der Rheinpfalz. - *Jb. Nass. Ver. Naturk.* 93: 21-95
- BRAUN, R. (1960): Neues zur Spinnenfauna des Rhein-Main-Gebietes und der Rheinpfalz. Mit einer Revision der Sammlung BÖSENBERGs, der Nachlaßsammlung ZIMMERMANNs und der Geisenheim-Sammlung JACOBIs. - *Jb. Nass. Ver. Naturk.* 95: 28-89
Bemerkung: Funde aus Baden-Württemberg sind Zitate aus BÖSENBERG 1901-1903
- BRAUN, R. (1965): Beitrag zu einer Revision der paläarktischen Arten der *Philodromus aureolus*-Gruppe (Arach., Araneae). I. Morphologisch-systematischer Teil. - *Senckenbergiana biol.* 46: 369-428.
Bemerkung: Funde aus Baden-Württemberg sind Zitate aus BÖSENBERG 1901-1903
- BRAUN, R. (1966): Für das Rhein-Main-Gebiet und die Rheinpfalz neue Spinnenarten. - *Jb. Nass. Ver. Naturk.* 98: 124-131
- BRAUN, R. (1982): Zur Deutung der angeblichen neuen 'Deutschland'-Arten BÖSENBERGs und Ihrer balkanischen 'Wiederfunde' (Arachnida: Araneida). - *Senckenbergiana biol.* 62: 355-384
Bemerkung: Funde aus Baden-Württemberg sind Zitate aus BÖSENBERG 1901-1903.
- BÜRGIS, H. (1989): Bemerkenswerte Spinnenfunde vom Heidenberg bei Lautertal-Faidelbach (Nordwestlicher Odenwald). 4. Die Höhlenspinne *Nesticus cellulanus* (CLERCK, 1757) (Araneae: Nesticidae). - *Hess. faun. Briefe* 9: 56-63
- CASEMIR, H. (1961): Spinnen aus dem Naturschutzgebiet Feldberg (Schwarzwald). - *Ber. Naturf. Ges. Frelburg i. Br.* 51: 109-118
- DAHL, F. (1908): Die Lycosiden oder Wolfspinnen Deutschlands und Ihre Stellung im Haushalt der Natur. Nach statistischen Untersuchungen dargestellt. - *Nova Acta Leopoldina* 88: 175-678
- DAHL, F. (1926): Spinnentiere oder Arachnoidea I: Springspinnen (Salticidae). In: F. DAHL (Hrsg): *Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meerestelle* 3. Teil. G. Fischer, Jena, 55 S.
- DAHL, F. & M. DAHL (1927): Spinnentiere oder Arachnoidea II: Lycosidae s. lat. (Wolfspinnen im weiteren Sinn). In: F. DAHL (Hrsg): *Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meerestelle* 5. Teil. G. Fischer, Jena, 81 S.
- DAHL, M. (1937): Spinnentiere oder Arachnoidea VIII: 19. Familie: Hahnliidae. In: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): *Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meerestelle* 3. Teil. G. Fischer, Jena, S. 100-115
- DETTNER, K. (1985): Die Arthropodenfauna (Glieder Tiere) des Naturschutzgebietes und Bannwaldes "Waldmoor-Torfstich" im Nordschwarzwald. In: *Der Bannwald "Waldmoor-Torfstich"*. - *Waldschutzgebiete* 3: 151-210
- DOBAT, K. (1975a): Die Höhlenfauna der Schwäbischen Alb mit Einschluß des Dinkelberges, des Schwarzwaldes und des Wutachgebietes. Versuch einer Monographie. - *Jh. Ges. Naturkde. Württemberg* 130: 260-381
Bemerkung: Alle Höhlenfunde (incl. Bibliographie) sind in DOBAT 1975a aufbereitet, daher wurden alle früheren Höhlenfunde nach DOBAT 1975a zitiert
- DOBAT, K. (1975b): Die Höhlenfauna der Schwäbischen Alb mit Einschluß des Dinkelberges, des Schwarzwaldes und des Wutachgebietes. - *Abh. Karst- u. Höhlenkunde, Reihe D* 2: 265-381
Bemerkung: Identisch mit DOBAT 1975a

- DUMPERT, K. & PLATEN, R. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 4. Die Spinnenfauna. - *carollina* 42: 75-106
- ELSNER, J. (1930): Zoologische Mitteilungen. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz NF 2(18): 236
- GACK, C. & A. KOBEL-VOSS (1983): Zur Spinnenfauna des Naturschutzgebietes "Mindelsee". In: Der Mindelsee bei Radolfzell. Monographie eines Naturschutzgebietes auf dem Bodanrück. - Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 11: 501-513
- GACK, C. & A. KOBEL-LAMPARSKI (1986): Wiederbesiedlung und Sukzession auf neuen Rebböschungen im Kaiserstuhl am Beispiel epigäischer Spinnen. - *Verh. Ges. Ökol.* 14: 111-114
Bemerkung: Artenliste Auszug aus KOBEL-LAMPARSKI 1989
- GATTER, W., H. JÜNGLING & W. MÜLLER (1976): Faunistische Notizen aus dem Naturschutzgebiet Eichhalde bei Bissingen/Teck. - *Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 43: 145-161
- GAUCKLER, K. (1965): Die schöne Wespenspinne *Argyope bruennichi* und ihr Vordringen in Nordbayern. - *Naturf. Ges. Bamberg* 40: 103-110
- GAUCKLER, K. (1968): *Argyope bruennichi*, die schöne Wespenspinne, durchwandert Franken, erreicht die Oberpfalz und das bayer. Alpenvorland. - *Mitt. naturhist. Ges. Nürnberg* 2: 22-26
Bemerkung: Fundorte in Baden-Württemberg schon in GAUCKLER 1965 erwähnt
- GOLDER, F. (1921): Von drei Spinnen im Brelsgau. - *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz NF 1: 135-136*
Bemerkung: Der in dieser Arbeit genannte Fund von *Leptorchestes berolinesis* ist nicht sicher und wurde deshalb nicht berücksichtigt, vgl. GOLDER 1944
- GOLDER, F. (1929): Einige zoologische und botanische Beobachtungen aus dem unteren Wiesental. - *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz NF 2(17): 215*
- GOLDER, F. (1944): 4. Spinnen-Fundorte in der Rheinebene. - *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz NF 4(11/12): 444*
Bemerkung: Der Fund von *Myrmarchne formicaria* ist unsicher und wurde nicht berücksichtigt
- GRIMM, U. (1985): Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). - *Abh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 26: 1-318*
- GRIMM, U. (1986): Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinninae und Liocraninae (Arachnida, Araneae). - *Abh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 27: 1-91*
- GUTTMANN, R. (1979): Zur Arealentwicklung und Ökologie der Wespenspinne (*Argyope bruennichi*) in der Bundesrepublik Deutschland und den angrenzenden Ländern (Araneae). - *Bonn. zool. Beitr.* 30: 454-486
- GÜNZL, H. (1989): Das Naturschutzgebiet Federsee. Geschichte und Ökologie eines oberschwäbischen Verlandungsmooses. - *Führer Natur- u. Landschaftsschutzgeb. Bad-Württ.* 7: 1-164
- HAFNER, A. (1991): Missen im Landkreis Calw (1). Floristisch-faunistische Erhebungen im "Heselwasen". - *Beih. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspflege Bad.-Württ.* 62: 1-128
- HANDKE, K. & K.-F. SCHREIBER (1985): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf unterschiedlich gepflegten Parzellen einer Brachfläche im Taubergebiet. In: K.-F. SCHREIBER (Hrsg): Sukzession auf Grünlandbrachen. - *Münstersche Geographische Arbeiten* 20: 155-186

- HANDKE, K. (1988): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf Brachflächen in Baden-Württemberg. - Arbeitsberichte Lehrstuhl Landschaftsökologie 8: 1-169
Bemerkung: Von Spinnen sind nur Gesamtanzahlen angegeben. *Haplodrassus minorist* bei HANDKE & SCHREIBER 1985 genannt
- HARM, M. (1966): Die deutschen Hahnidae (Arach., Araneae). - Senckenbergiana biol. 47: 345-370
- HARM, M. (1971): Revision der Gattung *Heliophanus* C. L. KOCH (Arachnida: Araneae: Salticidae). - Senckenbergiana biol. 52: 53-79
- HARM, M. (1973): Zur Spinnenfauna Deutschland, XIV. Revision der Gattung *Sitticus* SIMON (Arachnida: Araneae: Salticidae). - Senckenbergiana biol. 54: 369-403
- HARM, M. (1981): Revision der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Marpissa* C. L. KOCH 1846 (Arachnida: Araneae: Salticidae). - Senckenbergiana biol. 61: 277-291
- HARMS, K. H. (1966): Spinnen vom Spitzberg (Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones). In: Der Spitzberg bei Tübingen. - Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 3: 973-997
- HARMS, K. H. (1978): Zur Verbreitung und Gefährdung der Spinnentiere Baden-Württembergs (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones). - Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspf. Bad.-Württ. 11: 313-322
- HARMS, K. H. (1986): Rote Liste der Spinnen Baden-Württembergs. Verbesserte und erweiterte Fassung (Stand 1.2.1985). - Arbeitsbl. Naturschutz 5: 65-68
- HARMS, K. H. (1987): Spinnen und Weberknechte aus Grünlandbrachen des südlichen Pfälzerwaldes. In: H. ROWECK (Hrsg): Beiträge zur Biologie der Grünlandbrachen im südlichen Pfälzerwald. - Pollichia-Buch 12: 169-205
- HELVERSEN, O. von & K. H. HARMS (1969): Zur Spinnenfauna Deutschlands, VIII. Für Deutschland neue Wolfspinnen der Gattungen *Pirata* und *Pardosa* (Arachnida: Araneae: Lycosidae). - Senckenbergiana biol. 50: 367-373
- HELVERSEN, O. von (1974): Die Wolfspinnen (Lycosidae) im Schutzgebiet "Taubergießen". In: Das Taubergießengebiet, eine Rheinauenlandschaft. - Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 7: 547-549
- HEUBLEIN, D. (1980): Die Frage der kleinräumigen Kongruenz von Zootaxozönosen und Vegetationszonierungen. - Mitteilungen flor. soz. Arbeitsgemeinschaft N.F. 22: 145-167
- HEUBLEIN, D. (1982): Untersuchungen zum Einfluß eines Waldrandes auf die epigäische Spinnenfauna eines angrenzenden Halbtrockenrasens. - Laufener Seminarbeiträge 5: 79-94
Bemerkung: Artenliste identisch mit HEUBLEIN 1983
- HEUBLEIN, D. (1983): Räumliche Verteilung, Biotoppräferenzen und kleinräumige Wanderungen der epigäischen Spinnenfauna eines Wald-Wiesen-Ökotox; ein Beitrag zum Thema "Randeffekt". - Zool. Jb. Syst. 110: 473-519
- HIPPA, H. & I. OKSALA (1982): Definition and revision of the *Enoplognatha ovata* (CLERCK) group (Araneae: Theridiidae). - Ent. scand. 13: 213-222
- HIPPA, H. & I. OKSALA (1983): Epigynal variation in *Enoplognatha latimana* HIPPA & OKSALA (Araneae, Theridiidae) in Europe. - Bull. Br. arachnol. Soc. 6: 99-102.
Bemerkung: Funde bereits bei HIPPA & OKSALA 1982 genannt
- HOFFMANN, B. (1980): Vergleichend ökologische Untersuchungen über die Einflüsse des kontrollierten Brennens auf die Arthropodenfauna einer Riedwiese im Federseegebiet (Südwestdeutschland). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52: 691-714
- HORN, H. (1980): Die Bedeutung leerer Schneckengehäuse für die Überwinterung und das Brutverhalten von *Pellene nigrocollatus* L. KOCH, 1874 in Steppenrasenformationen. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 39: 167-175

- HÖFER, H. (1989): Beiträge zur Wirbellosenfauna der Ulmer Region: I. Spinnen (Arachnida: Araneae). - Mitt. Ver. Naturwiss. u. Math. Ulm (Donau) 35: 157-176
- HUBER, A. (1917): Die wärmeliebende Tierwelt der weiteren Umgebung Basels. - Arch. Naturgesch. 1916(A)7: 66-69, 84-93
Bemerkung: Alle Arten bereits bei MÜLLER & SCHENKEL 1895 zitiert
- KLEIBER, O. (1911): Die Tierwelt des Mooregebietes von Jungholz im südlichen Schwarzwald. - Arch. Naturgesch. 77(1/3): 1-115
- KLINGNER, K. (1987): Auswirkungen eingesäter Randstreifen an einem Winterweizen-Feld auf die Raubarthropodenfauna und den Getreideblattlausbefall. - Zeitsch. angew. Entomol. 104: 47-58
Bemerkung: Determination nur bis auf Familienniveau erfolgt
- KOBEL-LAMPARSKI, A., F. LAMPARSKI & B. PETER (1985): Die Wirkung von Klärschlamm auf Bodenfauna und Struktur des Oberbodens eines Buchenwaldes. - Mitt. Ver. forst. Standortskde. u. Forstpflzücht. 31: 13-30
- KOBEL-LAMPARSKI, A. (1987): Die Neubesiedlung von flurbereinigtem Reb Gelände im Kaiserstuhl und die weitere frühe Sukzession am Beispiel ausgewählter Tiergruppen aus verschiedener Trophieebenen. - Diss. Univ. Freiburg. 473 S.
- KOBEL-LAMPARSKI, A. (1989): Wiederbesiedlung und frühe Sukzession von flurbereinigtem Reb Gelände im Kaiserstuhl am Beispiel der Spinnen (Araneae), der Asseln (Isopoda) und der Tausendfüßler (Diplopoda). - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 14: 895-913
Bemerkung: Artenliste ist Auszug aus KOBEL-LAMPARSKI 1987
- KOBEL-LAMPARSKI, A., C. GACK & F. LAMPARSKI (1990): Die Sukzession im flurbereinigten Reb Gelände des Kaiserstuhls bei Spinnen - Ihre Entwicklung über einen Zeitraum von 10 Jahren. - Verh. Ges. Ökol. 19/2: 316 - 323
Bemerkung: Artenliste ist Auszug aus KOBEL-LAMPARSKI 1987
- KRAUS, O. (1967): Zur Spinnenfauna Deutschlands, I. *Tapinesthis inermis*, eine für Deutschland neue Oonopidae (Arachnida: Araneae: Oonopidae). - Senckenbergiana biol. 48: 381-385
- KRAUS, O. & H. BAUR (1974): Die Atypidae der West-Paläarkt. Systematik, Verbreitung und Ökologie (Arach.: Araneae). - Abh. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 17: 85-116
- LAMPARSKI, F. (1988): Bodenfauna und synökologische Parameter als Indikatoren für Standortseigenschaften. - Freiburger Bodenkundliche Abhandlungen 22: 1-228
- LECHNER, M. (1991): Untersuchung der epigäischen Makrofauna fünfjähriger Feldhecken. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 415-466
Bemerkung: Bestimmung teilweise nur bis auf Familienniveau, daher bei der Auswertung nicht berücksichtigt
- LAUTERBORN, R. (1922): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 3. Reihe. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 1: 241-248
- LEIST, N. (1970): Zur Spinnenfauna Deutschlands, X. *Araneus adiantus* (WALCKENAER 1802), Neufunde für Süddeutschland (Araneae: Araneida). - Senckenbergiana biol. 51: 401-402
- LEIST, N. (1978): Die Spinnen des Rußheimer Altrheins. In: Der Rußheimer Altrhein, eine nordbadische Auenlandschaft. - Natur- u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 10: 365-398
- LESSERT, R. de (1910): Araignées. In: Catalogue des Invertébrés de la Suisse 3. Mus. Hist. Nat., Geneve. 639 S.

- LITZELMANN, E. (1929): Krabbenspinne auf der Jagd. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz NF 2(16): 210-211
- LITZELMANN, E. (1966): Tiergeographisches über Insekten. In: H. SCHÄFER & O. WITTMANN (Hrsg): Der Istelner Klotz. Zur Naturgeschichte einer Landschaft am Oberrhein. - Natur- u. Landschaftschutzgebiete Bad.-Württ. 4: 352-357
Bemerkung: Funde von *Argiope bruennichi* sind Zitate aus MÜLLER & SCHENKEL 1895
- LOCK, F. (1950): Die wespenleibige Radnetzspinne. - Aus der Heimat 58: 261-263
Bemerkung: Keine detaillierten Fundortangaben, daher nicht berücksichtigt
- LOERBROKS, A. (1983): Revision der Krabbenspinnen-Gattung *Heriades* SIMON (Arachnida: Aranea: Thomisidae). - Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 26: 85-139
- LUNAU, K. & L. RUPP (1988): Auswirkungen des Abflämmens von Weinbergböschungen im Kaiserstuhl auf die Fauna. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63: 69-116
- MIOTK, P. (1983): Das Eriskircher Ried - Ein Führer durch das bedeutendste Naturschutzgebiet am nördlichen Bodenseeufer. Spinnen - Araneida. - Führer Natur- u. Landschaftschutzgebiete Bad.-Württ. 6: 138-139
- MISIOCH, M. (1977): Zur Spinnenfauna des Kaiserstuhls (Arach: Araneae). - Abh. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 20: 133-149
Bemerkung: Manchen Arten wurden falsch bestimmt und sind von HARMS revidiert worden
- MÜLLER, F. & E. SCHENKEL (1895): Verzeichnis der Spinnen von Basel und Umgebung. - Verh. naturf. Ges. Basel 10: 691-824
- NÄHRIG, D. (1987): Spinnenfauna der oberen Strauchschicht von Hecken in Flurbereinigungsgebieten. - Diss. Univ. Heidelberg. 222 S. u. Anhang
- NÄHRIG, D. (1990a): Influence of different pesticides on spider communities in a riparian forest of the Rhine river. - Bull. Soc. europ. Arachnol. 1: 273 - 279
Bemerkung: Untersuchungsgebiet war ein Rheinauen-Wald bei Philippsburg (NÄHRIG mündl. Mitt.)
- NÄHRIG, D. (1990b): Charakterisierung und Bewertung von Hecken mit Hilfe der Spinnenfauna. - Zool. Beitr. N.F. 33: 253-263
Bemerkung: Artenliste ist Auszug aus NÄHRIG 1987
- NÄHRIG, D. (1991a): Systematische Untersuchungen der höheren Straten von Hecken mit verschiedenen Methoden, dargestellt am Beispiel der Spinnenfauna. - Beihefte Verh. Ges. Ökol. 2: 97 - 106
Bemerkung: Artenliste (nur Familien genannt) ist Auszug aus NÄHRIG 1987.
- NÄHRIG, D. (1991b): Zur Phänologie und Ökologie der *Enoplognatha ovata*-Gruppe (Araneae: Therididae). - carolinea 49: 131-133
Bemerkung: Artenliste ist Auszug aus NÄHRIG 1987
- OST, G. (1979): Auswirkungen der Mahd auf die Artenmannigfaltigkeit (Diversität) eines Seggenriedes am Federsee. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 49/50: 407-439
Bemerkung: Nur Individuenzahl von "Araneae" erwähnt
- REIMOSER, E. (1937a): Spinnentiere oder Arachnoidea VIII: 16. Familie: Gnaphosidae oder Plattbauchspinnen. In: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meerestelle 3. Teil. G. Fischer, Jena. S. 1-41
- REIMOSER, E. (1937b): Spinnentiere oder Arachnoidea VIII: 18. Familie: Clubionidae oder Röhrenspinnen. In: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meerestelle 3. Teil. G. Fischer, Jena. S. 45-99
- RENNER, F. (1986): Zur Nischendifferenzierung bei *Pirata*-Arten (Araneida, Lycosidae). - Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 28: 75-90

- RENNER, F. (1987): Revision der europäischen *Dolomedes*-Arten (Araneida: Pisauridae). - Stuttgartarter Beltr. Naturk. Ser. A 406: 1-15
- RENNER, F. & J. TRAUTNER (1987): Bodenbewohnende Spinnen (Araneida) und Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) eines dörflichen Nutzgartens auf der Schwäbischen Alb. - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 142: 267 - 275
- RENNER, F. & H. DICK (1992): Spinnen in der Nestlingsnahrung von Rabenkrähen. - Arachnol. Mitt. 3: 57-58
- SCHÄFER, H. (1966): Spinnentiere. In: H. SCHÄFER & O. WITTMANN (Hrsg): Der Istelner Klotz. Zur Naturgeschichte einer Landschaft am Oberrhein. - Natur. u. Landschaftsschutzgebiete Bad-Württ. 4: 458-368
Bemerkung: Alle Arten schon bei MÜLLER & SCHENKEL 1895 genannt
- SCHENKEL, E. (1918): Neue Fundorte einheimischer Spinnen. - Verh. Naturf. Ges. Basel 29: 69-104
- SCHENKEL, E. (1925): Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna von Todtmoos. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 1: 347-353
- SCHMID, G. (1967): Der Feuersee bei Welzheim-Breitenfürst. Die Tierwelt eines Naturdenkmals. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad-Württ. 35: 46 - 88
- SCHMID, G. (1979): Skizzen zur Gliedertierfauna des Grenzacher Horns. 8. Spinnen. In: Der Buchswald bei Grenzach (Grenzacher Horn). - Natur. u. Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 9: 398-408
Bemerkung: Alle Arten schon bei MÜLLER & SCHENKEL 1895 genannt
- SCHNEIDER, P. A. (1968): Die Tierwelt des Wurzacher Fledes. In: R. GERMAN (Hrsg): Bad Wurzach. Ein naturkundlicher Führer durch die Umgebung. Schweizerbart, Stuttgart. 75 S.
Bemerkung: Nur der Fund von *Argyroneta aquatica* wurde berücksichtigt
- SIEPE, A. (1985): Einfluß häufiger Überflutungen auf die Spinnen-Besiedlung am Oberrhein-Ufer. - Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent. 4: 281-284
- STADLER, H. & E. SCHENKEL (1940): Die Spinnentiere Mainfrankens. - Mitt. naturwiss. Museum Aschaffenburg 2: 1-58
- STÄRK, O. J. (1976): Über Besonderheiten und Seltenheiten aus der Fauna von Baden-Württemberg. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43: 170-214
Bemerkung: *Arglope* und *Eresus* ohne genaue Fundortangaben genannt
- STRAND, E. (1907a): Spinnen aus dem Zoologischen Institut in Tübingen. - Zool. Jahrb. Syst. 24: 391-468
- STRAND, E. (1907b): Spinnen aus dem Zoologischen Institut in Tübingen. - Mitt. Nat.-Kab. Stuttgart 44: 391-468
Bemerkung: Separat gebundener Sonderdruck von STRAND 1907a
- STRAND, E. (1916): XI. Einige Spinnen gesammelt von Herrn K. HEYN in Württemberg. In: STRAND, E.: Arachnologica varia X-XIII. - Arch. Naturgesch. 1916 (A): 118
- THALER, K. & H. HÖFER (1988): Eine weitere Art der Gattung *Centromerus* DAHL 1886 in Mitteleuropa: *C. sp. prope subcaecus* KULCZYNSKI 1914 (Arachnida. Araneae: Linyphiidae). - Senckenbergiana biol. 68: 389-396
- TÖPFER-HOFMANN, G. & J. FISCHER (1991): Wiederfunde der Springspinne *Carthotus xanthogramma* (LATREILLE, 1819) in Bayern. - Arachnol. Mitt. 2: 33-34
Bemerkung: Funde in Baden-Württemberg sind Zitate aus MÜLLER & SCHENKEL 1895 und BÖSENBERG 1903
- WESOLOWSKA, W. (1986): A revision of the genus *Heliophanus* C. L. KOCH, 1833 (Aranei: Salticidae). - Ann. zool. 40: 1-254

- WIEHLE, H. (1937): Spinnentiere oder Arachnoidea. VIII: Theridiidae. In: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meerestelle. 33. Teil. G. Fischer, Jena. S. 119-221
- WIEHLE, H. (1953): Spinnentiere oder Arachnoidea. IX. Orthognatha - Cribellatae - Haplogyne - Entelegyne (Pholcidae, Zodariidae, Oxyopidae, Mimetidae, Nesticidae). In: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresstelle. 42. Teil. G. Fischer, Jena. 150 S.
- WIEHLE, H. (1956): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) X: 28. Familie - Linyphiidae. In: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresstelle. 44. Teil.: G. Fischer, Jena. 337 S.
- WIEHLE, H. (1960a): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) XI: 30. Familie - Micryphantidae. In: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresstelle. 47. Teil. G. Fischer, Jena. 620 S.
- WIEHLE, H. (1960b): Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna I. - Zool. Jb. Syst. 88: 195-254
Bemerkung: *Theridion boesenbergi* ist Zitat aus LESSERT 1910
- WIEHLE, H. (1961): Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna II. - Mitt. Zool. Mus. Berlin, 37: 171-188
- WIEHLE, H. (1963): Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna III. - Zool. Jb. Syst. 90: 227-298
- WIEHLE, H. (1965): Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna IV. - Mitt. Zool. Mus. Berlin 41: 11-57
- WIEHLE, H. (1967): Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna V. - Senckenbergiana biol. 48: 1-36
- WOLF, A. (1988a): Die Sackspinne *Cheiracanthium pennyi* als Wirt der Schlupfwespe *Zaglytus varipes*. - carollina 46: 145-146
Bemerkung: Arten sind Auszug aus WOLF 1989
- WOLF, A. (1988b): *Cheiracanthium punctorium* - Portrait einer berühmten Spinne. - Natur und Museum 118(10): 310-317
Bemerkung: Arten sind Auszug aus WOLF 1989
- WOLF, A. (1989): Zur Verbreitung, Biotopbindung und Gefährdung von Dornfingerspinnen (*Cheiracanthium* C. L. KOCH, 1839) der nordbadischen Rheinebene (Araneae: Clubionidae). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65: 225-280
- WOLF, A. (1990a): Taxonomical studies on *Cheiracanthium erraticum* (WALCKENAER, 1802) and *Cheiracanthium pennyi* O. P.-CAMBRIDGE, 1873 (Araneae, Clubionidae). - Zool. Beitr. N.F. 33: 233-245
Bemerkung: Arten sind Auszug aus WOLF 1989
- WOLF, A. (1990b): The silken nests of the clubionid spiders *Cheiracanthium pennyi* and *Cheiracanthium punctorium* (Araneae, Clubionidae). - Acta Zool. Fennica 190: 397-404
Bemerkung: Arten sind Auszug aus WOLF 1989
- WOLF, A. & P. ZIMMERMANN (1991): Flora und Fauna des geplanten Naturschutzgebietes "Kalkofen" (Enzkreis, Gemeinde Mönshelm). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66: 311-362
- WUNDERLICH, J. (1972a): Zur Spinnenfauna Deutschlands, XII. Neue und seltene Arten der Linyphiidae und einige Bemerkungen zur Synonymie (Arachnida: Araneae). - Senckenbergiana biol. 53: 291-306

- WUNDERLICH, J. (1972b): Zur Kenntnis der Gattung *Walckenaeria* BLACKWALL 1833 unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Subgenera und Arten (Arachnida: Araneae: Linyphidae). - Zool. Beiträge N. F. 18: 371-427
- WUNDERLICH, J. (1973a): Zur Spinnenfauna Deutschlands, XIII. Zwei für Deutschland neue Spinnenarten aus dem Natuschutzgebiet "Wollmatinger Fled" bei Konstanz (Arachnida: Araneae: Therididae und Dictynidae). - Senckenbergiana biol. 54: 179-180
- WUNDERLICH, J. (1973b): Einige seltene Spinnenarten vom Hloh-See bei Wildbad im Schwarzwald (Arachnida: Araneae). - Zool. Beiträge N. F. 19: 393-395
- WUNDERLICH, J. (1973c): Zur Spinnenfauna Deutschlands, XV. Weitere seltene und bisher unbekannte Arten sowie Anmerkungen zur Taxonomie und Synonymie (Arachnida: Aranea). - Senckenbergiana biol. 54: 405-428
- WUNDERLICH, J. (1974): Ein Beitrag zur Synonymie einheimischer Spinnen (Arachnida: Araneae). - Zool. Beiträge N. F. 20: 159-176
- WUNDERLICH, J. (1975): Spinnen vom Kaiserstuhl (Arachnida: Araneae). - Ent. Germ. 1 (3/4): 381-386
- WUNDERLICH, J. (1976): Zur Spinnenfauna Deutschlands, XVI. Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattungen *Enoplognatha* PAVESI und *Robertus* O.PICK.-CAMBRIDGE (Araneida: Therididae). - Senckenbergiana biol. 57: 97-112
- WUNDERLICH, J. (1979): Revision der europäischen Arten der Gattung *Micaria* WESTRING 1851, mit Anmerkungen zu den übrigen paläarktischen Arten (Arachnida: Araneida: Gnaphosidae). - Zool. Beiträge N. F. 25: 233-341
- WUNDERLICH, J. (1980a): Drei Arten der Gattung *Zodariion* WALCKENAER 1847 aus Nordjugoslawien (Arachnida: Araneae: Zodariidae). - Senckenbergiana biol. 61: 113-117
- WUNDERLICH, J. (1980b): Drei neue Linyphidae-Genera aus Europa. - Senckenbergiana biol. 61: 119-125
- WUNDERLICH, J. (1982): Mitteleuropäische Spinnen (Araneae) der Baumrinde. - Z. ang. Ent. 94: 9-21
Bemerkungen: Fundorte teilweise durch WUNDERLICH (in litt.) präzisiert.
- WUNDERLICH, J. (1984): Beschreibung der Wolfspinne *Pardosa pseudolugubris* n. sp. und Revision der *Pardosa amentata*-Gruppe, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der innerartlichen Variabilität bei Spinnen (Arachnida: Araneae: Lycosidae). - Neue entomologische Nachrichten 10: 1-15
- WUNDERLICH, J. (1986): Spinnenfauna gestern und heute. Fossile Spinnen und ihre heute lebenden Verwandten. Erich Bauer bei Quelle & Meyer, Wiesbaden. 283 S.
Bemerkung: *Mastigusa arietina* bei HANDKE & SCHREIBER 1985 genannt.
- ZIER, L. (1985): Das Pfurger Fled. Entstehung und Ökologie eines oberschwäbischen Feuchtgebietes. - Führer Natur- u. Landschaftsschutzgeb. Bad.-Württ. 10: 1-308
- ZIMMERMANN, P. (1987): Dachbegrünung. Eine ökologische Untersuchung auf Kledach, extensiv und intensiv begrünten Dächern. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 62: 517-549
Bemerkung: Bestimmung nur bis auf Familienniveau
- ZSCHOKKE, F. (1911): Die Tierwelt der Umgebung von Basel. Helbing & Lichtenhahn, Basel.
Bemerkung: Alle Arten schon bei MÜLLER & SCHENKEL 1895 genannt

LISTE DER SPINNEN BADEN-WÜRTTEMBERGS

Für die Artenliste wurden alle in der Bibliographie genannten Arbeiten ausgewertet, bei denen unter "Bemerkung" nichts anderes vermerkt ist. Zu jeder Art werden in der Liste alle Zitate angeführt, in denen ein konkreter Fundort oder eine Region (z. B. Schwarzwald) genannt sind. Angaben wie "häufig und weitverbreitet" wurden nicht berücksichtigt. Weiterhin wurde in Klammern das Synonym angeführt, unter welchem die Art in der Arbeit genannt ist. Das soll einerseits die Transparenz der Liste erhöhen, andererseits ein Wiederfinden in der entsprechenden Arbeit erleichtern. Wenn Arten eines Fundortes von mehreren Autoren zitiert wurden, so ist nur das Erstzitat in der Liste genannt (Beispiel: *Ceratinopsis stativa* wurde von MÜLLER & SCHENKEL 1895 erwähnt; WIEHLE 1960a: 253 zitiert MÜLLER & SCHENKEL 1895 und wurde deshalb nicht aufgeführt. Vgl. auch Bemerkung bei HUBER 1917).

Zur Vervollständigung des Arteninventars sind auch unpublizierte Funde in die Artenliste aufgenommen. Es ist jeweils die Sammlung (Coll.) genannt, in der sich Belegmaterial befindet. Hierbei wurde wie folgt verfahren: Bei bislang noch nicht publizierten Arten sind maximal 3 Belege genannt, von denen die Mitarbeiter Belegmaterial oder Kenntnis haben. Daher ist die Auswahl der Belege subjektiv und die Aufzählung der Belege nicht vollständig - dennoch dürfte das Arteninventar vollständig erfaßt sein. Literaturachweise vor 1960 wurden durch Nennung von maximal 3 Sammlungsbelegen aktueller unpublizierter Funde ergänzt. Bei Arten, von denen nach 1960 nur 1 oder 2 Zitate vorlagen, sind ebenfalls bis zu 3 Sammlungsbelege ergänzend aufgeführt.

Der Informationsgehalt der Zitate ist unterschiedlich zu bewerten. DOBAT (1975) führt mehr als 60 Fundorte von *Meta menardi* an. In der Liste wird das Zitat jedoch nur einmal genannt. Andererseits haben verschiedene Autoren im gleichen Gebiet gearbeitet und ihre Funde publiziert, so daß sich bei manchen Arten hinter mehreren Zitaten nur ein Fundort verbergen kann (z.B. *Taranucus setosus*).

Die Liste versteht sich als Instrument, welches das Arteninventar von Baden-Württemberg vorstellt und angibt, in welchen Quellen mehr Informationen zu den einzelnen Arten bzw. Fundumständen gefunden werden können.

Die Nomenklatur und Reihenfolge der Familien folgt MAURER & HÄNGGI (1990) bzw. HEIMER & NENTWIG (1991) (vgl. dazu auch BLICK & SCHEIDLER 1991).

FAMILIE LINYPHIIDAE (LINYPHIINAE UND ERIGONINAE)
BALDACHINSPINNEN UND ZWERGSPINNEN

Abacoproeces saltuum (L. KOCH, 1872)
BÖSENBERG 1903, Coll. HARMS

Acartauchenius scurrills (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)
BÖSENBERG 1903, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895,
WIEHLE 1960a

Agyneta cauta (O. P.-CAMBRIDGE, 1902)
Coll. HARMS, Coll. RENNER, Coll. ROSE

Agyneta conigera (O. P.-CAMBRIDGE, 1870)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Microneta conigera*),
HÖFER 1989

Agyneta ramosa JACKSON, 1912
BAEHR 1983a, GACK & KOBEL-VOSS 1983

Agyneta subtilis (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)
BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903 (*Microneta anomala*), RENNER & TRAUTNER 1987

Allomengea vidua (L. KOCH, 1879)
BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983 (*Mengea warburtoni*), HOFFMANN
1980, NÄHRIG 1990a
Synonym: *Allomengea warburtoni*

Aphileta misera (O. P.-CAMBRIDGE, 1882)
HOFFMANN 1980 (*Hillhousia misera*), WUNDERLICH 1973c (*Hillhousia misera*)

Araeoncus crassiceps (WESTRING, 1861)
HOFFMANN 1980, NÄHRIG 1987

Araeoncus humilis (BLACKWALL, 1841)
BAUER 1982, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966,
KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

Asthenargus helveticus SCHENKEL, 1936
HÖFER 1989

Asthenargus paganus (SIMON, 1884)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966,
KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978

Bathyphantes approximatus (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980,
NÄHRIG 1990a, SCHMID 1967

Bathyphantes eumenis (L. KOCH, 1879)

BLICK 1991b

Bathyphantes gracilis (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903 (*Bathyphantes
circumspectus*), DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989,
KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895,
NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, WIEHLE 1956, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Bathyphantes nigrinus (WESTRING, 1851)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966,
HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895,
NÄHRIG 1990a, SCHMID 1967

Bathyphantes parvulus (WESTRING, 1851)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE &
SCHREIBER 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985

Bathyphantes similis KULCZYNSKI, 1894

WUNDERLICH 1972a, WUNDERLICH 1973b

Bolyphantes alticeps (SUNDEVALL, 1832)

BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, HARMS 1978, LAMPARSKI 1988

Bolyphantes crucifer (MENGE, 1866)

BAEHR 1983a, HARMS 1966

Carorita limnaea (CROSBY & BISHOP, 1927)

KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, WUNDERLICH 1973c

Caviphantes saxetorum (HULL, 1916)

WUNDERLICH 1975 (*Lessertiella saxetorum*)

Centromerita bicolor (BLACKWALL, 1833)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Centromerus bicolor*), CASEMIR 1961,
HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HÖFER 1989,
KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988,
MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tmetiscus bicolor*), RENNER & TRAUTNER 1987

Centromerita conclinna (THORELL, 1875)

HEUBLEIN 1983, Coll. MALTEN, Coll. RENNER, Coll. WOLF

***Centromerus aequalis* (WESTRING, 1851)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tmeticus brevipalpus*), NÄHRIG 1990a

***Centromerus arcanus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1873)**

BAEHR 1983a, HARMS 1966, WUNDERLICH 1973b, ZIER 1985

***Centromerus capuclinus* (SIMON, 1884)**

KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988

***Centromerus cavernarum* (L. KOCH, 1872)**

BAEHR 1983a (*Centromerus jacksoni*), BAEHR & BAEHR 1984 (*Centromerus jacksoni*)

***Centromerus dilutus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)**

DUMPERT & PLATEN 1985 (*Rhabdoria diluta*), LAMPARSKI 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WIEHLE 1958

***Centromerus expertus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)**

BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, HOFFMANN 1980 (*Tallusia experta*), KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tmeticus expertus*)

***Centromerus inclillum* (L. KOCH, 1881)**

BAEHR & BAEHR 1984, HEUBLEIN 1983

***Centromerus incultus* FALCONER, 1915**

HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c

Synonym: *C. alnicola* SCHENKEL, 1936

***Centromerus leruthi* FAGE, 1933**

KOBEL-LAMPARSKI 1987, NÄHRIG 1987, WUNDERLICH 1972, WUNDERLICH 1973c

***Centromerus levitarsis* (SIMON, 1884)**

HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c

***Centromerus pabulator* (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MISIOCH 1977 (*Centromerus pabulator*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tmeticus pabulator*)

***Centromerus persimilis* (O. P.-CAMBRIDGE, 1912)**

BLICK 1991a, KOBEL-LAMPARSKI 1987

***Centromerus prudens* (O. P.-CAMBRIDGE, 1873)**

DUMPERT & PLATEN 1985, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988

Centromerus sellarius (SIMON, 1884)

BÖSENBERG 1903 (sub *C. similis*, HARMS pers. Mitt.), CASEMIR 1961, WIEHLE 1965

Centromerus serratus (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)

DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tmeticus serratus*), RENNER & TRAUTNER 1987

Centromerus sp. prope subcaecus KULCZYNSKI, 1914

HÖFER 1989, THALER & HÖFER 1988

Centromerus subalpinus LESSERT, 1907

LAMPARSKI 1988, WIEHLE 1965

Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tmeticus sylvaticus*), NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, SIEPE 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Ceratinella brevipes (WESTRING, 1851)

BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925

Ceratinella brevis (WIDER, 1834)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895,

Ceratinella scabrosa (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

BAEHR 1983a, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, SIEPE 1985

Ceratinella wideri (THORELL, 1871)

WUNDERLICH 1972

Ceratinopsis austera (SIMON, 1884)

WUNDERLICH 1975 (*Styloctetor austerus*)

Ceratinopsis romana (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)

Coll. HARMS

Synonym: *Sphecozone romana*

Ceratinopsis stativa (SIMON, 1881)

MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Lophomma stativum*), Coll. MALTEN

Cineta gradata (SIMON, 1881)
BÖSENBERG 1903, HÖFER 1989, WIEHLE 1960a

Cnephlocotes obscurus (BLACKWALL, 1834)
BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS
1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985

Cnephlocotes sanguinolentus (WALCKENAER, 1841)
BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895
Synonym: *Nematogmus sanguinolentus*

Dicymbium brevisetosum LOCKET, 1962
BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, NÄHRIG 1987, WOLF &
ZIMMERMANN 1991
Bemerkung: Elnige Autoren (HÄNGGI in MAURER & HÄNGGI 1990, ROBERTS 1987) werten
D. brevisetosum als Form von *D. nigrum*.

Dicymbium nigrum (BLACKWALL, 1834)
BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HOFFMANN
1980, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER &
TRAUTNER 1987

Dicymbium tibiale (BLACKWALL, 1836)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989,
KOBEL-LAMPARSKI 1987

Diplocephalus cristatus (BLACKWALL, 1833)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, HANDKE &
SCHREIBER 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER &
SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SIEPE 1985

Diplocephalus helleri (L. KOCH, 1869)
BAEHR 1983a, WUNDERLICH 1973b

Diplocephalus latifrons (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DUMPERT &
PLATEN 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987,
KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL
1895 (*Plaesiocraerus fallaciosus*), NÄHRIG 1987, ZIER 1985

Diplocephalus permixtus (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984

Diplocephalus picinus (BLACKWALL, 1841)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985,
GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HÖFER
1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988,
MISIOCH 1977, NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, ZIER 1985

Diplostyla concolor (WIDER, 1834)

ALBERT et al. 1987, BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984 (*Bathyphantes concolor*), BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983 (*Stylophora concolor*), HARMS 1966 (*Stylophora concolor*), HEUBLEIN 1980 (*Bathyphantes concolor*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Stylophora concolor*), KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHMID 1967, SIEPE 1985

Dismodicus bifrons (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHMID 1967

Dismodicus elevatus (C. L. KOCH, 1838)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, DETTNER 1985, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Donacochara speciosa (THORELL, 1875)

LEIST 1978, WUNDERLICH 1973c

Drapetisca socialis (SUNDEVALL, 1832)

BAEHR 1983a, BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HARMS 1966, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895

Drepanotylus uncatus (O. P.-CAMBRIDGE, 1873)

BÖSENBERG 1903 (*Hilaira uncata*), HARMS 1987

Entelecara acuminata (WIDER, 1834)

BAEHR 1983a, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903 (*Entelecara altifrons*), HARMS 1966, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Entelecara berollnensis (WUNDERLICH 1969)

WUNDERLICH 1982

Synonym: *Araeoncoldes berollnensis*

Entelecara congenera (O. P.-CAMBRIDGE, 1879)

HARMS 1966, HÖFER 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Entelecara erythropus (WESTRING, 1851)

BÖSENBERG 1903, NÄHRIG 1990a, SCHENKEL 1925, Coll. HARMS

Synonym: *Entelecara media* sensu WIEHLE 1960a

Entelecara flavipes (BLACKWALL, 1834)

BAEHR 1983a, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Eperigone trilobata (EMERTON, 1882)

DUMPERT & PLATEN 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988

Bemerkung: Die Art wurde aus Nordamerika eingeschleppt (MILLIDGE 1987). Weitere Nachweise: Coll. MALTEN, Coll. WUNDERLICH und MAURER & HÄNGGI 1990

***Erigone atra* BLACKWALL, 1833**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, CASEMIR 1961, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, RENNER & TRAUTNER 1987, SIEPE 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985

***Erigone dentipalpis* (WIDER, 1834)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1925, SIEPE 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985

***Erigone longipalpis* (SUNDEVALL, 1830)**

Coll. DUMPERT

***Erigone jaegeri* BAEHR, 1984**

BAEHR 1984

***Erigonella hiemalis* (BLACKWALL, 1841)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985 (*Diplocephalus hiemalis*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985 (*Diplocephalus hiemalis*), HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Erigonella ignobilis* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)**

HEUBLEIN 1980, HOFFMANN 1980 (*Diplocephalus ignobilis*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Troxochrus ignobilis*)

***Erigonopus globipes* (L. KOCH, 1872)**

BAEHR & BAEHR 1984 (*Erigonopterna globipes*), GACK & KOBEL-VOSS 1983 (*Erigonopterna globipes*), HARMS 1966

***Floronia bucculenta* (CLERCK, 1757)**

GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Frontina frenata*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Linyphia bucculenta*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Frontinellina frutetorum* (C. L. KOCH, 1834)**

HÖFER 1989, DUMPERT & PLATEN 1985 (*Linyphia frutetorum*), HARMS 1966 (*Linyphia frutetorum*), STRAND 1907a (*Linyphia frutetorum*)

***Glyphesis servulus* (SIMON, 1881)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Minyriolus servulus*), WIEHLE 1960a, WIEHLE 1965, ZIER 1985

***Gnathonarium dentatum* (WIDER, 1834)**

BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, MIOTK 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Gongyldium dentatum*), NÄHRIG 1990a, SCHMID 1967, ZIER 1985

***Gonatium hilare* (THORELL, 1875)**

Coll. ROSE

***Gonatium paradoxum* (L. KOCH 1869)**

HEUBLEIN 1983, MISIOCH 1977

Synonym: *Gonatium corallipes*

***Gonatium rubellum* (BLACKWALL, 1841)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985 (*Gonatium isabellinum*), HARMS 1966, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, MIOTK 1983, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925 (*Gonatium isabellinum*), ZIER 1985

***Gonatium rubens* (BLACKWALL, 1833)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, MISIOCH 1977, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Gongyldiellum latebricola* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)**

BAEHR 1983a, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966 (*Gonatium latebricola*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, ZIER 1985

***Gongyldiellum murcidum* SIMON, 1884**

BAEHR 1983a, BAUER 1982, DUMPERT & PLATEN 1985, NÄHRIG 1990a

***Gongyldiellum vivum* (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)**

Coll. HARMS, Coll. MALTEN

***Gongyldium rufipes* (LINNAEUS, 1758)**

BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a

***Halorates distinctus* (SIMON, 1884)**

Coll. HARMS

***Helophora insignis* (BLACKWALL, 1841)**

BAEHR & BAEHR 1984, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985

Hlalra excisa (O. P.-CAMBRIDGE, 1870)

BAEHR 1983a, LAMPARSKI 1988

Hylyphantes graminicola (SUNDEVALL, 1829)

HARMS 1968 (*Erigonidium graminicola*), HÖFER 1989, LEIST 1978 (*Erigonidium graminicola*),
MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Gongyldium graminicola*)

Hylyphantes nigrilus (SIMON, 1881)

BAUER 1982 (*Hylyphantes nigrilulus*), BÖSENBERG 1903 (*Porthomma nigrila*), HARMS
1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918

Hypomma bituberculatum (WIDER, 1834)

BAUER 1982, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, LEIST 1978 (*Enidla bituberculata*)

Hypomma cornutum (BLACKWALL, 1833)

HARMS 1966 (*Enidla cornuta*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Gonatium cornutum*)

Hypomma fulvum (BOESENBERG, 1902)

BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983 (*Enidla fulva*), HOFFMANN 1980

Hypocephalus pusillus (MENGE, 1866)

MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Cnephalocotes pusillus*)

Jacksonella falconeri (JACKSON, 1908)

BAEHR 1983a, BAEHR 1985a (*Asthenargus falconeri*), DUMPERT & PLATEN 1985,
KOBEL-LAMPARSKI 1987, WUNDERLICH 1972, WUNDERLICH 1973c

Kaestneria dorsalis (WIDER, 1834)

BÖSENBERG 1903 (*Bathyphantes dorsalis*), HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895
(*Bathyphantes dorsalis*), NÄHRIG 1987

Kaestneria pullata (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)

HARMS 1987

Labulla thoracica (WIDER, 1834)

BÖSENBERG 1903, DOBAT 1975a, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL
1925, STADLER & SCHENKEL 1940

Laslargus hirsutus (MENGE, 1869)

BAEHR 1983a, HARMS 1966, LEIST 1978, WIEHLE 1965

Latithorax faustus (O. P.-CAMBRIDGE, 1900)

BAUCHHENS, DEHLER & SCHOLL 1987, Coll. HARMS, Coll. MALTEN

Lepthyphantes alacris (BLACKWALL, 1853)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, DETTNER 1985, DUMPERT &
PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985,
LAMPARSKI 1988

***Lepthyphantes angulipalpis* (WESTRING, 1851)**

HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Lepthyphantes cristatus* (MENGE, 1866)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925, ZIER 1985

***Lepthyphantes ericaeus* (BLACKWALL, 1853)**

BAEHR 1983a, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988

***Lepthyphantes expunctus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)**

LAMPARSKI 1988

***Lepthyphantes flavipes* (BLACKWALL, 1854)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Lepthyphantes tenebricola*), HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, NÄHRIG 1990a, ZIER 1985

***Lepthyphantes insignis* O. P.-CAMBRIDGE, 1913**

KOBEL-LAMPARSKI 1987, WIEHLE 1965

***Lepthyphantes keyserlingi* (AUSSENER, 1867)**

BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, WUNDERLICH 1973c

***Lepthyphantes leprosus* (OHLERT, 1865)**

HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, RENNER & TRAUTNER 1987

***Lepthyphantes leptyphantiformis* (STRAND, 1907)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a (*Lepthyphantes pisa*), DUMPERT & PLATEN 1985, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, WIEHLE 1965 (*Lepthyphantes pisa*), WUNDERLICH 1972 (*Troglohyphantes* (= *Lepthyph.*) *pisa*), WUNDERLICH 1973c (*Lepthyphanthes pisa*), WUNDERLICH 1974

***Lepthyphantes mansuetus* (THORELL, 1875)**

BAEHR 1983a, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Lepthyphantes bidens*), SCHENKEL 1925

***Lepthyphantes mengel* KULCZYNSKI, 1887**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Lepthyphantes minutus (BLACKWALL, 1833)
BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HÖFER
1989, LAMPARSKI 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

Lepthyphantes monticola (KULCZYNSKI, 1881)
GACK & KOBEL-VOSS 1983

Lepthyphantes nebulosus (SUNDEVALL, 1830)
Coll. HARMS, Coll. ROSE

Lepthyphantes nitidus (THORELL, 1875)
WUNDERLICH 1974 (*Lepthyphantes kochi*), Coll. HARMS

Lepthyphantes nodifer SIMON, 1884
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI
et al. 1985, LAMPARSKI 1988, WIEHLE 1965

Lepthyphantes notabilis KULCZYNSKI, 1887
BLICK 1991b

Lepthyphantes obscurus (BLACKWALL, 1841)
BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, HARMS 1966 (*Lepthyphantes cf. obscurus*), HÖFER
1989, SCHENKEL 1925 (*Lepthyphantes obscura*), WIEHLE 1956

Lepthyphantes pallidus (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK
& KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983,
HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI
1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WIEHLE 1965,
ZIER 1985

Lepthyphantes loricaticola (WIDER, 1834)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, GACK & KOBEL-VOSS 1983,
HARMS 1966 (*Lepthyphantes arcuatus*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI
et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

Lepthyphantes tenuis (BLACKWALL, 1852)
BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN
1980, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al.
1985, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, RENNER &
TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1918, SCHMID 1967

Lepthyphantes zimmemanni BERTKAU, 1890
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS
1983, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI
1988, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Lepthyphantes zebrinus*)

Leptorhoptrum robustum (WESTRING, 1851)

BÖSENBERG 1903 (*Leptorhoptrum huthwaithii*), HARMS 1966, NÄHRIG 1990a, SIEPE 1985

Linyphia hortensis SUNDEVALL, 1830

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HAFNER 1991, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Linyphia triangularis (CLERCK, 1757)

BAEHR 1983a, BELLMANN 1984, DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1970, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985

Lophomma punctatum (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987

Macrargus carpenteri (O. P.-CAMBRIDGE, 1894)

DUMPERT & PLATEN 1985 (*Macrargus excavatus*)

Macrargus rufus (WIDER, 1834)

BAEHR 1983a, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tmeticus rufus*), ZIER 1985

Maro minutus O. P.-CAMBRIDGE, 1906

HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, NÄHRIG 1987

Maso gallicus SIMON, 1894

Coll. HARMS

Maso sundevalli (WESTRING, 1851)

BAEHR 1983a, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DETTNER 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, NÄHRIG 1987

Mecopisthes silus (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)

LEIST 1978

Mecynargus foveatus (DAHL, 1912)

KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Rhaebothorax foveolatus*), LUNAU & RUPP 1988 (*Rhaebothorax foveolatus*)

Bemerkung: Zur Synonymie von *Mecynargus* KULCZYNSKI, 1894 und *Rhaebothorax* SIMON, 1926 vgl. PLATNICK 1989.

Meloneta beata (O. P.-CAMBRIDGE, 1906)

BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985 (*Agyneta affinis*), WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985

Meloneta fuscipalpis (C. L. KOCH, 1836)

BÖSENBERG 1903 (*Micryphantès fuscipalpis*), Coll. HARMS

Meloneta gulosa (L. KOCH, 1869)

CASEMIR 1961

Meloneta innotabilis (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)

HÖFER 1989 (*Syedrella innotabilis*), Coll. HARMS

Meloneta mollis (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

DUMPERT & PLATEN 1985 (*Agyneta mollis*), HARMS 1966, WIEHLE 1956

Meloneta rurestris (C. L. KOCH, 1836)

BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903 (*Micryphantès rurestris*), CASEMIR 1961, DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985 (*Agyneta rurestris*), HANDKE & SCHREIBER 1985 (*Agyneta rurestris*), HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MISIOCH 1977 (sub. *Meloneta gulosa*, HARMS rev. In litt.), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Microneta rurestris*), NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHMID 1967, SIEPE 1985, ZIER 1985

Meloneta saxatilis (BLACKWALL, 1844)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989

Meloneta simplicitaris (SIMON, 1894)

Coll. HARMS

Metopobactrus prominulus (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983

Micrargus herbigradus (BLACKWALL, 1854)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Lophomma herbigrada*), NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, SCHMID 1967, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985 (*Micrargus herbigradus* s. str.)

Micrargus subaequalis (WESTRING, 1851)

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Lophomma laudatum*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, RENNER & TRAUTNER 1987

Synonym: *Nothocyba subaequalis*

Microctenonyx subitaneus (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)

WIEHLE 1965 (*Aulacocyba subitanea*), Coll. ROSE

Microlinyphia impligra (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c (*Limyphia (Microlinyphia) impligra*)

Microlinyphia pusilla (SUNDEVALL, 1830)

HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, SCHENKEL 1925

Microneta viaria (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984 (*Meloneta varia*), BÖSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

Minicia marginella (WIDER, 1834)

BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, HÖFER 1989, MISIOCH 1977, WIEHLE 1965

Minyriolus pusillus (WIDER, 1834)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925

Mloxena blanda (SIMON, 1884)

HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Gongylidellum blandum*)

Moebella penicillata (WESTRING, 1851)

BAEHR 1983a, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Styloctetor penicillatus*)
Synonym: *Entelecara penicillata*

Monocephalus castanelpes (SIMON, 1884)

DUMPERT & PLATEN 1985, WIEHLE 1965

Monocephalus fuscipes (BLACKWALL, 1836)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988

Nerlene clathrata (SUNDEVALL, 1830)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHMID 1967, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Nerlene emphana* (WALCKENAER, 1842)**

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, HAFNER 1991, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985 (*Prolinyphla emphana*), MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985

***Nerlene montana* (CLERCK, 1757)**

HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, LEIST 1978, NÄHRIG 1987, STRAND 1907a, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Nerlene peltata* (WIDER, 1834)**

BAEHR 1983a, DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983 (*Prolinyphla peltata*), HARMS 1966, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Nerlene radlata* (WALCKENAER, 1841)**

BAEHR 1983a, DETTNER 1985, DOBAT 1975a, HAFNER 1991 (*Linyphla marginata*), HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Linyphla marginata*), STRAND 1907a (*Linyphla marginata*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Notloscopus sarcinatus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)**

DETTNER 1985, HOFFMANN 1980, MÜLLER & SCHENKEL 1895

***Oedothorax agrestis* (BLACKWALL, 1853)**

BÖSENBERG 1903 (*Kulczynskiellum agreste*), DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987

***Oedothorax apicatus* (BLACKWALL, 1850)**

BÖSENBERG 1903 (*Kulczynskiellum apicatum*), HANDKE & SCHREIBER 1985, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MIOTK 1983, NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a, RENNER & TRAUTNER 1987, SIEPE 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Oedothorax fuscus* (BLACKWALL, 1834)**

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903 (*Kulczynskiellum fuscum*), HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Gongyldium fuscum*), NÄHRIG 1990a, SIEPE 1985, ZIER 1985

***Oedothorax glbbosus* (BLACKWALL, 1841)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980

Synonym: *Oedothorax tuberosus*

***Oedothorax retusus* (WESTRING, 1851)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Kulczynskiellum retusum*), GACK & KOBEL-VOSS 1983, MISIOCH 1977, NÄHRIG 1990a, SIEPE 1985

***Oreonetides quadridentatus* (WUNDERLICH, 1972)**

WUNDERLICH 1972 (*Centromerus ? quadridentatus*)

Ostearius melanopygius (O. P.-CAMBRIDGE, 1879)

KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LUNAU & RUPP 1988

Panamomops affinis MILLER & KRATOCHVIL, 1939

BAEHR 1983a, WIEHLE 1967

Panamomops inconspicuus (MILLER & VALESOVA, 1964)

BAEHR & BAEHR 1984, WUNDERLICH 1972, WUNDERLICH 1973c

Panamomops mengel SIMON, 1926

Coll. HARMS

Panamomops sulcifrons (WIDER, 1834)

BAEHR & BAEHR 1984, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, WIEHLE 1960a

Pelecopsis elongata (WIDER, 1834)

HÖFER 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Pelecopsis nemoralis (BLACKWALL, 1841)

WOLF & ZIMMERMANN 1991

Pelecopsis parallela (WIDER, 1834)

BAEHR 1983a, BAUER 1982, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980 (*Lophocarenum par.*),
KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Lophocarenum
parallellum*)

Pelecopsis radialis (L. KOCH, 1875)

BÖSENBERG 1903 (*Lophocarenum thoracatum*), HEUBLEIN 1983

Peponocranlum orbiculatum (O. P.-CAMBRIDGE, 1882)

BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966

Pityohyphantes phrygianus (C. L. KOCH, 1836)

BÖSENBERG 1903 (*Linyphia phrygiana*), HARMS 1966, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988,
SCHENKEL 1925

Pocadicnemis carpathica (CHYZER, 1894)

BAEHR 1983a, WIEHLE 1967 (*Maso spinipes*)

Pocadicnemis juncea LOCKET & MILLIDGE, 1953

BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983

Pocadicnemis pumila (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985,
HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987,
NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Poeciloneta globosa (WIDER, 1834)

BÖSENBERG 1903 (*Poeciloneta variegata*), NÄHRIG 1987

Porrhomma campbelli F. O. P.-CAMBRIDGE, 1894

BAEHR 1983a, HÖFER 1989

Porrhomma convexum (WESTRING, 1861)

BAEHR & BAEHR 1984, DOBAT 1975a, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Porrhomma errans*, rev. THALER 1968)

Porrhomma egeria SIMON, 1884

DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, WUNDERLICH 1973b

Porrhomma errans (BLACKWALL, 1841)

BAEHR 1983a

Porrhomma lativela TRETZEL, 1956

HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988 (*Porrhomma microphthalmum lativela*)

Porrhomma microphthalmum (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987

Porrhomma oblitum (O. P.-CAMBRIDGE, 1870)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DUMPERT & PLATEN 1985

Porrhomma pallidum JACKSON, 1913

BAEHR 1983a, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988

Porrhomma pygmaeum (BLACKWALL, 1834)

BAEHR 1983a, BAUER 1982, BÖSENBERG 1903, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, NÄHRIG 1990a

Porrhomma rosenhaueri (L. KOCH, 1872)

BELLMANN 1984, DOBAT 1975a, HARMS 1978, WIEHLE 1956, WIEHLE 1965

Prinerigone vagans (AUDOUIN, 1826)

SIEPE 1985 (*Erigone vagans*)

Bemerkung: vgl. MILLIDGE 1988

Pseudocarorita thaleri (SAARISTO, 1971)

BAEHR 1983a (*Maro thaleri*), DUMPERT & PLATEN 1985, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, WUNDERLICH 1972, WUNDERLICH 1980

***Saarlstoia abnormis* (BLACKWALL, 1841)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Lephyphantes abnormis*),
DETTNER 1985, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN
1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI
1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Tmecticus abnormis*), NÄHRIG 1987, ZIER 1985

Synonym: *Oreonetides abnormis*

***Saarlstoia firma* (O. P.-CAMBRIDGE, 1901)**

Coll. HARMS

***Saloca diceros* (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985,
GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987,
KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895
(*Panamomops diceros*)

***Satlatlas britteni* (JACKSON, 1912)**

Coll. HARMS

***Savignia frontata* (BLACKWALL, 1833)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903 (*Diplocephalus frontatus*)

***Scotargus pilosus* SIMON, 1913**

LAMPARSKI 1988

***Silometopus bonessi* CASEMIR, 1970**

HEUBLEIN 1983, WUNDERLICH 1972, WUNDERLICH 1973c

***Silometopus elegans* (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)**

BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, HOFFMANN 1980

***Silometopus reussi* (THORELL, 1871)**

DUMPERT & PLATEN 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988 (*Silometopus
interjectus*), WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Sintula cornigera* (BLACKWALL, 1856)**

CASEMIR 1961, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WIEHLE 1965,
WUNDERLICH 1973b

***Stemonyphantes lineatus* (LINNAEUS, 1758)**

BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985,
HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP
1988, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Syedra gracilis* (MENGE, 1869)**

KOBEL-LAMPARSKI 1987

***Tapinocyba insecta* (L. KOCH, 1869)**

BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987

***Tapinocyba pallens* (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HÖFER 1989, KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988

***Tapinocyba praecox* (O. P.-CAMBRIDGE, 1873)**

Coll. HARMS, Coll. MALTEN

***Tapinocyboides pygmaea* (MENGE, 1869)**

BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WIEHLE 1960a

***Tapinopa longidens* (WIDER, 1834)**

BAEHR 1983a, CASEMIR 1961, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985

***Taranucnus setosus* (O. P.-CAMBRIDGE, 1863)**

HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c

***Theonina cornix* (SIMON, 1881)**

BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, WIEHLE 1965, WUNDERLICH 1972, WUNDERLICH 1973c

***Thyreosthenius parasiticus* (WESTRING, 1851)**

KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Plaeslocraerus beckii*)

***Tiso vagans* (BLACKWALL, 1834)**

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, NÄHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

***Trematocephalus cristatus* (WIDER, 1834)**

BÖSENBERG 1903 (*Trematocephalus perforatus*), HARMS 1966, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Gongyldium cristatum*), NÄHRIG 1987

***Trichoncus affinis* KULCZYNSKI, 1894**

BÖSENBERG 1903, Coll. HARMS

***Trichoncus saxicola* (O. P.-CAMBRIDGE, 1861)**

WUNDERLICH 1972, WUNDERLICH 1973c

***Trichoncus sordidus* SIMON, 1884**

WIEHLE 1967

***Trichoncus hackmani* MILLIDGE, 1955**

Coll. HARMS

Trichopterna cito (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)

MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Lophocarenum blackwalli*), MÜLLER & SCHENKEL 1895,
Coll. HARMS

Trichopterna thorelli (WESTRING, 1861)

HOFFMANN 1980

Troxochrus nasutus SCHENKEL, 1925

BAEHR 1983a, HÖFER 1989, LAMPARSKI 1988, SCHENKEL 1925

Troxochrus scabriculus (WESTRING, 1851)

BÖSENBERG 1903, HÖFER 1989, SIEPE 1985

Typhochrestus digitatus (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)

Coll. HARMS

Typhochrestus simoni LESSERT, 1907

WUNDERLICH 1973c, WUNDERLICH 1975

Walckenaeria acuminata BLACKWALL, 1833

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BELLMANN 1984, HARMS 1966, HOFFMANN 1980,
HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LEIST 1978, MÜLLER &
SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

Walckenaeria alticeps (DENIS, 1952)

WUNDERLICH 1972, ZIER 1985

Synonym: *Wideria alticeps*

Walckenaeria antica (WIDER, 1834)

BAEHR & BAEHR 1984, DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE &
SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST
1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WUNDERLICH 1972

Synonym: *Wideria antica*

Walckenaeria atrotibialis O. P.-CAMBRIDGE, 1878

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HEUBLEIN 1980, HOFFMANN 1980, HÖFER 1989,
LAMPARSKI 1988, ZIER 1985

Synonym: *Wideria atrotibialis*

Walckenaeria capito (WESTRING, 1861)

BAEHR 1983a, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987

Synonym: *Wideria capito*

Walckenaeria corniculans (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)

ALBERT et al. 1987, BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985,
GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-

LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987

Synonym: *Prosopotheca comiculans*

Walckenaeria cucullata (C. L. KOCH, 1836)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, MÜLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985

Synonym: *Wideria cucullata*

Walckenaeria cuspidata BLACKWALL, 1833

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BÖSENBERG 1903, DETTNER 1985, KLEIBER 1911

Walckenaeria dysderoides (WIDER, 1834)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984 (*Wideria fugax*), DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Wideria dysderoides*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Wideria fugax*), KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985 (*Wideria fugax*), LAMPARSKI 1988 (*Wideria fugax*), LUNAU & RUPP 1988 (*Wideria fugax*), NÄHRIG 1987

Walckenaeria furcillata (MENGE, 1869)

BAEHR 1983a, BÖSENBERG 1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, WIEHLE 1960a, WUNDERLICH 1972

Walckenaeria incisa (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

DUMPERT & PLATEN 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Wideria polita*), Coll. WUNDERLICH

Synonym: *Tigellinus incisa*

Walckenaeria kochi (O. P.-CAMBRIDGE, 1872)

GACK & KOBEL-VOSS 1983 (*Cornicularia kochi*), HOFFMANN 1980

Walckenaeria mitrata (MENGE, 1868)

BAEHR 1983a, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Wideria mitrata*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Wideria mitrata*)

Walckenaeria monoceros (WIDER, 1834)

BÖSENBERG 1903 (*Cornicularia monoceros*), DUMPERT & PLATEN 1985, HEUBLEIN 1983

Synonym: *Prosopotheca monoceros*

Walckenaeria nodosa (O. P.-CAMBRIDGE, 1873)

BAEHR & BAEHR 1984, HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c

Walckenaeria nudipalpis (WESTRING, 1851)

BAEHR & BAEHR 1984 (*Trachynella nudipalpis*), BAUER 1982, DUMPERT & PLATEN 1985, HOFFMANN 1980, KOBEL-LAMPARSKI 1987 (*Trachynella nudipalpis*), MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1990a

Walckenaeria obtusa BLACKWALL, 1836

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895,

Synonym: *Trachynella obtusa*

Walckenaeria stylifrons (O. P.-CAMBRIDGE, 1875)

WUNDERLICH 1972

Synonym: *Horcotes niger* WIEHLE, 1965

Walckenaeria unicomis O. P.-CAMBRIDGE, 1861

DUMPERT & PLATEN 1985, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895

Synonym: *Comicularia unicomis*

Walckenaeria vigilax (BLACKWALL, 1853)

BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, NÄHRIG 1987

Synonym: *Comicularia vigilax*

FAMILIE NESTICIDAE

HÖHLENSPINNEN

Nesticus cellulanus (CLERCK, 1757)

BELLMANN 1984, BÖSENBERG 1903, BÜRGIS 1989, DOBAT 1975a, HANDKE & SCHREIBER 1985, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895

FAMILIE THERIDIIDAE

HAUBENNETZSPINNEN

Achaearanea lunata (CLERCK, 1757)

HARMS 1966, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Theridium formosum*), NÄHRIG 1987, STRAND 1907a (*Theridium lunatum*)

Achaearanea riparia (BLACKWALL, 1834)

BELLMANN 1984 (*Achaearanea saxatilis*), HÖFER 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Achaearanea simulans (THORELL, 1875)

Coll. HARMS

Synonym: *Achaearanea tepidariorum simulans*

Achaearanea tepidariorum (C. L. KOCH, 1841)

BÖSENBERG 1903 (*Theridium tepidariorum*), MISIOCH 1977, Coll. RENNER, Coll. ROSE

Anelosimus vittatus (C. L. KOCH, 1836)
HÖFER 1989, NÄHRIG 1987, Coll. MALTEN

Crustulina guttata (WIDER, 1834)
HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895,
ZIER 1985

Dipoena braccata (C. L. KOCH, 1841)
HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Lasaeola braccata*)

Dipoena coracina (C. L. KOCH, 1841)
HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895
(*Lasaeola nigrina*)

Dipoena erythropus (SIMON, 1881)
BÖSENBERG 1903 (*Lasaeola erythropus*), WUNDERLICH 1975

Dipoena inornata (O. P.-CAMBRIDGE, 1861)
Coll. HARMS

Dipoena melanogaster (C. L. KOCH, 1841)
BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, MÜLLER & SCHENKEL 1895

Dipoena prona (MENGE, 1868)
BÖSENBERG 1903 (*Lasaeola prona*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988

Dipoena tristis (HAHN, 1833)
HANDKE & SCHREIBER 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Enoplognatha latimana HIPPA & OKSALA, 1982
HIPPA & OKSALA 1982, NÄHRIG 1987
Bemerkung: vgl. *Enoplognatha ovata*

Enoplognatha mordax (THORELL, 1875)
WUNDERLICH 1976 (*Enoplognatha crucifera*)

Enoplognatha oelandica (THORELL, 1875)
Coll. HARMS, Coll. WUNDERLICH

Enoplognatha ovata (CLERCK, 1757)
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984 (*Theridion redlimitum*), BAUER 1982, HAFNER 1991,
HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980 (*Theridium ovatum*),
HIPPA & OKSALA 1982, HÖFER 1989, LEIST 1978 (*Theridion redlimitum*), MIOTK 1983,
MISIOCH 1977 (*Achaearanea ovatum*), MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Phyllonethis lineata*),
NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Bemerkung: HIPPA & OKSALA 1982 lösten aus *E. ovata* *E. latimana* heraus. Älteres Material
Ist daher stark revisionsbedürftig. In der Sammlung SCHENKEL im Naturhistorischen Museum
Basel befinden sich beide Arten sub *E. ovata* (MAURER & HÄNGGI 1989).

Enoplognatha tecta (KEYSERLING, 1884)

WUNDERLICH 1976

Enoplognatha testacea SIMON, 1884

HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, WUNDERLICH 1975

Enoplognatha thoracica (HAHN, 1833)

BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, WUNDERLICH 1976

Epsinus angulatus (BLACKWALL, 1836)

HÖFER 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Epsinus truncatus LATREILLE, 1809

GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Epsinus lugubris*), STADLER & SCHENKEL 1940

Euryopis flavomaculata (C. L. KOCH, 1836)

BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MÜLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985

Euryopis laeta (WESTRING, 1862)

HARMS 1966, LEIST 1978

Euryopis quinqueguttata THORELL, 1875

BÖSENBERG 1903 (*Euryopis argenteomaculata*), HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977

Pholcomma gibbum (WESTRING, 1851)

BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895,

Robertus arundineti (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c

Robertus grasshoffi WUNDERLICH, 1973

WUNDERLICH 1972 (*Robertus* sp.), WUNDERLICH 1973c

Bemerkung: Das als *R. grasshoffi* beschriebene Weibchen gehört zu einer neuen Art *Robertus kuehnae* BAUCHHENS & UHLENHAUT im Druck (BLICK & SCHEIDLER 1991).

Robertus kuehnae BAUCHHENS & UHLENHAUT i. Dr.

WUNDERLICH 1973c (Weibchen sub *Robertus grasshoffi*).

Robertus lividus (BLACKWALL, 1836)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (*Ctenium lividum*), HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Pedanosthetus lividus*), NÄHRIG 1987, NÄHRIG 1990a

Robertus neglectus (O. P.-CAMBRIDGE, 1871)

BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HEUBLEIN 1983, HÖFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Pedanosthetus neglectus*), WUNDERLICH 1973c

Robertus scoticus JACKSON, 1914

KOBEL-LAMPARSKI 1987, LAMPARSKI 1988, WUNDERLICH 1973b

Steatoda albomaculata (DE GEER, 1778)

KOBEL-LAMPARSKI 1987, Coll. HARMS

Steatoda bipunctata (LINNAEUS, 1758)

CASEMIR 1961, HARMS 1966, HÖFER 1989, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, STRAND 1907a

Steatoda grossa (C. L. KOCH, 1838)

BÖSENBERG 1903 (*Teutana grossa*), WIEHLE 1937, SCHMIDT (in litt.)

Steatoda phalerata (PANZER, 1801)

BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MISIOCH 1977

Synonym: *Asagena phalerata*

Steatoda triangulosa (WALCKENAER, 1802)

Coll. HARMS, Coll. RENNER

Theonoe minutissima (O. P.-CAMBRIDGE, 1879)

HARMS 1966 (*Coressa minutissima*), Coll. HARMS

Theridion bellicosum SIMON, 1873

WOLF & ZIMMERMANN 1991, Coll. HARMS

Theridion betteni WIEHLE, 1960

Coll. HARMS, Coll. SCHENKEL (HÄNGGI pers. Mitt.), Coll. WUNDERLICH

Theridion bimaculatum (LINNAEUS, 1767)

HANDKE & SCHREIBER 1985 (*Enoplognatha bimaculatum*), HARMS 1966 (*Neottiura bimaculata*), HOFFMANN 1980 (*Neottiura bimaculata*), HÖFER 1989 (*Neottiura bimaculata*), KOBEL-LAMPARSKI 1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 1988, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHMID 1967 (*Neottiura bimaculata*), STADLER & SCHENKEL 1940, STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Theridion blackwalli O. P.-CAMBRIDGE, 1870
HARMS 1966, LEIST 1978, NÄHRIG 1987

Theridion boesenbergi STRAND, 1904
DE LESSERT 1910, NÄHRIG 1987, Coll. MALTEN, Coll. PLATEN, Coll. WUNDERLICH

Theridion conigerum (SIMON, 1914)
WUNDERLICH 1973c

Theridion familiare O. P.-CAMBRIDGE, 1871
BÖSENBERG 1903

Theridion hemerobium SIMON 1914
WUNDERLICH 1973a (*Theridion berkeleyi*)

Theridion impressum L. KOCH, 1881
BELLMANN 1984, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL
1895, NÄHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Theridion instabile O. P.-CAMBRIDGE, 1870
HARMS 1987, HÖFER 1989, NÄHRIG 1987

Theridion melanurum HAHN, 1831
DUMPERT & PLATEN 1985, MÜLLER & SCHENKEL 1895 (*Theridium denticulatum*),
NÄHRIG 1987

Theridion mystaceum L. KOCH, 1870
HÖFER 1989, MISIOCH 1977

Theridion nigrovariegatum SIMON, 1873
HEUBLEIN 1983, MÜLLER & SCHENKEL 1895

Theridion pallens (BLACKWALL, 1834)
BELLMANN 1984, BÖSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, NÄHRIG
1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Synonym: *Paldiscura pallens*

Theridion pictum (WALCKENAER, 1802)
LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1918

Theridion pinastrii L. KOCH, 1872
BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Theridion simile C. L. KOCH, 1836
BÖSENBERG 1903, HARMS 1966, LEIST 1978, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987,
WOLF & ZIMMERMANN 1991

Theridion sisyphum (CLERCK, 1757)

DETTNER 1985, HAFNER 1991 (*Theridion notatum*), HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978 (*Theridion notatum*), MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Theridion suaveolens SIMON, 1879

MISIOCH 1977, WUNDERLICH 1975

Synonym: *Neottiura suaveolens*

Theridion tinctum (WALCKENAER, 1802)

BELLMANN 1984, HARMS 1966, HÖFER 1989, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991

Theridion varians HAHN, 1831

BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HÖFER 1989, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MÜLLER & SCHENKEL 1895, NÄHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & ZIMMERMANN 1991

FAMILIE ANAPIDAE

Comaroma simoni BERTKAU, 1889

Coll. ALBERTI, Coll. KIECHLE

Bemerkung: Familienzuordnung nach KROPF 1990

FAMILIE MYSMENIDAE

Mysmena jobi KRAUS, 1967

Coll. HARMS

SONSTIGE LITERATUR

- BLICK, T. & M. SCHEIDLER (1991): Kommentierte Artenliste der Spinnen Bayerns (Araneae). - Arachnol. Mitt. 1: 27-80
- HEIMER, S. & W. NENTWIG (1991): Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin u. Hamburg. 543 S.
- KIECHLE, J. (1992): Die Bearbeitung landschaftsökologischer Fragestellungen anhand von Spinnen. In: J. TRAUTNER (Hrsg): Arten- und Biotopschutz in der Planung: Methodische Standards zur Erfassung von Tierartengruppen (BVDL-Tagung Bad Wurzach, 9.-10. November 1991). - Ökologie in Forschung und Anwendung 5: 119-134
- KROPF, C. (1990): *Comaroma simoni* Is an anapid spider (Arachnida: Araneae: Anapidae). - Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 31/32: 185-203
- MAURER, R. & A. HÄNGGI (1989): Für die Schweiz neue und bemerkenswerte Spinnen (Araneae) III. - Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 62: 175-182
- MAURER, R. & A. HÄNGGI (1990): Katalog der schweizerischen Spinnen. - Doc. Faun. Helvet. 12: ohne Paginierung. CSCF, Neuchâtel
- MILLIDGE, A. F. (1987): The Erigonine Spiders of North America. Part 8. The genus *Eperigone* CROSBY & BISHOP (Araneae, Linyphidae). - Am. Mus. Novitates 2885: 1-75
- MILLIDGE, A. F. (1988): Genus *Prinerigone*, gen. nov. (Araneae: Linyphidae). - Bull. Br. arachnol. Soc. 7: 216
- PLATEN, R. M. MORITZ & B. v. BROEN (1991): Liste der Webspinnen- und Weberknechtarten (Arach.: Araneida, Opiliona) des Berliner Raumes und Ihre Auswertung für Naturschutzzwecke (Rote Liste). In: A. AUHAGEN, R. PLATEN & H. SUKOPP (Hrsg): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin. - Landschaftsentwicklung und Umweltforschung S 6: 169-205
- PLATNICK, N. I. (1989): Advances in Spider taxonomy 1981-1987. A supplement to Brignoli's "A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981". Manchester University Press, Manchester. 673 S.
- ROBERTS, M. J. (1987): The spiders of Great Britain and Ireland. Vol. 2. Linyphidae and Checklist. Harley Books, Colchester. 229 S.
- THALER, K. (1968): Zum Vorkommen von *Porthomma*-Arten in Tirol und anderen Alpenländern (Arachn. Araneae, Linyphidae). - Ber. nat-med. Ver. Innsbruck 56: 361-388

Franz Renner, Sonnentastraße 3, D-W-7954 Bad Wurzach