

## AMPHIBIEN VON SÁRSZÖG

Von

I. VÁSÁRHELYI

1. *Triturus c. cristatus*: gemein.
2. *Triturus v. vulgaris*: gemein. Während der Paarungszeit auf den feuchten Wiesen, in den Inundationsgewässern und der Toten TISZA. Im Sommer aber, wenn sie das Wasser verlassen, konnten nur wenige Individuen gesichtet werden.
3. *Hyla arborea*: Am Ufer des Wassers überall häufig, auch in Sträuchern und auf Rohr-, Schilf- und Riedgrasblättern.
4. *Rana esculenta*: war in allen Gewässern gemein.
5. *Rana ridibunda*: lebte in den gleichen Biotopen wie *R. esculenta*.
6. *Rana dalmatina*: Kam in den Inundationswäldern selten zum Vorschein. Am besten waren sie im Wasser bei der Paarung zu beobachten. Im Sommer suchten sie eher die trockneren waldigen, dicht bewachsenen Orte auf.
7. *Bufo b. bufo*: Im Inundationsraume selten.
8. *Bufo viridis*: War überall anzutreffen, besonders im Regen und in der Dämmerung. Zur Überwinterung verkrochen sie sich in frostfreien Kellern, Mieten, Rüben- und Kartoffelhaufen, wo sie bei ärmlicher Nahrung den Winter wach verbrachten.
9. *Bombina bombina*: War im Sommer in allen Gewässern, selbst in den kleinsten Tümpeln und Jauche allgemein verbreitet.