

نقش کلینوپتیلویت در حذف غلظت کشنده آمونیاک کل در قزلآلای رنگین کمان (*Oncorhynchus mykiss*)

محمد فرهنگی^(۱)* و عبدالجید حاجی مراد لو^(۲)

s.farhangi@yahoo.com

۱- مجتمع آموزش عالی شهرستان گنبد، صندوق پستی: ۱۶۳

۲- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۳۸۶

تاریخ دریافت: آذر ۱۳۸۸ تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۹۰

چکیده

این مطالعه، بمنظور سنجش کارآیی زئولیت کلینوپتیلویت در جذب غلظت کشنده آمونیاک کل در ماهی قزلآلای رنگین کمان اجرا شد. بچه ماهیانی با وزن ۹/۵-۲۱ گرم (میانگین ۱۵ گرم) در معرض ۴ غلظت مختلف از آمونیاک کل (N-NH₄) شامل: ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میلی گرم در لیتر قرار گرفتند. یک گروه ۱۳ تایی بعنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. غلظت کشنده آمونیاک کل (N-NH₄) در مدت ۲۴ ساعت تعیین شد. تحت شرایط ثابت دما و pH (دمای ۱۶±۱ درجه سانتیگراد و pH = ۷/۷±۱) غلظت کشنده آمونیاک برابر با ۲۵ میلی گرم در لیتر آمونیاک کل بود (معادل ۰/۴۴ میلی گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه N-NH₃ براساس دما و pH). از مقادیر ۲، ۵، ۱۰، ۱۳ و ۱۵ گرم در لیتر کلینوپتیلویت در غلظت کشنده آمونیاک کل استفاده شد. کاربرد ۱۵ گرم در لیتر کلینوپتیلویت در غلظت کشنده آمونیاک کل توانست تلفات را به صفر برساند. پس از گذشت ۲۴ ساعت اختلاف معنی داری بین فاکتورهای سختی و آمونیاک کل بدست آمد (P<0.01). بیشترین تلفات در ساعت اولیه آزمایش رخ داد.

لغات کلیدی: قزلآلای رنگین کمان، ضایعات بافتی، تصفیه آب، کیفیت آب

مقدمه


$A_B = \text{یونهای قابل تعویض در محلول و زئولیت}$
 $Z_A, Z_B = \text{ظرفیت یونهای موجود در محلول و زئولیت}$
 (Phillipsite) در بین زئولیتهای طبیعی ۲ نوع فیلیپسیت (Clinoptilolite) بدليل تمايل بالا در جذب یون آمونیوم از اهمیت بیشتری در آبرزی پروری برخوردارند (Kayabali & Kezer, 1998; Bergero *et al.*, 1994; Polat *et al.*, 2004). کارآیی زئولیت در جذب مواد به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله عوامل محیط و روش استفاده از آن و همچنین عوامل فیزیکی و شیمیابی مربوط به زئولیت (Mokarami & Emadi, 2002; Papaioannou *et al.*, 2002).

هدف از این مطالعه بررسی کارآیی زئولیت طبیعی در حذف غلظت کشنده آمونیاک و جلوگیری از تلفات ماهی می باشد.


مواد و روش کار

۱۵ گرم ($21 - 21/5$ گرم) از کارگاه پرورش ماهیستان فاضل آباد از توابع استان گلستان تهیه و در یک استخر ($25 \times 2 \times 0.8$ متر) بصورت جداگانه نگهداری شدند. آزمایشات با استفاده از روش آب ساکن (Static Method) در شرایط ثابت دما و pH ($7/7 \pm 0.1$) و دمای 16 ± 1 درجه سانتیگراد) صورت گرفت. مدت زمان آزمایش برای هر گروه ۲۴ ساعت بود. برای تعیین غلظت آمونیاک کل پس از تعیین حجم آب (۵۰ لیتر) به ازاء واحد حجم، کلرور آمونیوم (NH_4Cl) ساخت کارخانه Merck (آلمان) بصورت وزنی توزین و به آب اضافه گردید. بعد از گذشت ۲۴ ساعت میزان آمونیاک کل در ظروف آزمایش توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر با طول موج 450 نانومتر اندازه گیری شد. زئولیت مورد نظر زئولیت طبیعی از نوع کلینوپتیلولیت با 90 درصد خلوص بود که از شرکت افرند توسکا - ایران تهیه گردید. زئولیت های مورد بررسی پس از شستشو و رفع آلودگی سطح آن از مواد آلی با استفاده از هاون دستی، بصورت آرد، با اندازه بین $0.125 - 0.15$ میلیمتر مورد استفاده قرار گرفت. ماهیها در 5 گروه و سه تکرار با 13 عدد ماهی در هر گروه در معرض غلظت های مختلف آمونیاک کل (صفر، 10 ، 15 ، 20 ، 25 میلی گرم در لیتر) قرار داده شد. تعیین این غلظتها براساس یکسری آزمایشات مقدماتی بود که در آن


یکی از معضلات پرورش ماهی تعییرات کیفی آب است که منجر به کاهش تولید می شود. در بین عوامل کیفی آب آمونیاک نقش اساسی دارد. آمونیاک در حالت یونیزه بشکل یون آمونیوم (NH_3^+) اثرات سمی زیادی بر ماهیان دارد. آمونیاک در آب خیلی محلول بوده و افزایش اندک فشار جزء (partial pressure) آمونیاک در آب می تواند افزایش آمونیاک محلول در خون را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع خصوصاً در مزارع خاکی، شالیزارها، ماشین های حمل و نقل ماهی و سیستم های مدار بسته پرورشی که امکان تعویض آب به حد کافی نیست، لزوم یافتن روش های جدید تشخیص و پیشگیری که مطابق با امکانات موجود کشور باشد کمک شایانی در رفع این عارضه خواهد کرد. یکی از روش های معمول استفاده از مواد معدنی افزایش دهنده کیفیت آب یا عبارت دیگر زئولیت (Zeolite) است. زئولیت ها در واقع کانی هایی از جنس سیلیکات آلومینیوم با ساختار چهار وجهی (چهار آتم اکسیژن حول یک اتم سیلیسیم) هستند که در آن حفرات و کانال هایی با ابعاد $3 - 10$ آنگستروم وجود دارد (Gattardi ; Mumpto & Fishman, 1977). در داخل این حفرات به میزان $10 - 100$ Galli, 1985 آجراست آب وجود دارد. وجود این ساختمندان در زئولیت به آنها اجازه می دهد تبادل کاتیونی را با ظرفیت بین $2/16 - 4/73$ میلی اکی والان بر گرم داشته باشند (Kayabali & Kezer, 1998; Mumpto & Fishman, 1977). کاتیون های خارجی قبل تبادل در زئولیت ها معمولاً Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} می باشد، که برای زئولیت مورد نظر (کلینوپتیلولیت) این یونها شامل Na^+ و K^+ می باشد (Bergero *et al.*, 1994). ترتیب تمايل جذبی در کلینوپتیلولیت بشرح زیر است (چالکش امیری، ۱۳۷۸؛ Bergero *et al.*, 1994)



اگر زئولیت در تماس با محلولی قرار گیرد، یون متحرک موجود در ساختمندان زئولیت و یون موجود در محلول می توانند محل خود را تعویض کنند ولی با حفظ این شرط که همواره محلول و زئولیت از نظر الکتریکی خنثی بمانند. این تعویض یونی همانند یک واکنش تعادلی عمل می کند (Silapajarn *et al.*, 2006):



مختلف آمونیاک و با استفاده از شیب خط رگرسیون غلظت نیمه کشنده آمونیاک در ۲۴ ساعت (LC_{50}) برابر با ۱۵/۷۷ میلی گرم در لیتر آمونیاک کل ($N-NH_4$) بود (نمودار ۲). میزان بدست آمده با استفاده از رابطه زیر برابر با ۰/۲۸ میلی گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه ($N-NH_3$) بود (اسووبودا و ویکوسووا، ۱۳۷۴).



در ماهیانی که در معرض غلظت کشنده آمونیاک کل قرار داشتند، علائم ظاهری شامل بی قراری شدید، خم شدن ناگهانی عضلات تن، باز و بسته شدن سریوشاهی آبششی و دهان، حرکات تشنجی، برخورد با کناره‌های آکواریوم، سعی در بیرون پریدن، بلعیدن هوا از سطح، پر خونی و قرمز شدن آبششها مشاهده گردید.


غلظت‌های فرضی از آمونیاک کل از جمله ۳۰، ۲۷، ۵ و ۵۰ مورد استفاده قرار گرفت. براساس این آزمایشات درصد تلفات از صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت ۲۴ ساعت بدست آمد. بدین طریق غلظت‌های نهایی بدست آمد. یک گروه ۱۳ تایی از ماهی‌ها هم بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. بدليل عدم کارآیی هواهه در خروج آمونیاک، در آزمایشات از سنگ هوا بعنوان هواهه استفاده شد. خصوصیات فیزیکی (دما و اکسیژن) و شیمیایی (pH، سختی و آمونیاک) آب در ابتدا و انتهای آزمایش اندازه‌گیری شد. برای مشخص کردن اثرات کلینیوتیلولیت در پیشگیری از مسمومیت با آمونیاک از مقادیر ۲، ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۰ و ۱۵ گرم در لیتر آرد کلینیوتیلولیت در غلظت کشنده آمونیاک کل (۲۵ میلی گرم در لیتر) استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار Minitab و آزمون Least Significance Difference و رگرسیون خطی مقایسه شدند.

نتایج

درصد تلفات ماهی در غلظت‌های مختلف آمونیاک کل پس از گذشت ۲۴ ساعت تعیین شد (جدول ۱). در غلظت‌های ۰، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ میلی گرم در لیتر آمونیاک کل درصد تلفات در ۲۴ ساعت در شرایط دمای 16 ± 1 درجه سانتیگراد، اکسیژن محلول ۱۰-۱۱ میلی گرم در لیتر و $pH = 7/7 \pm 1$ بترتیب برابر با ۳۸/۴، ۱۵/۵، ۳۸/۴ و ۶۱/۳۸ درصد بود (نمودار ۱). همانطوریکه در این نمودار نشان داده شده است با افزایش غلظت آمونیاک درصد تلفات نیز افزایش می‌یابد. با رسم منحنی تغییرات تلفات در غلظت‌های

جدول ۱: تغییرات تلفات ماهی در غلظت‌های مختلف آمونیاک کل (میلی گرم در لیتر) طی ۲۴ ساعت، حجم آب ۵۰ لیتر و تعداد ماهی در هر گروه ۱۳ عدد


گروه (میلی گرم در لیتر)	غلظت آمونیاک کل (میلی گرم در لیتر)	درصد تلفات	تعداد تلفات	غلظت آمونیاک غیریونیزه	غله
۰	۰	۰	۰	۰	شاهد
۱۵/۳۸	۲	۰/۱۷	۱	۱۰	۱
۳۸/۴	۵	۰/۲۶	۲	۱۵	۲
۶۱/۵	۸	۰/۳۵	۳	۲۰	۳
۱۰۰	۱۳	۰/۴۴	۴	۲۵	۴




نمودار ۱: هیستوگرام تغییرات تلفات ماهی در غلظت‌های مختلف آمونیاک کل (میلی‌گرم در لیتر) طی ۲۴ ساعت، حجم آب ۵۰ لیتر و تعداد ماهی در هر گروه ۱۳ عدد

جدول ۲: تغییرات درصد بقاء با آرد زئولیت (گرم در لیتر) در مقابل غلظت کشنده آمونیاک کل (میلی‌گرم در لیتر) طی ۲۴ ساعت، حجم آب ۵۰ لیتر، تعداد ماهی در هر گروه ۱۰ عدد

گروه (گرم در لیتر)	مقدار زئولیت	تعداد تلفات	درصد تلفات
شاهد	۰	۱۰	۱۰۰
۱	۲	۱۰	۱۰۰
۲	۵	۸	۹۰
۳	۱۰	۴	۷۰
۴	۱۳	۱	۲۰
۵	۱۵	۰	۰



نمودار ۲: منحنی رگرسیون تغییرات تلفات ماهی در غلظت‌های مختلف آمونیاک کل (میلی‌گرم در لیتر) طی ۲۴ ساعت، حجم آب ۵۰ لیتر، تعداد ماهی در هر گروه ۱۰ عدد



نمودار ۳: هیستوگرام تغییرات درصد بقاء با آرد زئولیت (گرم در لیتر) در مقابل غلظت کشنده آمونیاک کل (میلی گرم در لیتر) طی ۲۴ ساعت، حجم آب ۵۰ لیتر، تعداد ماهی در هر گروه ۱۰ عدد

جدول ۳: میانگین و انحراف معیار مربوط به فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب طی ۲۴ ساعت در مقابل آرد زئولیت

گروه	pH	آمونیاک کل (میلی گرم در لیتر)	سختی کل (میلی گرم در لیتر)
شاهد	۷/۸ ± ۱ ^a	۲۵ ^a	۴۰۰ ^a
۱۵ گرم در لیتر آرد زئولیت	۷/۷ ± ۱ ^a	۰/۶ ± ۰/۰۳ ^b	۳۴۵/۳۳ ± ۱۸/۵۸ ^b

a , b بیانگر معنی دار بودن داده می باشد (P<0.01).

بحث

رگرسیون غلظت نیمه کشنده در ۲۴ ساعت (LC_{50}) معادل ۱۵/۷۷ میلی گرم در لیتر آمونیاک کل (معادل ۰/۲۸ میلی گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه براساس درجه حرارت و pH) است هر چند عدد بدست آمده در این آزمایش با عدد بدست آمده برای سایر گونه های آبزیان متفاوت است (اسووبودا و ویکوسووا، ۱۳۷۴؛ Knoph, 1996). شاید این امر بدلیل حساسیت گونه های مختلف در برابر آمونیاک و همچنین شرایط آزمایشی برای هر گونه داشته باشد. اسووبودا و ویکوسووا (۱۳۷۴) غلظت نیمه کشنده (LC_{50}) را برای آزاد ماهیان در ۲۴ ساعت بین ۰/۰۵ تا ۰/۰۸ میلی گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه بیان کردند. البته میزان بدست آمده در شرایط آزمایشی (۰/۰۸ میلی گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه) در شرایط ایده آل برای ماهی بدست آمده

با توجه به اهمیت مسمومیت با آمونیاک در سیستم های پرورشی و تلفات ناشی از آن در آبزیان تاکنون مطالعات زیادی صورت گرفته است (Sommai & Boyd, 1993; Chen, 1992; Knoph & Thorud, 1996; Person *et al.*, 1995; Alcaraz, 1999; Ruyet *et al.*, 1997; 1996). افزایش آمونیاک به آب سبب بروز تظاهراتی در رفتار و ساختار ماهی شد که شامل خم شدن عضلات تن، تحریکات عصبی، پرخونی آبششهای، عدم تعادل و شناای ناموزن و نهایتا مرگ ماهی می باشد. این امر با یافته های سایر محققین مطابقت دارد. بعد از گذشت ۲۴ ساعت غلظت کشنده آمونیاک کل برای ماهی قزل آلا برابر ۲۵ میلی گرم در لیتر بدست آمد. با استفاده از منحنی تغییرات درصد تلفات در غلظت های مختلف آمونیاک و معادله خط

غیریونیزه) بدست آورد. Person و همکاران (۱۹۹۵) غلظت نیمه کشنده آمونیاک (LC_{50}) را برای باس دریابی بعد از گذشت ۹۶ ساعت برابر $40 \text{ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل}$ (معادل $1/7$ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه) و برای ماهی سیم دریابی معادل $57 \text{ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل}$ (معادل $2/5$ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه) گزارش داد. درخصوص استفاده از زئولیت در کاهش آمونیاک بصورت آزمایشی نیز مطالعات صورت گرفته است اما بطور عملی و در حضور ماهی مطالعات کمی صورت گرفته است. Bergero و همکاران (۱۹۹۴) ظرفیت برداشت آمونیاک را از پساب آبزی پروری توسط زئولیت مورد مطالعه قرار دادند. در این آزمایش از 6 نوع زئولیت اروپایی برای حذف آمونیاک استفاده گردید (فیلیپسیت، چپازایت، کلینوپتیلولیت، موردنیت، لومونتیت و آنالسیم). درین آنها فیلیپسیت و کلینوپتیلولیت از همه موثرتر بودند. چپازایت با میزان ماده زئولیتی کمتر، کارآیی کمتری را نشان داد. بطوریکه با بکارگیری $100 \text{ میلی‌گرم زئولیت در لیتر به } 3/3 \text{ میلی‌گرم در لیتر برای چپازایت و } 20/6 \text{ میلی‌گرم در لیتر برای فیلیپسیت و } 20/2 \text{ میلی‌گرم در لیتر برای کلینوپتیلولیت رسیده است. Sommai و Boyd (۱۹۹۳) تاثیر فرمالین، زئولیت، تولیدات باکتریایی و هوادهی را بر کاهش آمونیاک مورد مطالعه قرار دادند. در این آزمایش افزودن 2 گرم در لیتر زئولیت کلینوپتیلولیت توانست غلظت آمونیاک را به میزان $80-90$ درصد کاهش دهد. مطالعات مختلف نشان داده است، هر چه ذرات زئولیتی ریزتر باشد، سطح تماس مولکولها بیشتر شده و میزان جذب بیشتر می‌شود; Farhangi, 2010; Farhangi & Hajimoradloo, 2009; Sommai & Boyd, 1993. بنابراین در آزمایشات از آرد کلینوپتیلولیت استفاده شد.$

Sommai و Boyd (۱۹۹۳) بیان داشتند هر چه ذرات زئولیت ریزتر باشد میزان بیشتری از آمونیاک جذب زئولیت می‌شود و زئولیت‌های پودر شده تأثیر بیشتری در کاهش آمونیاک نسبت به نمونه‌های درشت‌دارد. Farhangi و Hajimoradloo (۲۰۰۹) و Farhangi (۲۰۱۰) طی آزمایشات مختلف، اثرات هوادهی و دانه‌بندی زئولیت را بر کیفیت آب مطالعه نمودند. آنها ثابت کردند، استفاده از آرد زئولیت در مقایسه با گرانول و دانه زئولیت جذب بیشتری برای آمونیاک دارند.

است. در محیط‌های پرورشی با توجه به اینکه عوامل مضر دیگر از جمله سولفید هیدروژن، متان و همچنین شرایط نامساعد محیطی از جمله کمبود اکسیژن و بالا بودن درجه حرارت نیز ممکن است وجود داشته باشد، لذا این عوامل می‌توانند سمیت آمونیاک را تشدید کند. بنابراین مقادیر کمتر آمونیاک نیز می‌تواند باعث تلفات در ماهی شود. همین امر شاید دلیل تفاوت در اعداد بدست آمده باشد. Muir (۱۹۸۲) سطوحی از آمونیاک غیریونیزه را که باعث کاهش رشد ماهیان آب شرین می‌شود بین $1-10 \text{ میلی‌گرم در لیتر بیان کرد. وی آستانه سطح آمونیاک را که تأثیر روی رشد انواع ماهیان دارد بشرح زیر عنوان نمود: قزل‌آلای رنگین کمان برابر $10/3 \text{ میلی‌گرم در لیتر}$, گربه ماهی کانالی (Ictalurus Punctatus) برابر $10/6 \text{ میلی‌گرم در لیتر}$, خورشید ماهی (Solea sp.) برابر $10/66 \text{ میلی‌گرم در لیتر}$, مار ماهی اروپایی برابر $11/12 \text{ میلی‌گرم در لیتر}$, Chen (۱۹۹۲) بیان داشت که ماکزیمم قابل قبول آمونیاک که رشد را ۱-۲ درصد کاهش می‌دهد برای پست لاروهای میگو پنائیده برابر با $10/1 \text{ آمونیاک غیریونیزه می‌باشد. وی حداکثر سمیت قابل Maximum Acceptable Toxicant Concentration (MATC) برای میگوها را کمتر از } 5 \text{ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل یا } 10/35 \text{ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه عنوان کرد. Alcaraz (۱۹۹۹) غلظت نیمه کشنده } (LC_{50}) \text{ را برای پست لاروهای میگوی سفید (Penaeus setiferus) بعد از گذشت ۴۸ و } 24 \text{ ساعت بترتیب برابر با } 1/21 \text{ و } 1/49 \text{ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه گزارش داد. Ruyet و همکاران (۱۹۹۷) غلظت نیمه کشنده } (LC_{50}) \text{ را برای ماهی پهنهن Turbot بعد از گذشت ۲۸ روز برابر با } 10/5 \text{ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه بدست آورد. در حالیکه توقف رشد ماهی را در غلظت } 10/8 \text{ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک غیریونیزه بدست آورد که علت آنرا کاهش دریافت غذا و عدم بهره‌گیری از آن دانست. وی همچنین اظهار داشت بیشترین تغییرات در پلاسمای خون است که ارتباط نزدیکی با غلظت آمونیاک خون دارد. Knoph (۱۹۹۶) غلظت نیمه کشنده } (LC_{50}) \text{ را بعد از گذشت ۴۸ ساعت برای اسمولت‌های ماهی آزاد معادل } 59/4 \text{ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل } (10/6 \text{ میلی‌گرم آمونیاک در لیتر آمونیاک$$

آزمایشات مختلف نشان می‌دهد، هوادها در کاهش آمونیاک از آب نقشی ندارند به همین لحاظ در آزمایشات از هواده استفاده شد Farhangi; Sommai & Boyd, 1993; Ver & Chiu, 1986; Hajimoradloo, 2009.

با این وجود مقدار زئولیت بکار گرفته شده برای قزل‌آلابه مراتب بیشتر از مقدار زئولیت بکار رفته برای ماهی کپور است (یعنی ۱۵ گرم در لیتر)، این امر حساسیت ماهی قزل‌آلابه را نسبت به ماهی کپور و سایر ماهیان پرورشی نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در محیط‌های پرورشی قزل‌آلابه امکان افزایش آمونیاک تا حد کشنده (۲۵ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل) کمتر رخ می‌دهد، چرا که همواره عوامل نامساعد دیگری در محیط وجود دارند که سمیت آنرا تشدید می‌کند، لذا کاربرد ۱۵ گرم در لیتر زئولیت ضروری بنظر نمی‌رسد. ضمن اینکه کاربرد این میزان زئولیت (۱۵ میلی‌گرم در لیتر) در محیط‌های پرورشی مقرر به صرفه نیست، مگر در سیستم‌های فوق متراکم ماهی (مدارسته)، به همین جهت پیشنهاد می‌شود از مقداری بین ۲-۵ گرم در لیتر زئولیت فقط جهت پیشگیری از تلفات استفاده شود.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله از همکاری صمیمانه مهندس نعیمی (مسئل) آزمایشگاه هیدرورشیمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) که صمیمانه ما را در اجرای این طرح یاری نمودند، تشکر و قدردانی می‌نماییم.

منابع

اسووبودا، ز. و ویکوسووا، ب.، ۱۳۷۴. تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریها و مسمومیتهای ماهی. ترجمه: مصطفی شریف روحانی. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. انتشارات سبز رویش، ۲۵۶ صفحه.

چالکش امیری، م.، ۱۳۷۸. اصول تصفیه آب. انتشارات نشر ارکان اصفهان. ۴۴۲ صفحه.

Alcaraz G., 1999. Acute toxicity of ammonia and nitrite to white shrimp *penaeus setiferu post* larvae. Journal of the World Aquaculture Society, 30:90-97.

استفاده از زئولیت به میزان ۱۵ گرم در لیتر توانست از تلفات ماهی در غلظت کشنده آمونیاک (۲۵ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل) جلوگیری کند و تلفات را به صفر برساند. بدین ترتیب عملأ کاربرد زئولیت در کاهش آمونیاک آب و جلوگیری از تلفات ماهی به اثبات می‌رسد. هر چند در ماهیانی که زنده مانده‌اند هنوز درجات خفیفی از ضایعات ناشی از آمونیاک دیده می‌شود که می‌تواند در دراز مدت و در طول دوره پرورش بهبود یابد یا اینکه اعمال فیزیولوژی جانور را تحت تأثیر قرار داده و سبب اختلالات رشدی گردد. پس از بکار بردن زئولیت در غلظت کشنده آمونیاک و بعد از گذشت ۲۴ ساعت میزان آمونیاک موجود در آکواریوم‌ها اندازه‌گیری شد که نسبت به میزان اولیه آن بسیار جزیی بود (۰.۰۶ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل) و پس از گذشت ۲۴ ساعت اختلاف خیلی معنی‌داری در جذب آمونیاک کل بدست آمد ($P<0.01$). این امر نشان می‌دهد زئولیت توانسته قسمت اعظم آمونیاک را جذب خود کند. این امر با سایر یافته‌های بدست آمده مطابقت دارد (Sommai & Boyd, 1993; Boyd Sommai et al., 1994). دادند استفاده از ۲ گرم در لیتر زئولیت کلینوپتیلولیت توانسته است ۸۰-۹۰ درصد آمونیاک را از آبی که حاوی ۲-۳ میلی‌گرم در لیتر آمونیاک کل است حذف کند.

Bergero و همکاران (۱۹۹۴) نشان دادند استفاده از زئولیت فیلیپسیت به میزان ۱۰۰ گرم در لیتر آب توانسته است غلظت آمونیاک کل را بعد از ۲۴ ساعت از ۱۰ میلی‌گرم در لیتر به ۲۰۶ میلی‌گرم در لیتر در شرایط آزمایشگاهی بدون ماهی برساند. همچنین آزمایشات نشان داد کاربرد ۱۵ گرم در لیتر زئولیت توانست بعد از گذشت ۲۴ ساعت سختی کل را از ۴۰۰ میلی‌گرم در لیتر به $345/33$ گرم در لیتر کاهش دهد. در این آزمایش ثابت گردید، زئولیت مورد آزمایش ضمن کاهش آمونیاک کل، سختی کل را نیز کاهش می‌دهد. با توجه به تمایل جذبی زئولیت به یون آمونیوم، مشخص است که قدرت جذب آمونیاک کل به مراتب بیشتر از سختی کل است. البته این امر می‌تواند در کارآیی جذب زئولیت نسبت به کاهش آمونیاک تاثیر بگذارد، ضمن اینکه آبهای مختلف، سختی‌های متفاوتی دارند که می‌تواند محدودیت در استفاده از زئولیت را ایجاد کند.

- Bergero D., Boccignone M., DiNatale F. and Forneris G., 1994.** Ammonia removal capacity of European natural zeolite tuffs: Application to aquaculture waste water. Aquaculturean and Fisheries, 25:813-821.
- Chen J.C., 1992.** Effects of ammonia on growth and molting of *penaeus japonicus* juveniles. Aquaculture, 104:249-260.
- Farhangi M. and Hajimoradloo A.M., 2009.** Role of aeration and adding Zeolite to remove TAN–total ammonia nitrogen- in fish culture systems. 1ST International Congress on Aquatic Animal Health Management and Disease, January 27-28, Tehran, Iran.
- Farhangi M., 2010.** Effects of natural Zeolites on water quality used in fish culture. 2nd IIZC Iran International Zeolite Conference, April 29-30, Tehran, Iran.
- Gattardi G. and Galli E., 1985.** Natural zeolite. Universita di Modena vias. Eufemia. 409P.
- Kayabali K. and Kezer H., 1998.** Testing the ability of bentonite amended natural zeolite (clinoptilolite) to remove heavy metals from liquid waste. Environmental Geology, 34:95-100.
- Knoph M.B., 1996.** Gill ventilation frequency and mortality of Atlantic salmon (*salmo salar*) exposed to highe ammonia levels in saewater. Water Research, Oxford. 30:837-842.
- Knoph M.B. and Thorud K., 1996.** Toxicity of ammonia to Atlantic salmon (*salmo salar*) in seawater effects on plasma osmolality, ion, ammonia, urea and glucose levels and hematologic parameters. Comparative Biochemistry and Physiology, 11:375-381.
- Mokarami, Gh. and Emadi H., 2007.** Study of application of zeolite (Clinoptilolite) in salt water by absorption of ammonia and its effects on growth and survival *penaeus indicus*. Iran journal of fisheries sciences. 2:127-138.
- Muir J.F., 1982.** Recirculated water system in aquaculture. In: (J.C. Chen, 1992 ed). Effects of ammonia on growth and molting of *penaeus japonicus* juveniles. Aquaculture, 104:249-260.
- Mumpto F.A. and Fishman P.H., 1977.** The application of natural Zeolites in animal science and aquaculture. In: (D. Bergero, M. Boccignone, F. Natale, G. Forneris, G.B. Palmegiano, L. Roagna, B. Sicuro, 1994). Ammonia removal capacity of European natural Zeolite tuffs: Application to aquaculture waste water. Aquaculturean and Fisheries, 25:813-821.
- Papaioannou D.S., Kyriakis S.C., Papasteriadis A., Roumbies N., Yannakopoulou A. and Alexopoulos C., 2002.** Effect of in-feed inclusion of a natural Zeolite (clinoptilolite) on certain vitamin, macro and trace element concentrations in the blood, liver and kidney tissues of sows. Research in Veterinary Science, 72: 61-68.
- Person L.E., Chartois H. and Quemener L., 1995.** Comparative acute ammonia toxicity in marine fish and plasma ammonia response. Aquaculture, 136:1-2,181-194.
- Polat E., Karaca M., Demir M. and Nacionus A., 2004.** Use of natural Zeolite (clinoptilolite) in agriculture. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 12:183-189.
- Ruyet J.P.L., Glland R. and Roux A.L.E., 1997.** Chronic ammonia toxicity in juvenil turbot (*scophthalmus maximus*). Aquaculture, 154:155-171.

Silapajarn O., Silapajarn K. and Boyd C., 2006.

Evaluation of Zeolite products used for aquaculture in Thailand. Journal of the World Aquaculture Society, 13(1):136-138.

Sommai C.H. and Boyd C., 1993. Effects of

zeolite, formalin, bacterial augmentation and aeration on total ammonia nitrogen concentration. Aquaculture, 116:33-45.

Ver L.M.B. and Chiu Y.N., 1986. The effect of

paddlewheel aerators on ammonia and carbon dioxide removal in intensive pond culture. In: (C.H. Sommai & C. Boyd, 1993). Effects of Zeolite, formalin, bacterial augmentation and aeration on total ammonia nitrogen concentration. Aquaculture, 116:33-45.

The effect of zeolite (Clinoptilolite) in removing ammonia lethal concentration in Rainbow Trout (*Oncorhynchus mykiss*)

Farhangi M.^{(1)*} and Hajimoradloo A.M.⁽²⁾

s.farhangi@yahoo.com

1-Higher Education Complex of Gonbad City, P.O.Box: 163 Gonba, Iran

2- Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 386
Gorgan, Iran

Received: December 2009

Accepted: May 2011

Keywords: Tissue lesions, Water refining, Water quality

Abstract

Clinoptilolite efficiency on absorption of ammonia in rainbow trout was studied. The fish specimens weighted 9.5-21g and were exposed to four different concentrations of total ammonia as N-NH₄ including: 10, 15, 20, and .25mg/l. A group of 13 fish was considered as control. Lethal concentration was determined after 24 hours. Under stable temperature and pH conditions (T= 16±1 °C, pH= 7.7±1), the lethal concentration of total N-NH₄ was 25mg/l (as ionized N-NH₃=0.44mg/l based on temperature and pH). In lethal concentrations of ammonia, different amounts of zeolite (2, 5, 10, 13 and 15g/l) were used. Application of 15g/l of the zeolite prevented mortalities in the fish. A significant difference was found in reduction of total ammonia and total hardness through application of zeolite after 24 hours (P<0.01). The maximum mortalities occurred in early time of experiment. The histopathological lesions of gill, kidney and liver were studied.

*Corresponding author