

## 37

# Évaluation anatomoclinique et limites du traitement du cancer du sein à HMRUO

N. Ait Haimi\*<sup>1</sup>, D. Kara<sup>1</sup>, S. Kouadri Mostefai<sup>1</sup>, C. Zaoui<sup>2,3</sup>, F.Z. El Kébir<sup>2</sup> et F. Haiba<sup>1</sup>

## Objectifs

Évaluation anatomoclinique du cancer du sein et limites du traitement conservateur.

## Méthode de travail

Notre étude prospective, de janvier 2007 à mars 2012, réalisée au service de gynéco-obstétrique, hôpital militaire régional universitaire d'Oran (HMRUO). Ce travail intéresse 117 patientes, ayant droit à la prise en charge au sein du HMRUO, porteuses de tumeurs mammaires recrutées au service après confirmation du diagnostic par le triplet.

## Résultats

Les âges extrêmes sont 25 et 78 ans dont 40 % des patientes sont âgées de moins de 40 ans avec une moyenne de  $45 \pm 3$  ans. 70 % des cas sont T2 N0 M0 contre 10 % T1N0 M0 et 20 % de T3 et T4 avec métastases hépatiques, pulmonaires et osseuses. Ces cas ont été découverts fortuitement après une autopalpation, une patiente avec microcalcifications a été découverte suite à des douleurs articulaires (métastase osseuse). Le type histologique dominant est le carcinome canalaire infiltrant (80 %) suivi par le lobulaire infiltrant (6 %), le sarcome phyllode (4 %), les carcinomes *in situ* et les hyperplasies atypiques dans 10 % des cas. Ces patientes ont bénéficié d'un traitement radical dans la majorité des cas.

---

\* Auteur correspondant

1 Service de gynéco-obstétrique, Hôpital militaire régional universitaire d'Oran, Algérie

2 Laboratoire de biologie du développement et de la différenciation (LBDD), Oran, Algérie

3 Département de pharmacie, Faculté de médecine universitaire d'Oran, Algérie

## **Conclusion**

Nos résultats montrent que le cancer du sein reste toujours au premier rang des cancers gynécologiques au sein de notre service avec limite du traitement conservateur lié à la non-disponibilité d'un plateau technique de radiothérapie et recherche du ganglion sentinelle.