

55

Remplacement des prothèses mammaires par greffe de graisse autologue dans les reconstructions mammaires avec prothèse (seule ou associée à un lambeau)

A.-L. Bouffaut*, B. Le Fourn, Y. Loirat, B. Bouchot et F. Lejeune

Introduction/objectif

Dans le domaine de la reconstruction mammaire, les patientes ayant déjà bénéficié d'une reconstruction par prothèse (seule ou associée à un lambeau) sont de plus en plus demandeuses d'une reconstruction purement autologue. Nous allons vous présenter notre étude concernant le remplacement d'implant dans le domaine de la reconstruction mammaire par greffe de graisse autologue.

Matériel et méthode

Il s'agit d'une étude unicentrique, rétrospective réalisée entre 2010 et 2012.

L'étude concernait 33 patientes, réparties en deux groupes. Les reconstructions par prothèse seule constituaient le premier groupe et comptaient 20 patientes. Les reconstructions associant lambeau et prothèse formaient le deuxième groupe et comptaient 13 patientes.

Nous avons analysé pour les deux groupes : la cause d'explantation des implants, le nombre de séances de liporemodelage, le volume total moyen de graisse injectée et le résultat esthétique. Ce dernier a été évalué par les patientes (à l'aide d'un questionnaire) et par un chirurgien indépendant.

* Auteur correspondant
Clinique Brétéché, 44000 Nantes, France

Résultats

Pour le premier groupe, la majeure partie des demandes d'explantation était secondaire à une complication (coque, douleur, sepsis, rotation...), le nombre moyen de séances de liporemodelage était de 2,5 fois, et le volume total moyen de graisse injectée était de 623 mL. Nous avons observé 55 % de bons ou très bons résultats dans ce groupe.

Pour le deuxième groupe, la demande d'explantation était principalement une demande d'amélioration esthétique, le nombre moyen de séances de liporemodelage était de 1,5 fois, et le volume total moyen de graisse injectée était de 406 mL. Nous avons observé 92 % de bons ou de très bons résultats dans ce groupe.

Pour les deux groupes, plus de 90 % des patientes étaient satisfaites.

Conclusion

D'après notre étude, le liporemodelage améliorerait le résultat esthétique des reconstructions par prothèse seule et diminuerait la place des prothèses dans les reconstructions associant lambeau et prothèse.