

APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS HONGOS DEL MACIZO MONTAÑOSO DEL MONTSENY (CATALUÑA). II.

August Rocabruna * y Manuel Tabarés **

* Gran Via 111 àtic 1er. 08330 Premià de Mar (Barcelona).

** Coll del Portell, 44 baixos. 08024 Barcelona.

SUMMARY

2nd contribution to the catalogue of fungi observed in the Montseny range (Catalonian pre-litoral chain) in an area delimited in the enclosed map. We list 104 species, 17 Ascomycetes and 87 Basidiomycetes, emphasizing by its special interest *Disciotis maturescens* Boud. var. *flavescens* Boud., *Peziza pudica* (Boud.) Moser, *Hygrophorus mesotephrus* Berk. & Br., *Alpova rubescens* (Vitt.) Trophe.

RESUMEN


Segunda aportación al catálogo de los hongos observados en el macizo del Montseny (Cordillera Pre-litoral Catalana), en el territorio delimitado en el mapa adjunto. Citamos un total de 104 especies, que comprende 17 Ascomycetes y 87 Basidiomycetes, destacando por su especial interés los que figuran en el resumen en inglés.

INTRODUCCIÓN

Como una segunda parte a nuestra contribución al conocimiento de la flora fúngica del Montseny, ofrecemos este catálogo donde indicamos con un asterisco las especies que, según la bibliografía consultada, constituyen primera cita para el área de estudio.

Hemos añadido una nueva zona de recolección, que señalamos con el número trece, con lo que la lista de toponímicos queda como sigue.

- 1 *Valle de Sta. Fe y Pla de l'Espinalb.* 31 TDG 5524 y 5525. Alt. 1.100-1.200 m. Área potencial del *Fagion sylvaticae*, con hayedo acidófilo de suelos profundos, con *Ilex aquifolium* y algunas plantaciones de coníferas.
- 2 *Sant Hilari Sacalm.* 31 TDG 5937. Alt. 700-900 m. Área potencial del *Quercetum mediterraneo-montanum*.
- 3 *Sant Celoni* y alrededores. 31 TDG 5616 y 5617. Alt. 200 m. Área potencial del *Quercetum ilicis galloprovinciale*.
- 4 *Espinelves.* 31 TDG 5135. Alt. 700-800 m. Área potencial del *Fagion sylvaticae*, con plantaciones de coníferas ornamentales como *Abies alba*, *Abies masjoani*, *Picea abies*, *Cedrus sp.*, etc.
- 5 *Riells del Montseny.* 31 TDG 5925. Alt. 400-500 m. Área potencial del *Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum*. Alcornoques en las zonas soleadas y vegetación de ribera y plantaciones de *Castanea sativa* en la riera de Fuirosos.
- 6 *Fogars de Montclús.* 31 TDG 5421. Alt. 500-700 m. Área potencial del *Quercetum ilicis galloprovinciale*.
- 7 *La Costa del Montseny-Fontmartina.* 31 TDG 5122. Alt. 700-800 m. Área potencial del *Quercetum mediterraneo-montanum*, con plantaciones de coníferas ornamentales en la zona del *arboretum*.
- 8 *Mosquerolas-Campins.* 31 TDG 5821. Alt. 300-400 m. Área potencial del *Quercetum ilicis galloprovinciale*.
- 9 *Breda.* 31 TDG 6323. Alt. 250-400 m. Área potencial del *Quercetum ilicis galloprovinciale*.
- 10 *Joanet.* 31 TDG 6032. Alt. 500-600 m. Área potencial del *Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum*.
- 11 *Gualba de Dalt.* 31 TDG 5821. Alt. 200-300 m. Riera de Gualba. *Alnus glutinosa* *Populus sp.*, *Salix sp.*, etc.
- 12 *Sant Marçal.* 31 TDG 5028. Alt. 1.000-1.100 m. Área potencial del *Fagion sylvaticae*, con zonas de robles, castaños y avellanos.
- 13 *El Brull-Seva.* 31 TDG 4229. Alt. 850-950 m. Área potencial del *Buxo-Quercetum pubescentis*, con pinares plantados de *Pinus sylvestris*.



Macizo del Montseny: Mapa de las localidades prospectadas.

CATÁLOGO

Hemos modificado, en parte, la nomenclatura y la ordenación taxonómica, al adoptar para los ascomicetes las propuestas de O. ERIKSSON & D.L. HAWKSWORTH 1987, relacionándolos alfabéticamente por Órdenes y Familias. Para los Basidiomicetes seguimos la revisión de M. BON (1988), recomendada por la FEDERATION DES ASSOCIATIONS MYCOLOGIQUES MEDITERRANEÉNNES y los ordenamos alfabéticamente dentro de los órdenes correspondientes, añadiendo los sinónimos empleados en la anterior obra de MOSER (1979), a menudo mucho más conocidos.

Todas las recolecciones han sido efectuadas por nosotros, excepto las que se indican con el Leg. correspondiente, cuya aportación agradecemos. De todas disponemos de diapositivas y el material seco está depositado, con el número de registro indicado, en el herbario de la Societat Catalana de Micologia, en donde está consultable y prestable.

Algunas especies han sido publicadas en las colecciones de «Bolets de Catalunya» de esta Sociedad o en otras publicaciones en colaboración. En tales casos, citamos el trabajo en que aparecen.

ASCOMYCETES

Orden Helotiales

- * **Ciboria caucus** (Reb.) Fock. [= *Ciboria amentacea* (Balb.) Fuck.]
Bajo árboles de ribera. Loc. 5. 6-4-91. Núm. 421 A. «Bolets de Catalunya» Col. IX, 1990 núm. 405.
- * **Durella connivens** (Fr.) Rehm.
Sobre restos sin corteza de árbol de ribera. Loc. 6. 6-5-89. Núm. 382 A.
- * **Lachnum fuscescens**
Sobre hojas caídas de *Quercus petraea*. Loc. 6. 25-5-91.
- * **Sclerotinia sclerotiorum** (Libert) de Bary.
Bajo avellanos, entre *Doronicum sp.* Loc. 3. 24-4-91.
- * **Sclerotinia tuberosa** (Hedwig : Fr.) Fuck.
Sobre *Anemona nemorosa*. Loc. 1. 4-90. Núm. 372 A.
- * **Tapesia fusca** (Pers. ex Mérat) Fuck.
Sobre madera de castaño muy descompuesta. Loc. 4. 5-85. Núm. 237 A. 1-4-87. Núm. 237 A.

Orden Pezizales

- * **Disciotis maturescens** Boud. var. *fulvescens* Boud.
Margen de camino arenoso, en una plantación de *Abies alba*. Loc. 4. 4-87. Núm. 291 A. «Bolets de Catalunya» Col. IX. 1990. Núm. 411 A.
- * **Helvella elastica** (Bull. : Fr. [= *Leptopodia elastica* (Bull. ex St. Amans) Boud.]
En un lugar embarrado cerca del embalse. Loc. 1. 30-6-90. Núm. 373 A. «Bolets de Catalunya» Col. II. 1983. Núm. 70.
- * **Geopora sumneriana** (Cooke) de la Torre.
Bajo *Cedrus sp.* Loc. 4. 2-4-87. Núm. 14 A. 9-4-87. Núm. 25 A. «Bolets de Catalunya» Col. III, 1984. Núm. 142.
- * **Lamprospora crec'hqueraultii** Boud.
Sobre tierra húmeda, entre musgo, en el margen de un curso de agua. Loc. 5. 6-6-89. Núm. 323 A.
- * **Lamprospora polytrichi** (Schum. : Fr.) Le Gal.
Entre *Fumaria hygrometrica*, en un lugar quemado. Loc. 4. 15-4-89. Núm. 315 A.

- * **Peziza pudica** (Boud.) Moser.
Sobre tierra húmeda, bajo castaños. Loc. 5.
Creemos se trata de una primera cita para la Península. «Bolets de Catalunya». Col. X. 1991. Núm. 489.
- * **Peziza repanda** Pers.
Bajo encinas y castaños con abundante humus. Loc. 716.16-6-90. Núm. 375 A.
- * **Peziza violacea** Pers.
Sobre carboneras de bosque. Loc. 4. 15-4-89. Núm. 313 A. «Bolets de Catalunya» Col. IV. 1985. Núm. 185.

Orden Patellariales

- * **Patellaria atrata** Fr.
Sobre madera muerta de árboles de ribera. Loc. 5. 6-5-89. Núm. 324 A.

Orden Tuberales

- * **Tuber rufum** Poll. : Fr.
Bajo coníferas diversas. Loc. 4. 18-5-91. «Bolets de Catalunya». Col. X. 1991. núm. 50.

Orden Xylariales

- Hypoxylon fuscum** (Pers. : Fr.) Fr.
Sobre restos vegetales indeterminados. Loc. 5. 4-3-89. Núm. 306 A.

HOLOBASIDIOMYCETES

Orden Aphyllophorales

- * **Flagelloscypha minutissima** (Burt.) Donk.
Sobre restos vegetales indeterminados enterrados entre la hojarasca. Loc. 3. 4-5-91.
- Merulius tremellosus** Schrad. : Fr.
Sobre madera de haya. Loc. 1-10-89. Núm. 1506 B. Sobre madera de *Pinus silvestris*. Loc. 13. 12-89. Núm. 1521 B. Sobre madera de *Cedrus sp.*. Loc. 2. 28-10-90. Núm. 1708 B.
- Pseudocraterellus sinuosus** (Fr.) Reid. [= *Cantharellus sinuosus* (Fr. : Fr.) K.]
Bajo castaños y encinas. Loc. 3. 9-84. Núm. 598 B.
- Sarcodon imbricatus** (L. : Fr.) P. Karst.
Bajo hayas. Loc. 1. 27-8-89. Núm. 1127 B. «Bolets de Catalunya». Col. X. 1991. Núm. 494.

Orden Boletales

- * **Aureoboletus gentilis** (Quél.) Pouz. [= *Pulveroboletus cramesinus* (Secr.) Sing.]
Bajo encinas. Loc. 7. 24-9-90. Núm. 1694 B. «Bolets de Catalunya». Col. V. 1986. Núm. 293.

Orden Agaricales

- * **Agaricus praeclaresquamosus** Frem. var. *grisea* Pearson (= *A. placomyces* Peck.)
Bajo chopos. Loc. 5. 19-9-90. Núm. 1689 B. Bolets de Catalunya. Col. VI. 1987. Núm. 251.
- * **Callistosporium xanthophyllum** (Malç ø Bert.) Bon.
Sobre madera de coníferas en descomposición. Det. G. Moreno. Loc. 7. 17-10-80. Núm. 1699 B.

- * **Collybia cirrhata** (Pers.) Kumm.
Sobre restos de *Aphylophoral*. Loc. 1. 26-8-89. Núm. 1208 B.
- Collybia impudica** (Fr.) Sing.
En plantaciones de coníferas ornamentales. Loc. 4. 1-9-90. Núm. 1680 B. «Bolets de Catalunya». VII. 1988. Núm. 309.
- Collybia tuberosa** var. *cookei* (Bres). Bon [= *C. cookei* (Bres) J. D. Arnol]. Loc. 2. Sobre restos de *Russula* sp. Loc. 2. 1-11-90. Núm. 1713 B.
- * **Conocybe subovalis** Kühn. ex Walt.
Sobre humus, en el margen de un camino. Loc. 5. Leg. A. Mayoral. 16-6-90. Núm. 1414 B.
- Cortinarius amoenolens** R. Hry. ex Orton.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-88. Núm. 1492 B.
- Cortinarius anomalus** (Fr. : Fr.) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1507 B.
- Cortinarius balteatocumatilis** Hry. ex Orton.
Bajo hayas. Loc. 1. 26-9-90. Núm. 383 B.
- * **Cortinarius cephalixus** (Secr.) Fr. [= *C. olidus* Lge.]
Bajo hayas. Loc. 1. 16-10-90. Núm. 1700 B.
- Cortinarius cinnamomeus** (L.) Fr. [= *Dermocybe cinnamomea* (L. : Fr.) Wünsche].
Bajo *Piceas* sp. Loc. 6. 17-6-90. Núm. 1422 B.
- Cortinarius cinnamomeoluteus** Orton [= *Dermocybe cinnamomeolutea* (Orton) Mos.]
En bosque mixto. Loc. 2. 5-11-87. Núm. 393 B.
- Cortinarius cotoneus** Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 2-9-89. Núm. 1253 B. «Bolets de Catalunya». VI. 1987. Núm. 264.
- Cortinarius croceocaeeruleus** (Pers. : Fr.) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1529 B.
- Cortinarius multifluus** Fr.
Loc. 2. 11-87. Núm. 406 B.
- Cortinarius obtusus** (Fr. : Fr.) Fr.
Loc. 2. 11-87. Núm. 390 B.
- * **Cortinarius phoeniceus** (Bull.) Mre. [= *Dermocybe phoenicea* (Bull. ex Mre.) Mos.]
Bajo hayas. Loc. 1. 10-9-89. Núm. 1217 B. Loc. 1. 21-9-89. Núm. 1236 B.
- * **Cortinarius pseudocrassus** Joss.
Bajo hayas. Loc. 1. 9-8-87. Núm. 304 B.
- Cortinarius rubicundulus** (Rea) Pearson.
Bajo hayas. Loc. 1. 30-7-81. Núm. 209 B. Loc. 1. 18-7-87. Núm. 278 B. Loc. 1. 24-7-87. Núm. 293 B. Loc. 1. 20-9-89. Núm. 1353 B. Loc. 1. 6-9-90. Núm. 1398 B. y Loc. 1. 6-7-90. Núm. 1405 B. «Bolets de Catalunya». VII. 1988. Núm. 313.
- Cortinarius sebaceus** Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1520 B.
- Cortinarius talus** Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 16-10-90. Núm. 1702 B.
- Cortinarius xanthophyllus** (Cooke) Hry.
Bajo encimas y pinos. Loc. 5. 14-10-90. Núm. 1707 B.
- * **Crinipellis tomentosa** (Quél.) Sing. [= *C. mauretanic*a R. Mre.]
Entre la hierba. Loc. 13. 11-89. Núm. 1512 B. Bolets de Catalunya. IX. 1990. Núm. 409.
- * **Cystolepiota bucknallii** (Bk. & Br.) Sacc.
Entre hojas de planifolias. Loc. 1. 10-90. «Bolets de Catalunya». X. 1991. Núm. 459.
- * **Delicatula integrella** (Pers. : Fr.) Fay.
Margen de curso de agua, sobre raíces de herbáceas y restos leñosos. Loc. 11. 5-8-89. Núm. 1162 B.
- * **Entoloma griseocyaneum** (Fr. : Fr.) Mos.
Entre la hierba, en claros de hayedo. Loc. 1. 10-91. Núm. 1714 B.
- * **Entoloma icterinum** (Fr. : Fr.) Mos.
Bajo hayas. Loc. 1. 15-10-90. Núm. 1695 B.

- Entoloma nidorosum** (Fr.) Quél.
Bajo hayas. Loc. 1. 16-10-90. Núm. 1696 B.
- Entoloma rhodopolium** (Fr.) Kummer.
Bajo hayas. Loc. 1. 9-8-87. Núm. 273 B.
- * **Hygrocybe coccinea** (Sch. : Fr.) Kumm. var. **umbonata** Kumm.
Margen arenoso, bajo castaños. Loc. 5. 14-10-90.
- * **Hygrocybe insipida** (Lge. ex Lundell) Mos.
Bajo *Pinus sylvestris*. Loc. 13. 12-11-90. Núm. 1701 B.
- Hygrocybe pseudoconica** Lange [= *H. nigrescens* (Quél.) Kühn.]
En un camino de hayedo. Loc. 1. 21-9-89. Núm. 1234 B.
- * **Hygrophorus mesotephrus** B. & Br.
En claros herbosos de hayedo. Loc. 1. 12-10-90. Núm. 1701 B.
- Hygrophorus pudorinus** (Fr.) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1505 B. «Bolets de Catalunya». X. 1991. Núm. 472.
- * **Inocybe calamistrata** (Fr.) Gill.
Sobre tierra muy húmeda, en hayedo. Loc. 1. 25-8-89. Núm. 1525 B. En el hayedo. Loc. 1. 10-89. Núm. 1476 B.
- * **Inocybe godeyi** Gill.
Bajo hayas. Loc. 1. 9-89. Núm. 1288 B.
- * **Inocybe fibrosoides** Kühn & Bours.
- * **Inocybe pudica** Kühn.
Bajo *Pinus sylvestris* Loc. 1. 12-10-89. Núm. 1300 B.
- * **Inocybe sindonia** (Fr.) P. Karst. [= *I. kuehneri* Stangl & Wesl.]
Bajo *Abies alba* y *Larix sp.* Loc. 7. 17-10-90. Núm. B.
- * **Inocybe subnudipes** Kühn.
Entre hojas de haya caídas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1518 B.
- Laccaria bicolor** (R. Mre.) Orton.
En el hayedo, entre las hojas caídas. Loc. 1. 10-89. Núm. 1488 B.
- * **Lepiota grangei** (Eyre) Lge.
En el hayedo, entre hojas caídas. Loc. 1. 7-10-89. Núm. 1536 B. «Bolets de Catalunya». IX. 1990. Núm. 423.
- * **Lepiota ventriosospora** Reid.
Bajo hayas. Loc. 1. 16-9-90. Núm. 1692 B. Bajo *Pinus sylvestris*. Loc. 13. 12-11-90. Núm. 1674 B.
- * **Leucoagaricus macrorhizus** (Locq.) Sing.
Entre vegetación de ribera. Loc. 5. 5-9-90. Núm. 1670 B. «Bolets de Catalunya». II. 1983. Núm. 80.
- Leucoagaricus serenus** (Fr.) Bon & Boiff. [= *Pseudobaeospora serena* (Fr.) Locq.]
Entre vegetación de ribera. Loc. 5. 5-9-90. Núm. 1671 B.
- Marasmius bulliardii** Quél.
Sobre hojas de castaño y de roble. Loc. 12. 1-9-90. Núm. 1683 B.
- * **Marasmius buxi** Fr. ap. Quél.
Sobre hojas muertas de *Buxus sp.* Loc. 4. 15-4-89. Núm. 1052 B.
- * **Marasmius torquescens** Quél.
Sobre restos leñosos, en el hayedo. Loc. 1-8-84. Núm. 208 B.
- Mycena rubromarginata** (Fr. : Fr.) Kummer.
Bajo encinas. Loc. 6. 16-10-90. Núm. 1698 B.
- * **Omphalina rosella** (Leg.) Mos.
Loc. 1. 10-89. Núm. 1517 B. Leg. y determinación J. M. Vidal.
- * **Pholiota aporos** (Kühn. et Romag.) Clç.
Entre castaños y hayas. Loc. 5. 4-5-88. Núm. 904 B.
- Pleurotus ostreatus** (Jacq. : Fr.) Kummer.
Sobre un tocón de haya. Loc. 1. 8-9-90. Núm. 1665 B. «Bolets de Catalunya». I. 1982. Núm. 42.
- Pluteus chrysophaeus** (Schff. : Fr.) Quél.
Sobre tocón de haya. Loc. 1. 24-8-89. Núm. 1129 B.
- * **Psathyrella cotonea** (Quél.) K. & M.
En el hayedo. Loc. 1. 7-10-89. Núm. 1536 B.

- * **Psathyrella spadicea** (Schff. : Fr.) Sing.
Entre raíces de coníferas ornamentales. Loc. 4. 18-5-91.
- Ripartites tricholoma** (A. & S. : Fr.) Karsten
Entre acículas de *Picea* sp. Loc. 1. 10-89. Núm. 1534 B. «Bolets de Catalunya». IX. 1990. Núm. 439.
- * **Symocybe rubi** (Berk.) Sing.
Sobre madera muerta de haya. Loc. 1. 24-8-89. Núm. 1138 B.
- * **Strobilurus tenacellus** (Pers. : Fr.) Sing.
Sobre conos enterrados de *Pinus sylvestris*. Loc. 13. 10-4-91. Núm. 1715 B.
- Tricholoma columbetta** (Fr.) Kummer.
Bajo *Quercus ilix* y *Quercus* sp. Loc. 3. Leg. L. Molini. 16-11-90. Núm. 1589 B.
- * **Tricholoma pardinum** Quéf.
En el hayedo. Loc. 1. 21-9-89. Núm. 1249 B. «Bolets de Catalunya». V. 1986. Núm. 248.
- Tricholoma sciodes** (Pes.) Martin.
En el hayedo. Loc. 1. 2-9-89. Núm. 1250 B.
- * **Volvariella caesiocincta** Orton.
Sobre restos de madera de haya, muy descompuesta. Loc. 1. 6-8-87. Núm. 276 B.

Orden Russulales

- Lactarius atlanticus** Bon f. *Strigipes* Bon.
Entre la hierba, en un jardín. Loc. 3. Leg. J. Negre. 18-11-90. Núm. 1585 B.
- Lactarius bertillonii** (Nevk. ex Z. Sck.) Bon var. *Queletii* Blum.
En el hayedo. Loc. 1. 12-7-87. Núm. 764 B. Loc. 1. 14-7-89. Núm. 1176 B. y 10-8-89. Núm. 1151 B.
- Lactarius cistophilus** Bon & Trimb.
Bajo *Cistus* sp. Loc. 2. 10-10-89. Núm. 844 B. «Bolets de Catalunya». XX. 1990. Núm. 419.
- Lactarius lilacinus** (Lasch.) Fr.
Bajo *Alnus glutinosa*, en una ribera. Loc. 9. 10-6-84. Núm. 774 B.
- Lactarius pergamenus** (Swartz) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 1-8-87. Leg. A. Duran y A. Quiles. Núm. 774 B. 17-7-89. Núm. 1170 B.
- Russula acrifolia** Romagn.
Bajo *Quercus suber* y *Pinus* sp. Leg. J. Martí. Loc. 2. 6-11-87. Núm. 822 B.
- Russula densifolia** Gill.
Bajo *Quercus* sp. y *Castanea sativa*. Loc. 6. 21-6-90. Núm. 1418 B.
- * **Russula faginea** Romagn.
Bajo hayas. Loc. 1. 28-7-89. Núm. 1201 B.
- Russula fellea** (Fr. : Fr.) Fr.
Bajo hayas. Loc. 1. 16-10-90. Núm. 1705 B.
- * **Russula parazurea** J. Schaeff.
En el hayedo. Loc. 1. 11-8-90. Núm. 1688 B.
- Russula pectinata** Fr. ss. Romagn.
Bajo hayas. Loc. 1. 28-7-89. Núm. 1201 B.
- * **Russula seperina** Dup.
Bajo encinas. Loc. 2. 11-87. Núm. 845 B.
- * **Russula solaris**, Ferd. et Winge.
Bajo hayas. Loc. 1. 10-86. Núm. 800 B. 24-8-89. Núm. 1246 B.
- Russula subfoetens** W. G. Smith.
En claros del hayedo, entre la hierba. Loc. 1. 28-7-89. Núm. 1198 B.

GASTEROMYCETES

Orden Geastraceae

Geastrum fimbriatum (Fr.) Fischer [= *G. sessile* (Sow.) Pouzar.]

Entre ortigas, en el margen de un camino, en el hayedo. Loc. 1. 11-9-87. Núm. 572 B.

* **Geastrum pectinatum** Pers. : Pers.

Bajo coníferas ornamentales. Loc. 4. 18-5-91. Núm. B.

* **Geastrum quadrilidum** Pers.: Pers.

Bajo *Juniperus communis*. Loc. 1. 8-91.

Orden Lycoperdaceae

Bovista nigrescens Pers. : Pers.

Bajo hayas. Loc. 1. 5-87. Núm. 1091 B. 26-3-89. Núm. 1041 B. 24-2-90. Núm. 1367 B.

Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan.

Entre hojas secas de haya. Loc. 1. Núm. 1497 B.

Orden Hysterangiaceae

* **Hysterangium separabile** Zeller 1941 [= *H. clathroides* autc. (non Vitt.)]

Bajo *Abies alba*. Loc. 4. 18-5-91.

Orden Melanogastraceae

* **Alpova rubescens** (Vitt.) Trappe 1975.

Bajo *Abies alba* y *Picea sp.* Loc. 1. 18-5-91. Identificación J. M. Vidal.

Nota:

Las especies sin número de herbario, están pendientes de su registro en la micoteca, en la fecha de redacció de este trabajo.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos, una vez más, la colaboración de los especialistas del Departamento de Botánica de la Facultad de Biología, M. AGUASCA, J. LLISTOSELLA, I. LLORENS, M. P. MARTÍN y D. SIERRA, así como a J. M. VIDAL y a los demás miembros de la S.C.M. que nos han ayudado con legados y colaborando en determinaciones. A los Doctores R. PÖDER, F. D. CALONGE y G. MORENO por su ayuda en algunas identificaciones de especies críticas y al Dr. X. LLIMONA, que nos ha guiado en la preparación de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

- AZÉMA, R. C. (1988). Cortinaires recoltés à Sant Hilari Sacalm. Documents Mycologiques. n.º 73:1-21.
- BOLÓS, de O. (1983). La vegetación del Montseny. Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals.
- BREITENBACH, J. KRÄNZLIN, F. (1981-1986). Champignons de Suisse. Tome I. Ascomycètes. Tome II. Champignons sans lames. Tome III. Bolets et champignons à lames. 1ère partie. Lucerne.
- BERTEA, P. BON, M. CHEVASSUT, G. COURTECUISSÉ, R. LECOT, C. NEVILLE, P. PROUST, F. RASCOL, J. P. (1869). Les Noms valides des Champignons. Annales n.º 1 Fed. Assoc. Mycol. Mediterranéennes. 2ème. édition.
- BON, M. (1988). Guía de Campo de los Hongos de Europa. Edicions Omega, S.A. Barcelona, 351 pp.
- CALONGE, F. D., ROCABRUNA, A., TABARÉS, M. y RODRÍGUEZ, N. B. (1985). Contribución al estudio de los Ascomicetes españoles. Boletín S.M. de Madrid, n.º 9: 54-53.
- CALONGE, F. D., ROCABRUNA, A., TABARÉS, M. y SIERRA, D. (1986). Contribución al estudio de los Ascomycotina españoles II. Boletín S.M. de Madrid V. 11(1): 27-37.
- CALONGE, F. D., ROCABRUNA, A., TABARÉS, M. y SIERRA, D. (1986). Contribución al estudio de la Ascomycotina españoles III. Butlletí S.C.M. n.º 10.: 35-47.
- ERIKSSON, O. & HAWKSWORTH, D. L. (1987). An alphabetical list of the generic names of Ascomycetes. Systema Ascomycetum 6 (1): 1-109.
- GIRBAL, J. (1986). Fongs del Montseny. El patrimoni biològic del Montseny. Diputació de Barcelona.: Catàlegs de Flora i Fauna I. Diputació de Barcelona. 12-30.
- JÜLICH, Walter (1984). Guida alla determinazione de funghi. Vol. 2.º Trento. 597.
- LLISTOSELLA, J., AGUASCA, M. (1986). El 1.º «Mini-Foray» de la British Mycological Society a Catalunya. Butlletí S.C.M. n.º 10. : 19-33.
- MARCHAND, A. (1980 a 1986). Champignons du nord et du midi. Vol. 1 al 9. Perpignan.
- MARTÍN, M. P. (1988). Aportación al conocimiento de las Higoforáceas y Gasteromicetes de Catalunya. Edic. Esp. S.C.M. Vol. II.: 508.
- MOSER, M. (1978). Guida alla determinazione del funghi. Trento. 565.
- ROCABRUNA, A., TABARÉS, M. (1985). Aportaciones a la flora micológica de Catalunya. El Ordre Boletales. Gilbert. Butlletí S.C.M. n.º 9.: 27-37.
- SANCLEMENTE, M. S. y LLIMONA, X. (1987). Aportación al conocimiento de las Tricolomatáceas de Cataluña. Butlletí S.C.M. n.º 11.: 29-72.
- SIERRA, D. (1987). Aportación al conocimiento de los Ascomicetes (Ascomycotina) de Catalunya. Edic. Esp. S.C.M. Vol. I.: 481.
- SIERRA, D., ROCABRUNA, A., TABARÉS, M. (1987). Aportación al Catálogo de Ascomicetes de Catalunya. Butlletí S.C.M. n.º 11.: 99-110.
- SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA (1982-1988) «Bolets de Catalunya»: col·leccions I a IX. 450.
- TORRE, M. de la, ROCABRUNA, A., TABARÉS, M., ARROYO, I. y CALONGE, F. D. (1987). Contribución al estudio de los Ascomycotina españoles IV. Boletín S.M. de Madrid. n.º 12.: 35-38.