


Lista de los peces de la provincia de Corrientes



Diego O. Nadalin, Lucila C. Protogino y Hugo L. López

**Indizada en la base de datos ASFA C.S.A.
2017**

**LISTA DE LOS PECES
DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES**

Diego O. Nadalin, Lucila C. Protogino y Hugo L. López

División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP
Paseo del Bosque s/n, 1900-La Plata, Buenos Aires, Argentina

...los censos de la fauna de un país o región cualquiera, constituyen una suerte de codificación de la Naturaleza, como paso previo e indispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las riquezas naturales y de su adecuada conservación. Desde fines del siglo XVIII se ha dicho, y lo han repetido en nuestro medio, Cosme Argerich, Alberto Palcos y otros estudiosos y científicos, que un Código de la Naturaleza es indispensable para la libertad de una nación. [R. A. Ringuelet & R. H. Arámburu. Enumeración sistemática de los vertebrados de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, MAA, Publ. 119, 1957].

Julio 2017

Introducción

Esta serie tiene como finalidad dar a conocer las especies presentes en los diferentes estados provinciales de la Argentina, con el objetivo de contribuir a precisar el conocimiento ictiofaunístico regional dentro de los marcos biogeográficos e hídricos correspondientes. Por otra parte, estas listas son pertinentes, a la hora de intentar dar dimensión a la riqueza de cada territorio provincial tratado.

Tomando como base los trabajos de López *et al.*, (2003); Reis *et al.*, (2003); Liotta (2006) y Ferraris (2007) hemos actualizado el elenco ictiofaunístico en cada territorio provincial, siguiendo en parte la macrosistemática de Mirande & Koerber (2015).

En este nuevo número, tratamos la provincia de Corrientes la que se encuentra situada al noreste de nuestro territorio, limitada por las provincias de Entre Ríos, Misiones, Chaco y Santa Fe.

Entre los antecedentes que se ocuparon de la ictiofauna de esta provincia encontramos aquellos trabajos cuyo tratamiento fue considerado dentro de la ictiofauna de la Mesopotamia, tal como el de López *et al.*, 2005. En otro orden, las contribuciones de Casciotta *et al.*, en los años 2003 y 2005 y de Iwaszkiw *et al.*, 2010 han sido enfocados en determinados ambientes de su territorio.

En nuestra metodología no se realizan, con excepción de la localidad tipo y del nombre vulgar, comentarios ni observaciones sobre las especies señaladas ya que estos se encuentran en la bibliografía adjunta. En el caso de los nombres vulgares la abreviatura (G) corresponde a la lengua Guaraní y (P) al Portugués. Se incluyen dos tablas que contienen información sobre especies introducidas (Tabla I) y de aquellas de presencia dudosa o que requieren confirmación en el territorio provincial (Tabla II). En este último caso se cita el trabajo que las menciona por primera vez.

Biogeografía Continental

Región Neotropical: Subregiones Guayano-brasileña, Dominio Subtropical, Distrito Mesopotámico (Ringuelet, 1961);

Región Neotropical: Subregión Brasílica, Dominio Paranense, Provincia Parano-Platense (Ringuelet, 1975);

Región Neotropical: Subregión Brasílica, Provincia Parano-Platense (Arratia *et al.*, 1983);

Región Neotropical: Subregión Chaqueña (Morrone, 2001);

Región Neotropical: Provincia de los Grandes Ríos (López *et al.*, 2008).

Cuencas Hídricas

Del Río de la Plata (Mazza, 1961);

Cuenca propia del río Paraná hasta Confluencia, cuenca del río Santa Lucía, cuenca del río Corrientes, cuenca del río Aguapey, cuenca de arroyos menores de Corrientes afluentes del río Uruguay, cuenca del río Miriñay, cuenca del río Guayquiraró, cuenca propia del río Uruguay en Argentina, cuenca del río Mocoretá, cuenca propia del río Paraná medio (Liotta, 2006).

Clase	ELASMOBRANCHII
Orden	MYLIOBATIFORMES
Familia	POTAMOTRYGONIDAE

Potamotrygon Garman, 1877

P. brachyura (Günther, 1880)

Loc. Tipo: Buenos Aires.

N. v.: raja; yabebí, yavevih (G).

P. falkneri Castex y Maciel, 1963

Loc. Tipo: Puerto de la ciudad de Santa Fe, río Paraná, Argentina.

N. v.: raya, raya de río; yavevih (G).

P. hystric (Müller & Henle, 1841)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: chuco pintado, raya, raya brava, raya negra; yabebí, yavebuí, yavevih (G).

P. motoro (Müller & Henle, 1841)

Loc. Tipo: Río Guaporé, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: boró, chuco de río, raya fina, raya grande, raya, raya común, raya pintada de las piedras; vivevih, rala-maca, yabebí, yavebuí-guazú (G); arraia, raia (P).

Clase	ACTINOPTERYGII
Orden	CLUPEIFORMES
Familia	CLUPEIDAE

Platanichthys Whitehead, 1968

P. platana (Regan, 1917)

Loc. Tipo: Río de la Plata.

N. v.: mandufia.

Familia ENGRAULIDAE

Lycengraulis Günther, 1868

L. grossidens (Agassiz, 1829)

Loc. Tipo: Río de Janeiro, Brasil.

N. v.: anchoa de río, sardina.

Familia PRISTIGASTERIDAE

Pellona Valenciennes, 1847

P. flavipinnis (Valenciennes, 1837)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: anchoa de río, lacha, lacha pelada, mandufia de río, saraca, sardina de río; sardinhão (P).

Orden CHARACIFORMES

Familia HEMIODONTIDAE

Hemiodus Müller, 1813

H. orthonops Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay.

N. v.: sardina de río.

Familia PARODONTIDAE

Apareiodon Eigenmann, 1916

A. affinis (Steindachner, 1879)

Loc. Tipo: La Plata (probablemente por región del Plata), Buenos Aires.

N. v.: virolito; pirá palito (G); canivete, duro-duro (P).

Parodon Valenciennes, 1849

P. carrikeri Fowler, 1940

Loc. Tipo: Río Lipeo, Salta, Argentina.

Familia CURIMATIDAE

Curimatella Eigenmann & Eigenmann, 1889

C. dorsalis (Eigenmann & Eigenmann, 1889)

Loc. Tipo: Rio Solimbes en Coari, Amazonas, Brasil.

N. v.: blanquillo, boguita, sabalito.

Cyphocharax Fowler, 1906

C. platanus (Günther, 1880)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: huevada, sabalito plateado; curimbatasinho (P).

C. saladensis (Meinken, 1933)

Loc. Tipo: Tributario del río Salado en Santa Fe, Argentina.

N. v.: sabalito.

C. spilotus (Vari, 1987)

Loc. Tipo: Río Santa María en puente sobre la ruta BR 293 entre Don Pedrito y Livramento, Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: sabalito.

C. voga (Hensel, 1870)

Loc. Tipo: Río dos Sinos, en São Leopoldo, Brasil.

N. v.: huevada, sabalito, sábalo roñoso; curimbatasinho, papa-terra (P).

Potamorhina Cope, 1878

P. squamoralevis (Braga y Azpelicueta, 1983)

Loc. Tipo: Río Paraná en Rosario, Santa Fe, Argentina.

N. v.: blanquillo, yulilla; branquingha, branquiña (P).

Psectrogaster Eigenmann & Eigenmann, 1889

P. curviventris Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Asunción, río Paraguay, Paraguay.

N. v.: llorona; blanquillo (P).

Steindachnerina Fowler, 1906

S. brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889)

Loc. Tipo: Rosario, sistema del Río de la Plata, Santa Fe, Argentina.

N. v.: blanquillo, huevada, sabalito; carimbatá (G.); curimbatasinho, saguirú (P).

S. conspersa (Holmberg, 1891)

Loc. Tipo: Río Paraguay, Formosa, Argentina.

Familia **PROCHILODONTIDAE**

Prochilodus Agassiz, 1829

P. lineatus (Valenciennes, 1837)

Loc. Tipo: Río de la Plata, en Buenos Aires, Brasil.

N. v.: sábalo.

Familia **ANOSTOMIDAE**

Abramites Fowler, 1906

A. hypselonotus (Günther, 1868)

Loc. Tipo: Xeberos, Amazonas Superior, Perú.

N. v.: jikii.

Leporellus Lütken, 1874

L. pictus (Kner, 1859)

Loc. Tipo: Irisanga (Orissanga), Estado de San Pablo, Brasil.

N. v.: boga, boguita rayada.

Leporinus Agassiz, 1829

L. acutidens (Valenciennes, 1837)

Loc. Tipo: Sudamérica.

N. v.: boga; pirá-pihtá (G); araçau, aracau branco, piava (P).

L. lacustris Amaral Campos, 1945

Loc. Tipo: Pirassununga, Estado de San Pablo, Brasil.

N. v.: boga.

L. striatus Kner, 1858

Loc. Tipo: Irisanga y Caiçara, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: boga estriada, boga pintada, boga rayada, trompa roja; canivete, piava, riscadinho (P).

Megaleporinus Ramirez, Birindelli & Galetti, 2017

M. obtusidens (Valenciennes, 1837)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: boga, bogón; piava, piaba, piapara, piará-uçu, piau (P).

Pseudanos Winterbottom, 1980

P. trimaculatus (Kner, 1858)

Loc. Tipo: Brasil.

Schizodon Agassiz, 1829

S. borellii (Boulenger, 1900)

Loc. Tipo: Carandazinho, cercano a Corumbá, río Paraguay, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: boga, boga lisa, boga fina, lisa de agua dulce, vogá; aracú pintado, aracú pintado piau, chimburé, piaba, taguará (P).

S. nasutus Kner, 1858

Loc. Tipo: Irisanga, San Pablo, Brasil.

N. v.: boga.

S. platæ (Garman, 1890)

Loc. Tipo: Rosario, sistema del Plata, Argentina.

N. v.: boga.

Familia **ERYTHRINIDAE**

Hoplerythrinus Gill, 1895

***H. unitaeniatu*s** (Spix & Agassiz, 1829)

Loc. Tipo: Río San Francisco, Brasil.

N. v.: jejú; jerú (P).

Hoplias Gill, 1903

H. malabaricus (Bloch, 1794)

Loc. Tipo: Sudamérica, probablemente Surinam.

N. v.: dientudo, perra loca, perro mocho, pescado negro, tararira, tarucha; pirá-ñaró, taré huí (G); jerú-perro, lobó, rubafó, sovela, tarango, traíra (P).

H. mbigua Azpelicueta, Benítez, Aichino & Mendez, 2015

Loc. Tipo: río Paraná en Nemesio Parma, provincia de Misiones, Argentina, 27°21'23.04"S, 56°01'1.92"W.

N. v.: tararira.

Familia **LEBIASINIDAE**

Pyrrhulina Cuvier & Valenciennes, 1846

P. australis Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay.

N. v.: pirulina.

Familia **GASTEROPELECIDAE**

Engraulisoma Castro, 1981

E. taeniatum Castro, 1981

Loc. Tipo: Rio Cuiabá, Município de Poconé, Mato Grosso, Brasil.

Thoracocharax Fowler, 1906

T. stellatus (Kner, 1858)

Loc. Tipo: Río Cuiabá, Brasil.

N. v.: chirola, pechito, pechudito, pesetita; papudinho (P).

Familia **SERRASALMIDAE**

Metynnис Cope, 1878

M. mola Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Arroyo Trementina, Paraguay.

N. v.: pacú; pacu-peva (P).

M. otuquensis Ahl, 1923

Loc. Tipo: Bahia Negra, río Otuquis, Bolivia o Paraguay.

N. v.: pacú; pacu-peva (P).

Myleus Müller & Troschel, 1844

M. tiete (Eigenmann & Norris, 1900)

Loc. Tipo: Piracicaba, São Paulo, Brasil.

N. v.: pacucito.

Mylossoma Eigenmann & Kennedy, 1903

M. duriventre (Cuvier, 1818)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: brillantina, medallón, pacú reloj, pacucito, piraña pacusa; pacuí, piraí, mbiraí (G); tambaqué (P).

Piaractus Eigenmann, 1903

P. mesopotamicus (Holmberg, 1887)

Loc. Tipo: Río Paraná, Uruguay.

N. v.: pacu; pakú (G); baya, caranha, pez chato, mandua, pacu-caranha (P).

Pygocentrus Müller & Troschel, 1844

P. nattereri Kner, 1858

Loc. Tipo: Cuiabá y Mato Grosso, Brasil.

N. v.: palometa, palometa mora, palometa pacusa, palometa de río, piraña; pirá-añá (G); coicoya, piranha, piranha vermelha, piraya (P).

Serrasalmus Lacépède, 1803

S. maculatus Kner, 1858

Loc. tipo: Rio Guaporé, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: palometa, palometa amarilla, palometa brava, palometa brillante, palometa mora, palometa negra, palomita, piraña; pirá-í (G); catirina, peixe-prato, peixe relógio, pirambé, pirambeba, piranha doce, piranha mathada, piranha pequenina, piranga (P).

S. marginatus Valenciennes, 1837

Loc. Tipo: Río Paraná, Brasil.

N. v.: palometa, palometa amarilla, piraña; catirina, pirambeba, piranha prateada, sachicanga (P).

Familia

CHARACIDAE

Acestrorhynchus Eigenmann, 1903

A. pantaneiro Menezes, 1992

Loc. Tipo: Rio Cuiabá, Volta Grande, Município de Santo Antônio do Leverger, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: dientudo, dientudo dorado, dientudo paraguayo; pirá yobua (G); dentudo dourado, peixe-cachorro (P).

Aphyocharax (Günther, 1868)

A. anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Asunción, Paraguay.

N. v.: mojarrita; pykú (G); pequirá (P).

A. dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Laguna del río Paraguay, Asunción, Paraguay.

N. v.: mojarrita; pykú (G); pequirá (P).

A. nattereri (Steindachner, 1882)

Loc. Tipo: Villa Bella, Río Amazonas, Brasil.

A. rathbuni Eigenmann, 1907

Loc. Tipo: Arroyo Chagalalina, cuenca del Paraguay.

Prionobrama Fowler, 1913

P. paraguayensis (Eigenmann, 1914)

Loc. Tipo: Corumbá, Río Paraguay, Brasil.

Brycon Müller & Troschel, 1845

B. hilarii (Valenciennes 1850)

Loc. Tipo: Rio São Francisco, Brasil (probablemente sea un error, seguramente sea de la cuenca del río Paraguay).

B. orbignyanus (Valenciennes, 1850)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: salmón, salmón de río, salmón criollo, salmonete, salmón del Paraná; pirá-pitá (G); pirápitinga, pirácanjuba (P).

Triportheus Cope, 1871

T. nematurus (Kner, 1858)

Loc. Tipo: Cuaibá, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: dientudo, golondrina; chapé; machete; pirá-güirá (G).

Charax Scopoli, 1777

C. leticiae Lucena, 1987

Loc. Tipo: Posto de Trocará, Igarapé Urubu, Río Tocantins, Pará, Brasil.

N. v.: dentudo.

C. stenorhynchus (Cope, 1894)

Loc. Tipo: Río Jacuhy superior, Estado de Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: dentudo transparente.

Cynopotamus Valenciennes, 1849

C. argenteus (Valenciennes, 1836)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: dentudo jorobado, dientudo, gata, mojarra perro, perro blanco; pirá-yaguá (G); saicanga (P).

C. kincaidi (Schultz, 1950)

Loc. Tipo: Paraguay.

N. v.: dentudo; dientudo.

Galeocharax Fowler, 1910

G. humeralis (Valenciennes, 1834)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: dentudo, dientudo, mojarra perro; peixe-cadela, saicanga (P).

Phenacogaster Eigenmann, 1907

P. tegatus (Eigenmann, 1911)

Loc. Tipo: Rio Jauru, cuenca del Río Paraguay superior, Brasil.

Roeboides Günther, 1864

R. affinis (Günther, 1868)

Loc. Tipo: Río Huallaga, sistema del Amazonas, Perú.

N. v.: dentudo, dientudo.

R. descalvadensis Fowler, 1932

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: dentudo, dientudo.

R. microlepis (Reinhardt, 1851)

Loc. Tipo: Río Paraguay, Brasil.

N. v.: dentudo, dientudo.

Cheirodon Girard, 1854

C. ibicuhiensis Eigenmann, 1915

Loc. Tipo: Cacequi, Río Ibicuí, Rio Grande do Sul, Brasil.

C. interruptus (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay.

Heterocheirodon Malabarba, 1998

H. yatai (Casciotta, Miquelarena & Protogino, 1992)

Loc. Tipo: Arroyo El Palmar, Paraje La Glorieta, Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, Argentina.

Macropsobrycon Eigenmann, 1915

M. uruguayanae Eigenmann, 1915

Loc. Tipo: Cacequí, Brasil.

Odontostilbe Cope, 1870

O. microcephala Eigenmann, 1907

Loc. Tipo: Río Pilcomayo, sistema del Plata, Bolivia.

N. v.: mojarra, mojarrin, mojarrita; pikú (G); pequirá (P).

O. paraguayensis Eigenmann & Kennedy, 1903

Loc. Tipo: Asunción, Paraguay.

O. pequirá (Steindachner, 1882)

Loc. Tipo: Villa Bella y Obidos, Río Amazonas, Brasil.

N. v.: mojarra, mojarrita; pequirá (P).

Serrapinnus Malabarba, 1998

S. calliurus (Boulenger, 1900)

Loc. Tipo: Corandasíñho, Brasil; San Lorenzo, provincia de Jujuy, Argentina.
N. v.: mojarra curvada.

S. kriegi (Schindler, 1937)

Loc. Tipo: Centurión, noreste de Paraguay, Paraguay.

Clupeacharax Pearson, 1924

C. anchoveoides Pearson, 1924

Loc. Tipo: Cachuela Esperanza, sistema del Río Amazonas, Bolivia.

Rhaphiodon Agassiz, 1829

R. vulpinus Spix & Agassiz, 1829

Loc. Tipo: Ríos de Brasil.
N. v.: chafalote, dentudo, machete, pez espada, pez machete; pirá-yaguá (G); chambira-challua, dourado-cachorro, sardinão, soirú-pintada (P).

Piabucus Oken, 1817

P. melanostoma Holmberg, 1891

Loc. Tipo: Formosa (Chaco), Argentina; Asunción, Paraguay.

Salminus Agassiz, 1829

S. brasiliensis (Cuvier, 1816)

Loc. Tipo: Brasil.
N. v.: dorado, tigre de río; pirayú (G); dourado, saipé (P).

Gymnocorymbus Eigenmann, 1908

G. ternetzi (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Rio Paraguay, 16°46'S, 57°44'W, Brasil.
N. v.: monjita.

Poptella Eigenmann, 1908

P. paraguayensis (Eigenmann, 1907)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.
N. v.: mojarra; saia branca (P).

Bryconamericus Eigenmann, 1907

B. exodon Eigenmann, 1907

Loc. Tipo: Puerto Max, Paraguay.
N. v.: mojarra, mojarrita.

B. iheringii (Boulenger, 1887)

Loc. Tipo: São Lorenzo, Río Grande do Sul, Brasil.
N. v.: mojarra, mojarrita; lambarí (P).

Ctenobrycon Eigenmann, 1908

C. allenii (Eigenmann & McAtee, 1907)

Loc. Tipo: Corumbá, río Otuquis, Asunción, Paraguay.

Piabarchus Myers, 1928

P. stramineus (Eigenmann, 1908)

Loc. Tipo: Piracicaba; Río Uruguay; Brasil.
N. v.: mojarra; mojarrita; lambarí, piquira (P).

Diapoma Cope, 1894

D. terofali (Géry, 1964)

Loc. Tipo: Canal El Cazador, Río Luján, tributario del Río de la Plata, 34°18'00"S, 58°46'00"W, Buenos Aires, Argentina.

Pseudocorynopoma Perugia, 1891

P. doriae Perugia, 1891

Loc. Tipo: Río de la Plata.

N. v.: mojarra de velo.

Tetragonopterus Cuvier, 1817

T. argenteus Cuvier, 1816

Loc. Tipo: Tipos desconocidos.

N. v.: chanquete, mojarrita, palometa, relojito; patacas (P).

Astyanax Baird & Girard, 1854

A. abramis (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Río Paraná, hasta Rosario, Argentina.

N. v.: mojarra, mojarra pacusa, mojarra matrera, mojarrita; acará-pixuma, lambarí (P).

A. correntinus (Holmberg, 1891)

Loc. Tipo: Río Paraná en Corrientes, Argentina.

N. v.: mojarra.

A. dissensus Lucena & Thofehrn, 2013

Loc. Tipo: Arroyo Candiota, Candiota, aguas abajo de la central termoeléctrica, drenaje del río Jaguarão, 31°34'36"S, 53°40'22"W, Rio Grande do Sul, Brasil.

N. v.: mojarra.

A. eigenmanniorum (Cope, 1894)

Loc. Tipo: Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: chato, mojarra.

A. erythropterus (Holmberg, 1891)

Loc. Tipo: Río de la Plata en Buenos Aires, Río Paraná en Paraná, Argentina.

N. v.: mojarra.

A. lacustris (Lütken, 1875)

Loc. Lagoa Santa, 19°38'S, 43°53'W, Brasil.

A. lineatus (Perugia, 1891)

Loc. Tipo: Río Paraguay, Villa María, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: mojarra; pikih, piky (G); lambarí (P).

A. pynandi Casciotta, Almirón, Bechara, Roux & Ruiz Diaz, 2003

Loc. Tipo: Lobo-Cuá, 28°32' S, 57°12' W, Laguna Iberá, Esteros del Iberá, provincia de Corrientes, Argentina.

A. rutilus (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Río Paraná, Sudamérica.

N. v.: mojarra.

Markiana Eigenmann, 1903

M. nigripinnis (Perugia, 1891)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica.

N. v.: ipau.

Psellogrammus Eigenmann, 1908

P. kennedyi (Eigenmann, 1903)

Loc. Tipo: Campo Grande, Paraguay.

N. v.: mojarrita.

Oligosarcus Günther, 1864

O. jenynsii (Günther, 1864)

Loc. Tipo: Laguna de Maldonado, Uruguay.

N. v.: dentudo, dientudo.

O. longirostris Menezes & Géry, 1983

Loc. Tipo: Río Iguazú, cuenca del Paraná en Porto Lupion, Estado de Paraná, Brasil.

N. v.: dientudo.

O. oligolepis (Steindachner, 1867)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: blanquillo, dentudo, dentudo pintado, dientudo, dientudo común; bocudo, saicanga, sardela, tambicú (P).

Hemigrammus Gill, 1858

H. manheri Uj & Géry, 1989

Loc. Tipo: Bañado cercano a Panchito López, 4 Km de Yabebury, Departamento Misiones, Paraguay.

H. mattei Eigenmann, 1918

Loc. Tipo: Argentina.

H. tridens Eigenmann, 1907

Loc. Tipo: Arroyo Pypucu, cuenca del Río Paraguay, Paraguay.

H. ulreyi (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

Hypheobrycon Durbin, 1908

H. anisitsi (Eigenmann, 1907)

Loc. Tipo: Villa Rica, Paraguay.

N. v.: mojarra

H. auca Almirón, Casciotta, Bechara & Ruiz Diaz, 2004

Loc. Tipo: Estanque en San Juan Poriahú, Esteros de Iberá, provincia de Corrientes, Argentina, 27°41'53"S, 57°12'17"W.

H. bifasciatus Ellis, 1911

Loc. Tipo: Rio Parahyba en Campos, Brazil

H. elachys Weitzman, 1985

Loc. Tipo: Sistema del río Aguaray-guazú, 3 km al nordeste de Lima, Departamento San Pedro, Paraguay, 23°55'S, 56°29'W.

N. v.: mojarra

H. eques (Steindachner, 1882)

Loc. Tipo: Villa Bella y Obidos, Río Amazonas, Brasil.

H. igneus Miquelarena, Menni, López y Casciotta, 1981

Loc. Tipo: Laguna frente a la Escuela N° 12, camino Bella Vista-San Roque, provincia de Corrientes, Argentina.

H. isiri Almirón, Casciotta & Körber, 2006

Loc. Tipo: Arroyo Ubajay, 31°48.94"S, 58°12.41"W, cuenca del río Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina.

H. luetkenii (Boulenger, 1887)

Loc. Tipo: San Lorenzo, Río Grande do Sul, Brasil.

H. meridionalis Ringuelet, Miquelarena y Menni, 1978

Loc. Tipo: cantera sobre ruta provincial N°15, 70 m al sur del canal Delgado, a 30 m del camino en dirección al Río de la Plata, Los Talas, provincia de Buenos Aires, Argentina.

H. reticulatus Ellis, 1911

Loc. Tipo: Río Parahyba, en Campos, Brasil.

H. wajat Almirón & Casciotta, 1999

Loc. Tipo: Laguna Brava, 27°33'S, 58°44'W, provincia de Corrientes, Argentina.

Moenkhausia Eigenmann, 1903

M. dichroura (Kner, 1858)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: mojarra, mojarrita; pikí, pikih (G).

M. intermedia Eigenmann, 1908

Loc. Tipo: Tabatinga, Amazonas, Brasil.

N. v.: mojarra, mojarrita; pikí, pikih (G).

M. sanctaefilomenae (Steindachner, 1907)

Loc. Tipo: Laguna en Santa Filomena, en Río Parnahyba, Brasil.

N. v.: mojarra; pikí, pikih (G).

Familia **CRENUCHIDAE**

Characidium Reinhardt, 1866

C. rachovii Regan, 1913

Loc. Tipo: Probablemente Vila da Quinta, Municipio de Rio Grande, Brasil, 32°05'S, 52°17'W.

N. v.: mojarrita, tritolo.

Orden **SILURIFORMES**

Familia **DORADIDAE**

Anadoras Eigenmann, 1925

A. insculptus (Miranda Ribeiro, 1912)

Loc. Tipo: Manaos, Brasil.

N. v.: armado.

A. weddellii (Castelnau, 1855)

Loc. Tipo: Chiquitos, Bolivia.

N. v.: armado, carataí, yagivá.

Ossancora Sabaj Pérez & Birindelli, 2011

O. eigenmanni (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: armado.

Oxydoras Kner, 1855

O. kneri Bleeker, 1862

Loc. Tipo: Cuiabá, Brasil.

N. v.: armado, armado blanco, armado chancho; itawá-pochih, ytaguá-pochic (G); abotoado, armão, botoado, focinho-de-porco (P).

Platydoras Bleeker, 1863

P. armatulus (Valenciennes, 1840)

Loc. Tipo: río Paraná, Sudamérica.

N. v.: armado.

Pterodoras Bleeker, 1863

P. granulosus (Valenciennes, 1821)

Loc. Tipo: América del Sur.

N. v.: armado, armado amarillo, armado común; abotoado, armão, mandi-capeta, botoao-barriga-de-folha (P).

Rhinodoras Bleeker, 1862

R. dorbignyi (Kner, 1855)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica.

N. v.: armadito, armado, armado amarillo, armado blanco, marieta; abotoado, armão, mandi-capeta (P).

Trachydoras Eigenmann, 1925

T. paraguayensis (Eigenmann & Ward, 1907)

Loc. Tipo: Corumbá, Paraguay.

N. v.: armadito, armado; armadinho (P).

Familia **AUCHENIPTERIDAE**

Ageneiosus Lacépède, 1803

A. inermis (Linnaeus, 1766)

Loc. Tipo: Surinam.

N. v.: mandube cabezón; mandubá, manduvé-í, mandubí, mandové, solalinde (G); mandí-leitero, palmito (P).

A. militaris Valenciennes, 1835

Loc. Tipo: Río de la Plata, Sudamérica.

N. v.: mandové rosado, mandovéi, manduvé, manduvei, manduví (G); mandí-leitero, mandubí fino, palmito (P).

Auchenipterus Valenciennes, 1840

A. nigripinnis (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Paraguay.

N. v.: bagre, hocicón; buzo, palmito, surumanha (P).

A. osteomystax (Miranda Ribeiro, 1918)

Loc. Tipo: Rio Vérmejo, Santa Rita das Anitas, Estado de Goiás, Brasil.

N. v.: buzo, hocicón; pirá bicicleta (G); jorumanha (P).

Trachelyopterus Valenciennes, 1840

T. galeatus (Linnaeus, 1766)

Loc. Tipo: Sudamérica.

N. v.: anujá, bagre apretador, bagre rojizo, torito; mbihyá (G); Maria preta, cangatí, jduzinho (P).

T. lucenai Bertoletti, Pezzi da Silva & Pereira, 1995

Loc. Tipo: Rio Jacuí en saco do Quilombo, unos 29°58'S, 51°15'W, ilha das Flores, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.

Tatia Miranda Ribeiro, 1911

T. neivai (Ihering, 1930)

Loc. Tipo: Rio Piracicaba, Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Familia **PIMELODIDAE**

Bergiaria Eigenmann & Norris, 1901

B. platana (Steindachner, 1908)

Loc. Tipo: La Plata, Argentina.

N. v.: bagre picudo.

B. westermanni (Lütken, 1874)

Loc. Tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

N. v.: bagre, bagre chancho, bagre trompudo, mandí; yarundiá (G); papa-iscaacu (P).

Hemisorubim Bleeker, 1863

H. platyrhynchus (Valenciennes, 1840)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: tres puntos; mandoré, mandové (G); gerupoca, jaripoca (P).

Hypophthalmus Spix, 1829

H. edentatus Spix & Agassiz, 1829

Loc. Tipo: Ríos del Brasil ecuatorial.

N. v.: bagre rosado, barba chata; manduvé (G); manduví rosado, mapará (P).

H. oreomaculatus Nani y Fuster de Plaza, 1947

Loc. Tipo: Puerto Gaboto, río Paraná, Santa Fe, Argentina.

N. v.: bagre rosado, manduví rosado.

Iheringichthys Evermann & Norris, 1900

I. labrosus (Lütken, 1874)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: bagre trompudo.

Luciopimelodus Eigenmann, 1888

L. pati (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: patí; patí canal, piracatinga, morre-morre (P).

Megalonema Eigenmann, 1912

M. argentinum (MacDonagh, 1938)

Loc. Tipo: Río Paraná en Posadas, provincia de Misiones, Argentina.

N. v.: patí de aletas negras.

M. platanum (Günther, 1880)

Loc. Tipo: Río Paraná, tributario del Río de la Plata.

N. v.: bagre blanco, bagre plateado, cabezón, mal anuncio, patí labrado, porteñito, patí bastardo; patí (G).

Parapimelodus La Monte, 1932

P. valenciennis (Lütken, 1874)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: bagarito, bagre misionero, bagre picudo, bagre porteño, porteñito; mandí-í (G); mandí (P).

Pimelodus Lacépède, 1803

P. absconditus Azpelicueta, 1995

Loc. Tipo: San Javier, río Uruguay, provincia de Misiones, Argentina.

N. v.: bagre.

P. albicans (Valenciennes, 1840)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.

N. v.: bagre, bagre blanco, indio, moncholo, moncholo blanco, porteñito; mandí-guasú (G); bagre branco, mandí, mandí-morotí, mandí-branco, trompudo (P).

P. argenteus Perugia, 1891

Loc. Tipo: Río de la Plata; Río Paraná, Argentina.

N. v.: bagre.

P. maculatus Lacépède, 1803

Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: amarillo, bagre amarillo, bagre manchado, bagre misionero, bagre overo, bagre pintado; mandí amarelo, mandí pintao, mandí saigú, mandí tinga (P).

P. misteriosus Azpelicueta, 1998

Loc. Tipo: Arroyo Anselmo, Candelaria, provincia de Misiones, Argentina.

P. ornatus Kner, 1858

Loc. Tipo: Surinam; Río Negro y Cuiabá, Brasil.

N. v.: bagre, bagre fajado; mandi-saihyú, mandií-guaçú (G); cabecudo, mandí pinima (P).

Pseudoplatystoma Bleeker, 1862

P. coruscans (Spix & Agassiz, 1829)

Loc. Tipo: Río San Francisco, Tres Marias y Pirapora, 18°13'S, 45°15'W, Minas Gerais, Brasil.

N. v.: cachorro (juvenil), mangrullo, surubí, surubí común o manchado, sorubí pintado, surubim; caconete, caparaoy, loango, pintado, piracajíara, piraquera (P).

P. reticulatum Eigenmann & Eigenmann, 1889

Loc. Tipo: Rio Negro, Amazonas, Brasil.

N. v.: cachorro (juvenil), surubí atigrado, surubí; pirá-pará (G); pirambucú, piracambucú, sorubim rayado (P).

Sorubim Agassiz, 1829

S. lima (Bloch & Schneider, 1801)

Loc. Tipo: Río Maranham, Brasil.

N. v.: cucharita, cucharón, lija, lisa, patí zapatilla, pico de pato; mandové, manduvé, manduví, manduví cucharon (G); bico de pato, colhereiro, donzela, jurú pecem (P).

Steindachneridion Eigenmann & Eigenmann, 1919

S. scriptum (Miranda Ribeiro, 1918)

Loc. Tipo: Itaquí, Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: bagre, bagre cabezón, mocholo, surubí.

Zungaro Bleeker, 1863

Z. jahu (Ihering, 1898)

Loc. Tipo: Río Tietê, São Paulo, Brasil.

N. v.: manguruyu.

Familia

PSEUDOPIMELODIDAE

Microglanis Eigenmann, 1912

M. cottooides (Boulenger, 1891)

Loc. Tipo: Río Camaquam (Camacuã), Río Grande do Sul, Brasil.

N. v.: bagre.

Familia

HEPTAPTERIDAE

Imparfinis Eigenmann & Norris, 1900

I. mishky Almirón, Casciotta, Bechara, Ruiz Díaz, Bruno, D'Ambrosio, Solimano & Soneira, 2007

Loc. Tipo: Esteros de Ibera, río Corriente, Capitá Miní, 28°53'15.3"S, 58°22'02.7"W, cuenca del Río Paraná, provincia de Corrientes, Argentina.

Phenacorhamdia Dahl, 1961

P. tenebrosa (Schubart, 1964)

Loc. Tipo: Rio Mogi Guaçu, Brasil.

Pimelodella Eigenmann & Eigenmann, 1888

P. gracilis (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Río Paraná en Corrientes, Argentina.

N. v.: bagre, bagre cantor, bagre gris, bagre raquílico, burrito; dundu, mandií-chorao, mandí-roncador (P).

P. laticeps Eigenmann, 1917

Loc. Tipo: Sapucay, Paraguay.

N. v.: bagre cantor, bagre gris.

P. taenioptera Miranda Ribeiro, 1914

Loc. Tipo: Rio Sepotuba, Tapirapoan, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Rhamdia Bleeker, 1858

R. quelen (Quoy & Gaimard, 1824)

Loc. Tipo: Entre Caño Pastos y Hamburgo, tributario del Río Samiria, Departamento Loreto, Perú.

N. v.: bagre, bagre de arroyo, bagre lagunero, bagre negro, bagre sapo, jundia, moncholo lagunero.

Familia

CETOPSIDAE

Cetopsis Agassiz, 1829

C. gobiooides Kner, 1858

Loc. Tipo: Irisanga, Brasil.

N. v.: bagre, bagrecito, tiburoncito.

Familia

ASPREDINIDAE

Bunocephalus Kner, 1855

B. doriae Boulenger, 1902

Loc. Tipo: Villa Rica, Paraguay; Posadas, Río Paraná, Argentina.

N. v.: guitarrita; morceguinho (P).

Pseudobunocephalus Friel, 2008

P. rugosus (Eigenmann & Kennedy, 1903)

Loc. Tipo: Laguna cercana al arroyo Chagalalina, Paraguay.

N. v.: guitarrita.

Xyliophius Eigenmann, 1912

X. barbatus Alonso de Arámburu y Arámburu, 1962

Loc. Tipo: Río Paraná en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.

N. v.: guitarrita.

Familia

TRICHOMYCTERIDAE

Homodiaetus Eigenmann & Ward, 1907

H. anisitsi Eigenmann & Ward, 1907

Loc. Tipo: Riacho en Villa Rica, Río Paraguay, Paraguay.

Ochmacanthus Eigenmann, 1912

O. batrachostoma (Miranda Ribeiro, 1912)

Loc. Tipo: Río Paraguay en São Luis de Cáceres, Corumbá, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Pseudostegophilus Eigenmann & Eigenmann, 1889

P. maculatus (Steindachner, 1879)

Loc. Tipo: La Plata (probablemente por región del Plata), provincia de Buenos Aires, Argentina.

N. v.: camarón.

Ituglanis (Costa & Bockmann, 1993)

I. eichhorniarum (Miranda Ribeiro, 1912)

Loc. Tipo: Cáceres, Río Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Scleronema Eigenmann, 1917

S. operculatum Eigenmann, 1917

Loc. Tipo: Cacequy, Brasil.

Trichomycterus Valenciennes, 1846

T. johnsoni (Fowler, 1932)

Loc. Tipo: Descalvados, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Paravandellia Miranda Ribeiro, 1912

P. oxyptera Miranda Ribeiro, 1912

Loc. Tipo: Cáceres, Rio Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: chupa sangre; pirá-candú (G).

Familia

CALLICHTHYIDAE

Callichthys Scopoli, 1777

C. callichthys (Linnaeus, 1758)

Loc. Tipo: Ríos de América.

N. v.: amarillito, cascarudo, peyón, soldado, vieja; camboatá, pirá tatú (G); cascudo, tamoatá (P).

Hoplosternum Gill, 1858

H. littorale (Hancock, 1828)

Loc. Tipo: Demerara, Guyana.

N. v.: cascarudo, peyón; gilipo, tardeí (G); tamboatam, curite, cascudo (P).

Leptoplosternum Reis, 1997

L. pectorale (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Monte Sociedad, Departamento Chaco, Paraguay.

N. v.: cascarudo.

Corydoras Lacépède, 1803

C. aeneus (Gill, 1858)

Loc. Tipo: Trinidad, Antillas Occidentales.

N. v.: tachuela; pirá-itá (G).

C. hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888
Loc. Tipo: Villa Bella (= Parintins, 2°38'S, 56°45'W), Amazonas, Brasil.
N. v.: amarillito, mandí-pimienta, sarro, tachuela, dwarf; pirá-itá (G).

C. paleatus (Jenyns, 1842)
Loc. Tipo: América del Sur, localidad exacta incierta.
N. v.: amarillito, barriga de fuego, basurero, limpia fondos, quitasueño, tachuela; chavití, pirá-itá (G).

C. undulatus Regan, 1912
Loc. Tipo: La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Familia **LORICARIIDAE**

Hypoptopoma Günther, 1868

H. inexspectatum (Holmberg, 1893)
Loc. Tipo: Río Paraguay, cerca de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, Argentina.
N. v.: vieja de agua, vieja.

Otocinclus Cope, 1871

O. arnoldi Regan, 1909
Loc. Tipo: "La Plata" (Río de la Plata?), Sudamérica.
N. v.: vieja de agua, viejita.

O. vestitus Cope, 1872
Loc. Tipo: tributario del Río Ambyiacu (Ampiyacu) cerca de Pebas, unos 03°40'S, 71°45'W,
Departamento Loreto, Perú.

O. vittatus Regan, 1904
Loc. Tipo: Descalvados, Sistema del Río Paraguay, Estado de Mato Grosso, Brasil.
N. v.: vieja de agua.

Hisonotus Eigenmann & Eigenmann, 1889

H. maculipinnis (Regan, 1912)
Loc. Tipo: Rio de la Plata, Sudamérica.

H. nigricauda (Boulenger, 1891)
Loc. Tipo: Rio Grande do Sul, Brasil.
N. v.: limpiavidrios.

Hemiancistrus Bleeker, 1862

H. fuliginosus Cardoso & Malabarba, 1999
Loc. Tipo: Río Jacutinga, camino Seara-Concórdia (BR283), Concórdia, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Ancistrus Kner, 1854

A. cirrhosus (Valenciennes, 1836)
Loc. Tipo: Corrientes.

Megalancistrus Isbrucker, 1980

M. parananus (Peters, 1881)
Loc. Tipo: Río Paraná en La Paz, provincia de Entre Ríos, Argentina.
N. v.: vieja, vieja espinosa; cascudo, cascudo abacaxi (P).

Hypostomus Lacépède, 1803

H. alatus Castelnau, 1855
Loc. Tipo: Río Sabara, Estado de Minas Gerais, Brasil.
N. v.: vieja, cascarudo; acarí, cascudo (P).

H. arecuta Cardoso, Almirón, Casciotta, Aichino, Lizarralde & Montoya-Burgos, 2012
Loc. Tipo: Río Paraná en Puerto Yahapé, 27°29'54.5"S, 56°42'47.00"W, Ituzaingó, provincia de Corrientes, Argentina.

H. borellii (Boulenger, 1897)

Loc. Tipo: Misión de San Francisco, Río Pilcomayo, Bolivia.
N. v.: vieja.

H. boulengeri (Eigenmann & Kennedy, 1903)

Loc. Tipo: Mato Grosso, Brasil o Asunción, Paraguay.

H. cochliodon Kner, 1854

Loc. Tipo: Río Cuiabá, Brasil.
N. v.: vieja; cascudo, coroncho, panaque (P).

H. commersoni Valenciennes, 1836

Loc. Tipo: Río de la Plata, Montevideo, Uruguay.
N. v.: limpiavidrio, vieja, vieja de agua, vieja de río, vieja negra; pirá-tatú, yarú-itacuá (G); acarí, cascudo (P).

H. laplatae (Eigenmann, 1907)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.
N. v.: vieja.

H. latifrons Weber, 1996

Loc. Tipo: Río Aguaray-guazú, cuenca del Río Paraguay, sistemas del Río Paraná, 24°22'50"S, 58°00'W, Paraguay.
N. v.: vieja

H. luteomaculatus (Devincenzi, 1942)

Loc. Tipo: Río Uruguay en Paysandú, Uruguay.
N. v.: vieja, vieja de agua; cascudo (P).

H. microstomus Weber, 1987

Loc. Tipo: Río Alto Paraná, sistema del río Paraná, Departamento Itapuá, 15 km al sureste de Encarnación, Campichuelo, 27°26'S, 55°45'W, Paraguay.
N. v.: vieja de agua.

H. piratatu Weber, 1986

Loc. Tipo: Brazo intermitente del río Tebicuary, sistema del río Paraná, Sapucái, Paraguay.

H. regani (Ihering, 1905)

Loc. Tipo: Río Piracicaba, San Pablo, Brasil.
N. v.: vieja; cascudo (P).

H. ternetzi (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Paraguay.

H. uruguayensis Reis, Weber & Malabarba, 1990

Loc. Tipo: Rio Uruguay en “Rancho da Amizade”, São Borja, Rio Grande do Sul, Brasil.
N. v.: vieja.

Pterygoplichthys Gill, 1858

P. ambrosetti (Holmberg, 1893)

Loc. Tipo: Río Paraguay, en frente de Formosa.
N. v.: vieja.

Rhinelepis Spix, 1829

R. strigosa Valenciennes, 1840

Loc. Tipo: Río Paraná en la provincia de Corrientes, Argentina.
N. v.: vieja.

Farlowella Eigenmann & Eigenmann, 1889

F. amazonum (Günther, 1864)

Loc. Tipo: Río Amazonas en Santarém, Estado de Pará, Brasil.

F. hahni Meinken, 1937

Loc. Tipo: Río Paraná, unos 2 km al Este de Ayolas, 27°24'S, 56°46'W, Departamento Misiones, Paraguay.

N. v.: vieja, vieja de agua.

Sturisoma Swainson, 1838

S. robustum (Regan, 1904)

Loc. Tipo: Río Paraguay.

Brochiloricaria Isbrucker & Nijssen, 1979

B. chauliodon Isbrucker, 1979

Loc. Tipo: Isla El Dorado, Paraná Guazú, 60 Km al noreste de Villa Ballester, provincia de Entre Ríos, Argentina.

Loricaria Linné, 1758

L. simillima Regan, 1904

Loc. Tipo: Canelos, Ecuador.

N. v.: vieja.

L. luciae Thomas, Rodriguez, Carvallaro, Froehlich & Macedo Corrêa E Castro, 2013

Loc. Tipo: Río Paraná en parque privado (Club San Martín), cerca de Perichon, norte de la ruta 12, noreste de Corrientes, 27°25'6.94"S, 58°45'27.47"W, Argentina.

Loricariichthys Bleeker, 1862

L. anus (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: guitarra, vieja, vieja de agua.

L. labialis (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Paraguay.

N. v.: mainmingué, vieja, vieja de agua.

L. melanochelius Reis & Pereira, 2000

Loc. Tipo: Boca del río Ijuí-Mirim, tributario del río Ijuí, Pirapó, cuenca del río Uruguay, 28°03'S 55°11'W, Rio Grande do Sul, Brasil.

N. v.: vieja, vieja de agua.

L. platymetopon Isbrucker & Nijssen, 1979

Loc. Tipo: Lago de Ypacarai, San Bernardino, 25°16'S, 57°16'W, Sistema del Río Paraguay, Paraguay.

N. v.: vieja.

Paraloricaria Isbrucker, 1979

P. agastor Isbrücker, 1979

Loc. Tipo: Paraguay, (localidad imprecisa).

P. vetula (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Vecindad de Buenos Aires, Argentina.

N. v.: vieja, vieja con barba, vieja de agua, vieja de cola, vieja de látigo.

Pseudohemiodon Bleeker, 1862

P. laticeps (Regan, 1904)

Loc. Tipo: Paraguay.

N. v.: vieja de cola.

Ricola Isbrucker & Nijssen, 1978

R. macrops (Regan, 1904)

Loc. Tipo: Rio de la Plata, Argentina/Uruguay.

N. v.: vieja de agua, vieja de cola.

Rineloricaria Bleeker, 1862

R. lanceolata (Günther, 1868)

Loc. Tipo: Xeberos, Río Amazonas superior, Perú.

R. lima (Kner, 1853)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: vieja de agua.

R. parva (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: vieja, vieja de agua.

Spatuloricaria Schultz, 1944

S. evansi (Boulenger, 1892)

Loc. Tipo: Jangada, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: vieja, vieja de agua.

S. nudiventris (Valenciennes, 1840)

Loc. Tipo: Río São Francisco, Brasil.

Orden **GYMNOTIFORMES**
Familia **STERNOPYGIDAE**

Eigenmannia Jordan & Evermann, 1896

E. trilineata López y Castello, 1966

Loc. Tipo: Río de la Plata, cerca de Nuñez, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: señorita.

E. virescens (Valenciennes, 1842)

Loc. Tipo: América del Sur.

N. v.: banderita, caña, cuchilla, cuchillo, chepola, chicho pepino, macheta, morenita, pez espada, ratón, ratona, señorita; pirá-kihsé (G); charuto, peixe espada da lagoa, peixe espada, pestanha, sarapú, tuvira, tuvira branca (P).

Sternopygus Müller & Troschel, 1849

S. macrurus (Bloch & Schneider, 1801)

Loc. Tipo: Brasil.

N. v.: cuchilla.

Familia **APTERONOTIDAE**

Apteronotus Lacépède, 1800

A. albifrons (Linné, 1766)

Loc. Tipo: Surinam

N. v.: cheroga, morena negra.

A. brasiliensis (Reinhardt, 1852)

Loc. Tipo: Río das Velhas, Brasil.

N. v.: morena, morena negra; pirá-mboi (G); boca rachada, sarapó (P).

A. ellisi (Alonso de Arámburu, 1957)

Loc. Tipo: Río bajo Paraná, San Pedro, Buenos Aires, Argentina.

Familia

RHAMPHICHTHYIDAE

Rhamphichthys Müller & Troschel, 1849

R. hahni (Meinken, 1937)

Loc. Tipo: Cuenca del Paraná, cerca de Corrientes, Argentina.

Gymnorhamphichthys Ellis, 1903

G. britskii Carvalho, Ramos & Albert, 2011

Loc. Tipo: Córrego Embaúba, tributario del Río Cuiabá, 14°55'S, 56°27'W, Rosário Oeste, Mato Grosso, Brasil.

Familia

HYPOPOMIDAE

Brachyhypopomus Mago-Leccia, 1994

B. bombilla Loureiro & Silva, 2006

Loc. Tipo: Arroyo Cuarto Palmas, sistema Los Patos-Merín, Ruta 15 km 268, 33°23'43"S, 53°51'53"W, Departamento Rocha, Uruguay.

B. gauderio Giora & Malabarba, 2009

Loc. Tipo: Canal de conexión entre Lagoa do Casamento y Lagoa dos Gateados, 30°28'S, 50°40'W, Palmares do Sul, Estado Rio Grande do Sul, Brasil.

Familia

GYMNOTIDAE

Gymnotus Linné, 1758

G. inaequilabiatus (Valenciennes, 1839)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina.

N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P).

G. omarorum Richer-de-Forges, Crampton & Albert, 2009

Loc. Tipo: cuenca del Río Cisne, Laguna del Sauce, 34°50.328"S, 55°06.869"W, Departamento Maldonado, Uruguay.

N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P).

G. pantanal Fernandes, Albert, Daniel-Silva, Lopes, Crampton & Almeida-Toledo, 2005

Loc. Tipo: Cerca de Miranda, 20°11'78"S, 56°30'13"W, Rio Miranda, Estado Mato Grosso do Sul, Brasil.

N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P).

G. sylvius Albert & Fernandes-Matioli, 1999

Loc. Tipo: Rio Ribeira de Iguapé, cerca de Miracatu, 24°32'50"S, 47°26'13"W, Estado de São Paulo, Brasil.

N. v.: anguila, morena, pirá mboi (G); sarapó, anguiya (P).

Orden

ATHERINIFORMES

Familia

ATHERINOPSIDAE

Odontesthes Evermann & Kendall, 1906

O. bonariensis (Valenciennes, 1835)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Montevideo, Uruguay.

N. v.: baboso, flecha de plata, matungo, pejerrey.

O. perugiae Evermann & Kendall, 1906

Loc. Tipo: Argentina.

N. v.: juncalero, pejerrey pigmeo, pejerrey de verano.

Orden **CYPRINODONTIFORMES**
Familia **RIVULIDAE**

Austrolebias Costa, 1998

A. bellottii (Steindachner, 1881)

Loc. Tipo: La Plata, Argentina.

N. v.: doradito, pavito.

A. nigripinnis (Regan, 1912)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: cinolebia.

Pterolebias Garman, 1895

P. longipinnis Garman, 1895

Loc. Tipo: Santarém, cuenca del Río Amazonas, Pará, Brasil.

Melanorivulus Costa, 2006

M. punctatus (Boulenger, 1895)

Loc. Tipo: Colonia Risso, Paraguay.

Familia **POECILIIDAE**

Cnesterodon Garman, 1895

C. decemmaculatus (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay.

N. v.: madrecita, orillero.

C. raddai Meyer & Etzel 2001

Loc. Tipo: Pantano cerca de Resistencia, cuenca del Rio Paraná, Provincia de Formosa, Argentina.

Phalloceros (Eigenmann, 1907)

P. caudimaculatus (Hensel, 1868)

Loc. Tipo: Costa da Serra, São Leopoldo, Brasil.

N. v.: madrecita, madrecita de una mancha; pikí (G); barrigudinho, guarú-guarú (P).

Phallotrynus (Henn, 1916)

P. victoriae Oliveros, 1983

Loc. Tipo: Isla Los Mellados, cuenca del Paraná Medio, Santa Fe, Argentina.

N. v.: madrecita.

Familia **ANABLEPIDAE**

Jenynsia Günther, 1866

J. multidentata (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Montevideo, Uruguay.

N. v.: madrecita, mojarra, orillero.

Orden **BELONIFORMES**
Familia **BELONIDAE**

Potamorrhaphis Günther, 1866

P. eigenmanni Miranda Ribeiro, 1915

Loc. Tipo: Cáceres, río Jaurú en Porto Esperidão, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: pez aguja; pirá-pukú, pirá-timbucú, timbukú (G).

Pseudotylosurus Fernández Yepes, 1948

P. angusticeps (Günther, 1866)

Loc. Tipo: Costas del Ecuador.

N. v.: aguja de río, pez aguja; pirá-timbucú (G).

Orden **SYNBRANCHIFORMES**
Familia **SYNBRANCHIDAE**

Synbranchus Bloch, 1795

S. marmoratus Bloch, 1795

Loc. Tipo: Surinam.

N. v.: anguila, anguila criolla; mbusú, pirá-mboi (G).

Orden **PERCIFORME**
Familia **SCIAENIDAE**

Pachyurus Agassiz, 1831

P. bonariensis Steindachner, 1879

Loc. Tipo: Río de la Plata, Argentina.

N. v.: burriqueta, corvina, corvina de río.

Plagioscion Gill, 1861

P. ternetzi Boulenger, 1895

Loc. Tipo: Remanso, Río Grande, Paraguay.

N. v.: corvina, corvina de río.

Familia **CICHLIDAE**

Chaetobranchopsis Steindachner, 1875

C. australis Eigemann & Ward, 1907

Loc. Tipo: Bahía Negra, Paraguay.

N. v.: acara prata, cará (P).

Bujurquina Kullander, 1986

B. vittata (Heckel, 1840)

Loc. Tipo: Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

N. v.: acará, chanchita; pirá-mbocayá (G).

Cichlasoma Swainson, 1839

C. dimerus (Heckel, 1840)

Loc. Tipo: Río Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: acará, cará (P).

Laetacara Kullander, 1986.

L. dorsigera (Heckel, 1840)

Loc. Tipo: Villa María, Río Paraguay, América del Sur.

N. v.: acará, acará bobo, cará, cara bobo (P).

Apitogramma Regan, 1913

A. borellii (Regan, 1906)

Loc. Tipo: Carandasiñho, Estado de Mato Grosso, Brasil.

N. v.: acará, cará (P).

A. commbrae (Regan, 1906)

Loc. Tipo: Carandasíñho, Mato Grosso, Brasil y Colonia Risso, Alto Paraguay.
N. v.: acará, cará (P).

A. trifasciata (Eigenmann & Kennedy, 1903)

Loc. Tipo: Arroyo Chagalalina, Paraguay.

Crenicichla Heckel, 1840

C. jupiaensis Britski & Luengo, 1968

Loc. Tipo: Rio Paraná, Salto de Urubupungá, entre los Estados de Mato Grosso y São Paulo, Brasil.

C. lepidota Heckel, 1840

Loc. Tipo: Río Guaporé, Mato Grosso, Brasil.
N. v.: boca amarga, cabeza amarga, cuatro ojos, juanita; pirá-kyguá (G); giensa-verde (P).

C. niederleinii (Holmberg, 1891)

Loc. Tipo: Río Pequirí, Misiones, Argentina.
N. v.: juanita, pequirí, piquí.

C. semifasciata (Heckel, 1840)

Loc. Tipo: Río Paraguay cerca de Caiçara, Mato Grosso, Brasil.

C. taikyra Casciotta, Almirón, Aichino, Gómez, Piálek & Ríčan, 2013

Loc. Tipo: río Paraná en Candelaria, 27°21'43.0"S, 55°51'54.7"W, Provincia de Misiones, Argentina.

C. vittata Heckel, 1840

Loc. Tipo: Río Curiabá, sistema del Río Paraguay, Paraguay.
N. v.: boca amarga, cabeza amarga, juanita.

Gymnocephagus Ribeiro, 1918

G. australis (Eigenmann, 1907)

Loc. Tipo: Buenos Aires, Argentina.
N. v.: acará, chanchita, palometa.

G. balzanii (Perugia, 1891)

Loc. Tipo: Villa María, Río Paraguay, Mato Grosso, Brasil.
N. v.: cará (P).

G. meridionalis Reis & Malabarba, 1988

Loc. Tipo: Cabeceras del río Negro a la altura de la ruta BR-153, Bagé, Río Grande do Sul, Brasil.

Australoheros Říčan & Kullander, 2006

A. facetus (Jenyns, 1842)

Loc. Tipo: Laguna del Diario, 34°54'S, 55°00'W, en Maldonado, Uruguay.
N. v.: castañeta, chanchita, chanchito, palometa, palometa negra, peine.

Orden
Familia

PLEURONECTIFORMES
ACHIRIDAE

Catathyridium Chabanaud, 1928

C. jenynsii (Günther, 1862)

Loc. Tipo: Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina.
N. v.: lenguado, lenguado de río; pirá-kihgá (G).

Orden
Familia

LEPIDOSIRENIFORMES
LEPIDOSIRENIDAE

Lepidosiren Fitzinger, 1837

L. paradoxa Fitzinger, 1837

Loc. Tipo: Amazonas, Paraguay y cuenca del bajo Río Paraná: Argentina, Bolivia, Colombia, Guayana Francesa, Paraguay, Perú y Venezuela.

N. v.: lepidosirena, loloch; pirá-cururú, piramboia.

Tabla I - Especies introducidas

Especie	Propósito de la introducción
<i>Oreochromis niloticus</i>	Fue introducida por primera vez en la década del 70 en la provincia de Misiones. En la década del 80 al 90 se introdujo en las provincias de Corrientes y Formosa. (Wicki y Gromenida, 1997).

Tabla II - Especies de presencia dudosa o que requieren confirmación

Especie	Especie mencionada por
<i>Characidium cf. zebra</i>	Casciotta <i>et al.</i> , 2003; López <i>et al.</i> , 2005
<i>Brachyhypopomus pinnicaudatus</i>	Iwaszkiw <i>et al.</i> , 2010.

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

- ANÓNIMO. 2008. Atlas Total Clarín de la República Argentina: Corrientes–1^a edición–Buenos Aires, *Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.*, v. 23, 119 pp.
- AZPELICUETA, M. DE LA M. AND S. KOERBER. 2017. *Hemigrammus tridens* Eigenmann (Characiformes, Characidae): first records of a small tetra from the Paraná River basin. *Revue Suisse de Zoologie* v. 124 (no 1): 67-71.
- BAIGÚN, C. R. M. & R. QUIRÓS. 1985. Introducción de peces exóticos en la República Argentina. *INIDEP*, 90 pp.
- BALDO, J. L.; J. G. HARO; M. A. BISTONI Y G. MARINO. 1993/1994. Primer relevamiento de la ictiofauna de los Esteros de Santa Lucía en el proyectado Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes, Argentina). *Revista de Ictiología* 2/3: 9-12.
- BERTACO, V. A.; J. FERRER, F. R. CARVALHO & L. R. MALABARBA. 2016. Inventory of the freshwater fishes from a densely collected area in South America, a case study of the current knowledge of Neotropical fish diversity. *Zootaxa* 4138 (3): 401–440 pp.
- CASCIOTTA, J.; A. ALMIRÓN Y J. BECHARA. 2003. *Los peces de la Laguna Iberá*. Ediciones Al Margen, La Plata, 203 pp.
- CASCIOTTA, J.; A. ALMIRÓN Y J. BECHARA. 2005. *Peces del Laguna Iberá. Habiat y Diversidad*. Ediciones Grafikar, La Plata, 244 pp.
- CHEBEZ, J. C.; H. L. LÓPEZ & J. ATHOR. 2009. Peces de agua dulce amenazados en Argentina. En: Chebez, J. C. *Otros que se van Fauna Amenazada*, págs. 32-54. Editorial Albatros, Buenos Aires, 552 pp.
- ESCHMEYER, W. N.; R. FRICKE & R. VAN DER LAAN (EDS). Catalog of fishes: genera, species. (<http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp>). Electronic version accessed May 2017.
- FERRARIS, C. J. JR. 2007. Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types. *Zootaxa*, 1418: 1-628.
- GIOVANNETTI, V., M. TOLEDO-PIZA & N. A. MENEZES. 2017. Taxonomic revision of *Galeocharax* (Characiformes: Characidae: Characinae). *Neotropical Ichthyology*, v. 15 (no. 1): [1-32].
- GHEDOTTI, M. J. & S. H. WEITZMAN. 1996. A new species of *Jenynsia* (Cyprinodontiformes: Anablepidae) from Brazil with comments on the composition and taxonomy of the genus. *Occasional Papers of the Museum of Natural History University of Kansas*, 179: 1-25.
- IWASZKIW, J. M., F. FIRPO LACOSTE Y A. JACOBO. 2010. Relevamiento de la ictiofauna de la laguna Camba Cué, isla Apipé Grande, Corrientes, Argentina. *Rev. Museo Argentino Cienc. Nat.*, n.s., 12(1): 81-90, Buenos Aires, ISSN 1514-5158.
- KOERBER, S. 2012. List of freshwater fishes from Argentina-Update 14. *Ichthyological Contributions of Peces Criollos* 26: 1-11 available as pdf-file at www.pecescriollos.de since 01.Oct.2012.
- KOERBER, S., T. O. LITZ & J. M. MIRANDE 2016. CLOFFAR-update 2-Supplement to Checklist of the freshwater fishes of Argentina. *Ichthyological Contributions of Peces Criollos*, 43: 1-6. available as pdf-file at www.pecescriollos.de since 12.may.2016
- KOERBER, S., T. O. LITZ & J. M. MIRANDE. 2017. CLOFFAR-update 3-supplement to Checklist of the freshwater fishes of Argentina. *Ichthyological Contributions of PecesCriollos* 47: 1-9 available as pdf-file at www.pecescriollos.de since 03.Jan.2017

- LIMA, F. C. T. 2017. A revision of the cis-andean species of the genus *Brycon* Müller & Troschel (Characiformes: Characidae). *Zootaxa* 4222 (no. 1): 1-189.
- LIOTTA, J. 2006. Distribución geográfica de los peces de aguas continentales de la República Argentina. *ProBiota, FCNyM, UNLP*, Serie Documentos N° 3, 701 pp.
- LÓPEZ, H. L., R. C. MENNI, M. DONATO & A. M. MIQUELARENA. 2008. Biogeographical revision of Argentina (Andean and Neotropical Regions): an analysis using freshwater fishes. *Journal of Biogeography*, 35: 1564-1579.
- LÓPEZ, H. L., A. M. MIQUELARENA & R. C. MENNI. 2003. Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. *ProBiota, FCNyM, UNLP*, Serie Técnica-Didáctica N° 5, La Plata, Argentina: 1-85.
- LÓPEZ, H. L., A. M. MIQUELARENA & J. PONTE GÓMEZ. 2005. Biodiversidad y Distribución de la Ictiofauna Mesopotámica: 311-354. En: *Temas de la Biodiversidad del Litoral fluvial argentino II*. F. G. Aceñolaza (Coordinador). INSUGEo, Miscelánea, 14. 550 pp.
- LÓPEZ, H. L., C. C. MORGAN & M. J. MONTENEGRO. 2002. Ichthyological Ecoregions of Argentina. *Pro Biota, Serie Documentos N° 1*, FCNYM-UNLP ISSN 1666-731X.
- MAZZA, G. 1961. *Recursos hídricos superficiales. Evaluación de los Recursos Naturales de la Argentina* (primera etapa). CFI, Buenos Aires, 4 (1): 1-459.
- MENNI, R. C. 2004. *Peces y ambientes en la Argentina continental*. Monografías del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, Argentina, 5: 1-316. ISSN 1515-7652.
- MIRANDE, J. M. & S. KOERBER. 2015. Checklist of the freshwater fishes of Argentina (CLOFFAR). *Ichthyological Contributions of Peces Criollos*, 36: 1-68.
- MORRONE, J. J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. *Manuales y Tesis, Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA)*, 3, Zaragoza, España, 148 pp.
- POYSEGGUR, H. 1910. Expedición al Iberá. *An. Soc. Cienti. Argentina*. 78: 241-258; 79: 35-64 / 135-164.
- POZZI, A. 1945. Sistemática y Distribución de los Peces de Agua Dulce de la República Argentina. *GAEA*, 7: 239-292.
- RAMIREZ, J. L., J. L. O. BIRINDELLI & P. M. GALETTI, JR. 2017. A new genus of Anostomidae (Ostariophysi: Characiformes): Diversity, phylogeny and biogeography based on cytogenetic, molecular and morphological data. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, v. 107: 308-323.
- REIS, R. E., S. O. KULLANDER & C. R. FERRARIS (Editors). 2003. *Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America*, CLOFFSCA. EDIPUCRS, Porto Alegre, Brasil, 729 pp. ISBN 85-7430-361-5.
- RINGUELET, R. A. 1961. Rasgos fundamentales de la zoogeografía de la Argentina. *Physis*, Buenos Aires, Argentina, 22 (63): 151-170.
- RINGUELET, R. A. 1975. Zoogeografía y ecología de los peces de aguas continentales de la Argentina y consideraciones sobre las áreas ictiológicas de América del Sur. *Ecosur*, 2 (3): 1-122.
- RINGUELET, R. A.; R. H. ARÁMBURU Y A. A. ARÁMBURU. 1967. *Los peces argentinos de agua dulce*. Comisión de Investigaciones Científicas, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. 559 pp.
- TERÁN, G. E., F. ALONSO, I. GARCÍA, P. CALVIÑO & J. M. MIRANDE. 2016. Occurrence of *Astyanax dissensus* Lucena & Thofehrn, 2013 (Teleostei: Characidae) in Argentina. *Check List* 12 (1/1828): 1-3


WICKI, G. A. Y N. GROMENIDA. 1997. *Estudio de desarrollo y producción de tilapia*. Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, SAGYP, Buenos Aires, 29pp.

<http://ictiologiaargentina.blogspot.com>

<http://www.fishbase.org/search.php>

<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49863>

IMAGEN DE CIERRE



Aime Bonpland, por *carloscartoons*

NADALIN, D. O.; PROTOGINO, L. C. & H. L. LÓPEZ. 2017. Peces de la provincia de Corrientes. *ProBiota*, FCNyM, UNLP, La Plata, Argentina, *Serie Técnica y Didáctica* 37: 1-30. ISSN 1515-9329.

ProBiota

(*Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral*)

Museo de La Plata

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP

Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina

Directores

Dr. Hugo L. López

hlopez@fcnym.unlp.edu.ar

Dr. Jorge V. Crisci

crisci@fcnym.unlp.edu.ar

<http://ictiologiaargentina.blogspot.com.ar/>

<http://raulringuelet.blogspot.com.ar/>

<http://aquacomm.fcla.edu>

<http://sedici.unlp.edu.ar/>

Indizada en la base de datos ASFA C.S.A.