

مهدی مقیم - حسن ملایی

سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران

مرکز تحقیقات شیلاتی مازندران - ساری

بررسی چگونگی صید ماهیان خاویاری

در آبهای مشترک دریای هازندران

چکیده

دریایی مازندران جزء دریاهای بسته می باشد. تا حد ۱۰ مایل دریایی از خط مبداء آبهای ساحلی برای کشورها و اتباع آن منطقه انحصاری است و پس از آن آبهای مشترک می باشد. دولت شوروی سابق در آبهای مشترک صید گسترده و انبووهی را داشته است. به منظور حضور در محدوده آبهای مشترک و بهره برداری از منابع آبزی آن مطالعه و تحقیق از چگونگی صید ماهیان خاویاری در آبهای مشترک جنوب شرقی دریایی مازندران در طول یک سال صورت پذیرفته. کیفیت صید، شرایط صید، ترکیب گونه ای، ترکیب سنی، رسیدگی جنسی و ... ماهیان خاویاری در آبهای مشترک با آبهای ساحلی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در محدوده آبهای مشترک ماهیان خاویاری نارس و کوچکتر از طول استاندارد از تراکم پیشتری نسبت به آبهای ساحلی برخوردار می باشند و محدوده آبهای مشترک جنوب شرقی دریایی مازندران محل مناسبی برای صید ماهیان خاویاری ننمی باشد.

اریوگی و شرمندی

مقدمه

بر طبق مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۳ توافقهای دو جانبی کشورها تعین کننده حقوق طرفین در بحث برداری از دریاهای بسته می باشد.

دولتیں ایران و شوروی قراردادهای در ارتباط با دریای مازندران تنظیم نموده اند، بر اساس مندرجات این قراردادها طرفین بر موارد ذیل تاکید ورزیده اند.

۱- دریای مازندران در چند مرور دریای ایران و شوروی خوانده شده است یادآور این مهم است که دریای مذکور در حیطه قدرت دو کشور بوده و توافقات متقابل نحوه استفاده از آن را روشن می سازد.

۲- طرفین بر حق کشتیرانی آزاد در تمام تقاطع دریای مازندران توافق داشته و تاکید نموده اند که با کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر مثل کشتیهای ملی رفتار شود.

۳- ماهیگیری در دریای مازندران تا حد ۱۰ مایل دریایی از خط مبدأ آبهای ساحلی برای دو کشور و اتباع آن انحصاری است، بدین اعتبار صید در بقیه مناطق دریا برای کشتیها و اتباع طرفین آزاد است. بررسی تاریخی صید در دریای مازندران نشان می دهد که صیادان یا ناوگانهای صیادی ایران بقدرت پا از محدوده ۱۰ مایل فراتر نهاده و اقدام به صید نموده باشد.

دولت شوروی در آبهای مشترک صید گسترده و اینوها را دارد و صیادان آن کشور امکانات وسیعی برای حضور بر این بخش از دریا را دارند. حضور ایران در آبهای مشترک و اقدام به صید در این منطقه علاوه بر اینکه منابع ملی کشور را تامین می نماید نشانه ای از اعمال مالکیت دولت ایران در محدوده ای است که خطوط مرزی آن تعیین نگردید و دولت شوروی از این حق بهره مند است و بمرور زمان علاوه بر اینکه حق برایش ایجاد می نماید، این توهمندی را پیش می آورد که ایران تعاملی به بهره برداری از منابع آنرا ندارد (کریمی، ۱۳۶۹).

در برنامه پنج ساله اول شرکت سهامی شیلات ایران افزایش تولید پیش بینی شده بود. جهت نیل به اهداف برنامه، یافتن مناطق جدیدی برای صید، مد نظر مستولین و کارشناسان قرار گرفت. آبهای مشترک یکی از مناطق است که تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته بود.

بنابراین جهت حضور در محدوده آبهای مشترک و بهره برداری از منابع آبزی آن لزوماً می باشد مطالعات و تحقيقات اولیه از وضعیت پراکنش ذخایر انواع ماهیان، شرایط بهره برداری، امکانات مورد نیاز و اقتصادی بودن بهره برداری (قیمت تمام شده) و ... صورت پذیرد.

مطالعه صید ماهیان خاویاری که از مهمترین گونه های اقتصادی دریای خزر می باشند، در آبهای مشترک اولین گام در این راستا بوده است. بدین منظور صید ماهیان خاویاری در محدوده آبهای مشترک جنوب شرقی دریای مازندران در طول یکسال (از بهمن ماه ۱۳۶۹ بهمن ماه ۱۳۷۰) مورد



بررسی چگونگی صید ...

مطالعه قرار گرفت و شرایط صید، کیفیت صید، ترکیب گونه ای صید، ترکیب سنی صید، مراحل رسیدگی جنسی ماهیان و ... مورد بررسی قرار گرفت. گزارش حاضر از تابع تحقیقاتی طرح فوق می باشد.

روش بررسی

صید ماهیان خاویاری در آبهای مشترک به روش چیپ چیپ (صید انتظاری با دام گوشگیر و مین چوبی) با استفاده از دامهای کاپرونی فیل ماهی (اندازه چشم ۳۰۰ و ۲۸۰ میلیمتر از گره تا گره مجاور)، تاس ماهی (۱۵۰ میلیمتر از گره تا گره مجاور) و دراکول (۱۰۰ میلیمتر از گره تا گره مجاور) توسط دو قایق فایبر گلاس مجهز به موتور ۴۸ قوه اسب و هشت نفر صید صورت پذیرفت. در محلوده آبهای مشترک جنوب شرقی دریای خزر ایستگاههای شماره یک الی پنج که به ترتیب دارای عمق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ متر می باشند انجام گرفت.

صید در فاصله زمانی ۱۱/۲۹ ۶۹/۱۱ لغایت ۳۱/۲۰ ۷۱/۲۰ (صید بهار) و ۵/۲۰ ۷۰/۱۰ لغایت ۱۰/۱۰ (صید پاییزه) بعدت ۲۵۳ روز که تقریباً مشابه زمان صید در منطقه جنوب شرقی دریای خزر (ناحیه ۲) می باشد صورت گرفت.

زمان کاربرد انواع و میانگین تعداد رشته دام در جدول ۱ آورده شده است.

از دامهای مستقر در ایستگاههای صید، روزانه بازدید بعمل آمد (روزهای کولاکی امکان بازدید دامها وجود نداشته که مجموعاً ۴۶ روز کولاک بوده و محصول صید در روز بعد جمع آوری شده است) و ماهیان گرفتار شده از دام خارج گردیده اند. ماهیانی که طولشان کمتر از طول استاندارد بودند پس از ثبت نوع ماهی و Fork lenght، بلاک گذاری شده و رها گردیدند. ماهیانی که طولشان بیشتر یا برابر طول استاندارد بود به صیدگاه گمیشان منتقل شده و پیسومتری گردیدند و فاکتورهای زیر ثبت گردید:

نوع ماهی، Fork lenght، طول کل، وزن، وزن شکم خالی، جنسیت و رسیدگی جنسی، وزن خاویار، رقم خاویار و سن.

برای اندازه گیری طول و وزن از متر پارچه ای با دقت یک سانتی متر و قبان با دقت ۱۰۰ گرم استفاده گردید. سن ماهیان با استفاده از مقطع اولین شعاع باله سینه ای بوسیله لوب در آزمایشگاه تعیین شده است.

به ماهی ماده ای که دارای خاویار قابل عمل آوری بوده، ماده رسیده و در غیر اینصورت ماده نارس اطلاق گردیده است.

ماهی تری که اندام یضه آن کاملاً رشد یافته و محوطه شکمی را پر نموده و در اثر برش عرضی یضه مایع شیری رنگ از آن خارج می شود را نرسیده و در غیر اینصورت نر نارس ثبت گردیده است.

به ماهی که طولش از طول استاندارد بیشتر بوده، ماهی استاندارد و در غیر این صورت غیر استاندارد اطلاق گردیده. طول استاندارد برای ماهی دراکول ۹۳ سانتی متر، فیل ماهی ۱۶۵ سانتی متر و برای ماهیان چالیاش، قره بیرون و شبب ۱۱۳ سانتی متر می باشد.

صید گاههای ترکمن، میانقلعه و تازه آباد در جنوب شرقی دریای خزر یعنوان ایستگاههای شاهد انتخاب شده و از صید روزانه آنها بصورت تصادفی نمونه برداری و یو متري گردید و اطلاعات مشابهی نیز جمع آوری شد.

در این بررسی کیفیت صید یک قایق در آبهای مشترک با صید در آبهای ساحلی با همسان نمودن روش صید، زمان صید، لات و ادوات صیدو ... مورد مقایسه قرار گرفته است.

روشهای بکار برده شده در آنالیز نمونه‌ها بشرح ذیل می باشد:

۱- محاسبه میانگینهای طول، وزن، سن و خاویار با حدود اطمینان ۹۵٪

۲- آزمون مریع کای جهت آزمون نرمال بودن توزیع نمونه‌ها (حمدیدی زاده ۱۳۶۵)

۳- آزمون مریع کای جهت مقایسه نسبتهای ماده رسیده و کل ماهی صید شده بین آبهای مشترک و آبهای ساحلی در گونه‌های مختلف (حمدیدی زاده ۱۳۶۵)

۴- آزمون مریع کای جهت مقایسه نسبتهای تعداد ماهی حاوی خاویار دان ۱ کل ماهی ماده رسیده بین آبهای مشترک و آبهای ساحلی در گونه‌های مختلف (حمدیدی زاده ۱۳۶۵)

لازم به ذکر است که بعلت پاره‌ای از مشکلات همانند درگیری با عوامل انتظامی شوروی سابق (دستگیری صیادان، جمع آوری دامهای مستقر در آبهای مشترک و ...) و صید بیش از حد ماهیان غیر استاندارد توسط دامهای دراکول در تمامی زمانها امکان همسانی تعداد و نوع دام در صید ساحلی و آبهای مشترک وجود نداشته است و از طرفی بعلت دوری مسافت، مشکل بودن شرایط کاری و مخاطرات جانی از یک قایق و چهارنفر صیاد جهت همراهی استفاده گردیده، اما سعی شد که تعداد دام مستقر در دریا همانند تعداد دامی که توسط یک قایق در صید ساحلی مورد استفاده قرار می گیرد باشد.

نتایج و بحث

در فصل صید بهاره از دامهای دراکول، تاسمه‌ها، فیل ماهی و در فصل صید پاییزه از دامهای تاسمه‌ها و فیل ماهی همانند آبهای ساحلی برای صید در محدوده آبهای مشترک استفاده بعمل آمد.

میزان و ترکیب صید و اطلاعات یومتریک در جداول ۲ الی ۷ آورده شده است.



بررسی چگونگی صید...

در مدت ۲۵۳ روز صید در محدوده آبهای مشترک جنوب شرقی دریای خزر ۸۱۲ قطعه انوع ماهیان خاویاری با طول استاندارد به وزن ۱۳۰۳۲ کیلوگرم گوشت ۱/۶۲۱ کیلوگرم خاویار و ۸۵۲ قطعه با طول کمتر از استاندارد صید گردید.

دراکول: تعداد ماهیهای استاندارد ۴۰۹ قطعه و ۳۵۴۱ کیلوگرم گوشت و ۱۴۵/۴ کیلوگرم خاویار و درصد خاویار به گوشت ۱/۴ که در مقایسه با صید ساحلی در منطقه جنوب شرقی دریای خزر (۱۴/۸ درصد می‌باشد) از درصد خاویار بگوشت فوق العاده پایینی بر خوردار بوده است. همچنین در این مدت دراکول غیر استاندارد به تعداد ۳۲ قطعه در محدوده آبهای مشترک صید گردید. فراوانی ماهیهای دراکول نارس در محدوده آبهای مشترک ۷/۹ درصد بوده است که در مقایسه با آبهای ساحلی ۵/۴۶ درصد بیشتر است.

قره برون: ماهیهای استاندارد به تعداد ۱۰۵ قطعه و ۲۰۴۳ کیلوگرم گوشت و ۷/۲۵۹ کیلوگرم خاویار و درصد خاویار به گوشت ۷/۱۲ که در مقایسه با صید ساحلی در منطقه جنوب شرقی دریای خزر (۱۴ درصد می‌باشد) اختلاف چندانی ندارد همچنین در این مدت قره برون غیر استاندارد به تعداد ۵ قطعه در محدوده آبهای مشترک صید گردید. فراوانی ماهیهای قره برون نارس در محدوده آبهای مشترک ۷/۴۶ درصد می‌باشد که در مقایسه با آبهای ساحل ۷/۳۶ درصد بیشتر است.

چالباش: تعداد ماهیهای استاندارد ۲۲۹ قطعه، ۳۲۴۰ کیلوگرم گوشت و ۶/۱۰۴ کیلوگرم خاویار و درصد خاویار به گوشت ۲/۳/۲ است که در مقایسه با صید ساحلی در منطقه با صید ساحلی در منطقه جنوب شرقی دریای خزر (۱۲/۴ درصد می‌باشد) که از درصد خاویار به گوشت فوق العاده پایینی بر خوردار بوده است. همچنین در این مدت چالباش غیر استاندارد به تعداد ۲۳۲ قطعه در محدوده آبهای مشترک صید گردید. فراوانی ماهیهای چالباش نارس در محدوده آبهای مشترک ۷/۷ درصد بوده است که در مقایسه با آبهای ساحلی ۴۴ درصد بیشتر است.

بررسی ترکیب گونه‌های تاس ماهی (چالباش، قره برون، شبپ) در محدوده آبهای مشترک نشان می‌دهد که چالباش ۷۸/۶ درصد از صید را شامل می‌شود در صورتیکه در آبهای ساحلی فراوانی چالباش ۸/۳۷ درصد صید را شامل می‌شود.

شبپ: تعداد ماهیهای استاندارد ۱۱ قطعه، ۲۱۴ کیلوگرم گوشت و ۳/۱۳ کیلوگرم خاویار و

در صد خاویار به گوشت ۲/۶٪ که در مقایسه با صید ساحلی (۱۰/۶ درصد می باشد) از درصد خاویار به گوشت پایین تری برخوردار است. همچنین در این مدت شبپ غیر استاندارد به تعداد ۲ قطعه در محدوده آبهای مشترک صید گردید.

فیلماهی: تعداد ماهیهای استاندارد ۵۸ قطعه، ۳۹۹۴ کیلوگرم گوشت و ۹۸/۱ کیلوگرم خاویار و نسبت خاویار به گوشت ۲/۵ که در مقایسه با صید ساحلی (۴/۵ درصد می باشد) از درصد خاویار به گوشت پایین تری برخوردار بوده است همچنین در این مدت فیلماهی غیر استاندارد به تعداد ۵۸۱ قطعه در محدوده آبهای مشترک صید گردید.
فرآونی فیل ماهیان نارس در محدوده آبهای مشترک ۸۱ درصد که در مقایسه با آبهای ساحلی ۲۳/۷ درصد بیشتر است.

مقایسه کیفیت صید آبهای مشترک با آبهای ساحلی
با توجه به آزمونهای بعمل آمده توزیع نمونه های آبهای مشترک و آبهای ساحلی از توزیع نرمال بیعت می کند.

در بهره برداری از ذخایر ماهیان خاویاری، صید ماهیان استاندارد بالغ و رسیده از نظر جنسی مطلوب می باشد بنابراین نسبت صید ماهیان ماده رسیده به کل ماهی صید شده و نسبت ماهی خاویاری دان یک و ماهی ماده رسیده شاخصهای مناسبی برای مقایسه کیفیت حبید می توانند باشند. برای مقایسه نسبتهای فوق از آزمون کای دو ۶۲ استفاده شده است که نتایج آن در جداول الف و ب آورده شده است.

همانطوریکه در جدول الف ملاحظه می شود نسبتهای ماده رسیده و کل ماهی صید شده بین آبهای مشترک و آبهای ساحلی در فیل ماهی و دراکول و چالاش و سطح معنی دار ۱٪ باهم اختلاف دارند، ولی در ماهی قره برون و شبپ در سطح ۵٪ معنی دار باهم اختلاف ندارند.

در جدول ب مقایسه نسبتهای تعداد ماهی خاویاری دان یک و ماهی ماده رسیده بین آنها ساحلی در سطح معنی دار ۵٪ در هیچیک از گونه ها باهم اختلاف معنی دار ندارند.

سایر فاکتورها که در طی دوره مورد بررسی قرار گرفته است شامل:

فرآونی سنی ماهیان خاویاری در محدوده آبهای مشترک:

تعدادی از ماهیان بیومتری شده تعیین سن گردیدند که نتایج بشرح ذیل می باشد:

الف - دراکول: در جدول شماره ۸ نمودار شماره ۱ فرآونی سنی آورده شده است. دامنه سنی از ۶ الی ۱۸ سال و میانگین سنی ۱۱/۸۸ + ۰/۰ می باشد ۹۰٪ ماهیان دراکول بالای سن ۱۰



ب - قره برون : در جدول شماره ۹ و نمودار شماره ۲ فراوانی سنی آورده شده است. دامنه سنی از ۱۲ تا ۱۹ سال و میانگین سنی ۴۴/۰۴۰۰ ۱۵/۰ می باشد.

ج - چالباش : در جدول شماره ۱۰ و نمودار شماره ۳ فراوانی سنی آورده شده است. دامنه سنی از ۹ تا ۲۰ سال و میانگین سنی ۲۵/۸۶۰۰ ۱۲/۰ می باشد.

د - شبیب : در جدول شماره ۱۱ و نمودار شماره ۴ فراوانی سنی آورده شده است. دامنه سنی از ۱۱ تا ۱۸ سال و میانگین سنی ۱۶/۳۶۴۱ ۱۴/۰ می باشد.

ه - فیل ماهی : در جدول شماره ۱۲ و نمودار شماره ۵ فراوانی سنی آورده شده است. دامنه سنی از ۱۲ تا ۳۱ سال و میانگین سنی ۲۹/۱۶ می باشد.

فراوانی طولی ماهیان خاویاری در محدوده آبهای مشترک:

فراوانی طولی ماهیان بیومتری شده در نمودارهای شماره ۶ تا ۱۰ آورده شده است.

نتیجه

۱- نسبت فراوانی فیلماهی و چالباش در منطقه آبهای مشترک بیشتر از آبهای ساحلی است.


۲- تراکم ماهیان غیر استاندارد خصوصاً فیلماهی و چالباش در منطقه آبهای مشترک بیشتر از آبهای ساحلی است. دامگذاری در این منطقه، حجم زیادی از صید ماهیان غیر استاندارد را در بردارد و می تواند باعث حذف آنها از چرخه حیات شود.

۳- آزمون مقایسه نسبتهای ماده رسیده به کل ماهی صید شده بین آبهای مشترک و آبهای ساحلی پیانگر پایین بودن نسبت ماده های رسیده فیلماهی، دراکول و چالباش در آبهای مشترک نسبت به آبهای ساحلی است دامگذاری برای رسیده در آبهای مشترک لطمه های زیادی به ذخایر گونه های فرق خواهد زد. مقایسه این نسبتها در ماهی قره برون و شب عدم اختلاف بین آبهای مشترک و ساحلی را بیان می کند. با توجه به اینکه دام مورد استفاده برای رسیده این دو گونه ماهیان چالباش و فیلماهی را نیز صید می کند، برای رسیده این دو گونه نیز نمی توان دامگذاری نمود.

۴- مقایسه نسبتهای ماهی حاوی خاویار دان یک و ماهی ماده رسیده در هیچیک از گونه ها بین آبهای مشترک و آبهای ساحلی اختلاف وجود ندارد. این نتایج نشان می دهد که هر چه به ساحل نزدیکتر می شویم نسبت ماهیان دارای گناههای جنسی رشد یافته، بیشتر می شود و بنظر می رسد

تحجیه صیادان مبنی بر اینکه ماهی رسیده به مناطق ساحلی نزدیک می‌شود و ماهیان نارس در مناطق دور از ساحل پیشتر نزد درست است.

۵- بعد مسافت محل صید و محل تحویل صید و هزینه‌های پیشتر سوخت و نگهداری موئور از دیگر عواملی هستند که صید در آبهای مشترک را رد می‌کنند.



جدول ۱- زمان کاربرد انواع و تعداد رشته دام در محدوده آبهای مشترک جنوب شرقی دریای خزر.

انواع دام	صید بهاره	تعداد رشته	صید پاییزه	تعداد رشته	تعداد رشته
فیل ماهی	شروع ۶۹,۱۱,۲۹ پایان ۷۰,۰۳,۳۱	۴۰ الی ۳۵	شروع ۶۹,۱۱,۲۹ پایان ۷۰,۰۳,۳۱	۷۰/۵/۳۰ پایان ۷۰/۱۰/۱۰	۷۰/۱۰/۱۰ الی ۷۰/۱۱/۲۹
تاس ماهی	شروع ۶۹,۱۱,۲۹ پایان ۷۰,۰۳,۳۱	۱۶۰ الی ۱۴۰	شروع ۶۹,۱۱,۲۹ پایان ۷۰,۰۳,۳۱	۶۹,۱۱,۲۹ پایان ۷۰/۰۳/۳۱	۶۹,۱۱,۲۹ الی ۶۹,۱۱,۲۹
دراکول	شروع ۶۹,۱۱,۲۹ پایان ۷۰,۰۳,۳۱	۷۰,۰۳,۳۱	شروع ۶۹,۱۱,۲۹ پایان ۷۰,۰۳,۳۱	۷۰,۰۳,۳۱	شروع ۶۹,۱۱,۲۹ پایان ۷۰/۱۰/۱۰

جدول ۲) آمار صید ماهیان خاویاری، و استعمال خاویار و نسبت خاویار به گوشت در کل دوره صید در آبهای مشترک جنوب شرقی دریای خزر.

گونه	تعداد	گوشت	خاویار	درصد خاویار به گوشت
فیل ماهی	۵۸	۳۹۹۶	۹۸,۱	۲,۵
قره برون	۱۰۵	۲۰۴۳	۲۵۹,۷	۱۲,۷
چالباش	۲۲۹	۳۲۴۰	۱۰۴,۶	۳,۲
شیب	۱۱	۲۱۴	۱۳,۳	۶,۲
دراکول	۴۰۹	۳۵۴۱	۱۴۵,۴	۴,۱
جمع	۸۱۲	۱۳۰۳۲	۶۲۱,۱	۴,۷۶

جدول ۳) رقم بندی خاویار در کل دوره صید در آبهای مشترک جنوب شرقی دریای خزر.

رقم بندی خاویار					درصد				
گونه	دان ۱	دان ۲	دان ۱	دان ۲	فشرده ۱	فشرده ۲	دان ۱	دان ۲	فشرده ۱
فیل ماهی	۹۸,۱	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	-
قره برون	۱۹۹,۲	۴۴,۴	۷,۴	۸,۷	۲,۸	۱۷,۱	۷۶,۷	۳,۴	-
چالباش	۵۲,۴	۴۴,۲	-	۸,۰	۴۲,۳	۵۰,۱	-	۷,۶	-
شیب	-	۱۳,۳	-	-	-	-	۱۰۰	-	-
دراکول	۵۰,۸	۸۶,۰	۲,۵	۶,۱	۳۴,۹	۵۹,۲	۱,۷	۴,۲	-

جدول ۴) ترکیب چنتیست ماهیان خاویاری در کل دوره صید در آبهای مشترک جنوب شرقی دریای خزر.

گونه	تعداد ماده	تعداد نر	درصد ماده	درصد نر
گونه	تعداد ماده	تعداد نر	درصد ماده	درصد نر
فیل ماهی	۲۷	۸	۵۰,۲	۴۶,۵
قره برون	۴۱	۱۵	۳۹	۲۴,۸
چالباش	۱۸	۱۷	۶۱	۵۸,۱
شیب	۲	۱	۲۷,۳	۹,۰
دراکول	۶۷	۴۴	۱۶,۴	۹۰,۷

جدول ۵) نسبت خاویار به گوشت در کل دوره بررسی در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر.

گونه	تعداد	گوشت	خاویار	درصد خاویار به گوشت
فیل ماهی	۶۲۴	۴۱۶۵۵	۱۸۹۰,۸	۴,۵
قره برون	۵۵۴۶	۱۱۰۱۳۳	۱۵۴۵۲,۱	۱۴,۰
چالباش	۳۵۲۵	۵۷۱۸۷	۷۱۰۱,۴	۱۲,۴
شیب	۲۶۳	۵۷۶۰	۶۲۲,۸	۱۰,۸
دراکول	۷۸۸۶	۶۰۹۱۹	۹۰۴۳,۹	۱۴,۸

جدول ۶) ترکیب جنسیت ماهیان خاویاری در کل دوره بررسی در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر.

گونه	تعداد ماده	تعداد نر	درصد ماده	درصد نر	درصد نر	درصد ماده	درصد ماده	نارس	رسیده	نارس	رسیده	نارس	رسیده
فیل ماهی	۱۴۷	۲۲۵	۱۱۹	۱۳۳	۲۳,۵	۳۶,۱	۱۹,۱	۱۹,۳	۱۹,۱	۳۶,۱	۲۳,۵	۱۹,۱	۱۹,۳
قره برون	۲۸۳۶	۳۶۸	۲۱۵۷	۱۸۵	۵۱,۱	۶,۷	۳۸,۹	۳۸	۳۸	۵۱,۱	۶,۷	۳۸,۹	۳۸,۹
چالباش	۱۷۰۲	۱۱۶۰	۳۸۷	۲۷۶	۴۸,۳	۳۲,۹	۱۱,۰	۷,۸	۱۱,۰	۴۸,۳	۳۲,۹	۱۱,۰	۷,۸
شیب	۱۱۸	۴۸	۸۴	۱۳	۴۴,۹	۱۸,۳	۳۱,۹	۴,۹	۳۱,۹	۴۴,۹	۱۸,۳	۳۱,۹	۴,۹
دراکول	۴۴۳۷	۱۷۰۱	۱۳۶۲	۳۸۶	۵۶,۳	۲۱,۵	۱۷,۳	۴,۹	۱۷,۳	۵۶,۳	۲۱,۵	۱۷,۳	۴,۹

جدول ۷) رقم بندی خاویار در کل دوره بررسی در آبهای ساحلی جنوب شرقی دریای خزر.

گونه	دان ۱	دان ۲	دان ۱	دان ۲	درصد	رقم بندی خاویار
فیل ماهی	۱۶۷۰,۲	۱۹۵,۶	۸۸,۳	۱۰,۴	۱,۳	۱۹۰,۴
قره برون	۱۲۲۳۴,۷	۲۹۷۴,۹	۲۱,۹	۲۲۰,۶	۰,۲	۱۹,۲
چالباش	۳۸۰۸,۴	۲۹۰۲	۳۲,۲	۳۵۸,۸	۰,۴	۴۰,۹
شیب	-	-	-	-	-	-
دراکول	۴۱۵۵,۸	۴۰۲۶,۵	۵۲۲,۹	۳۲۷,۷	۰,۸	۴۴,۶



بررسی چگونگی صید...

جدول الف- مقایسه نسبت‌های ماده رسیده و کل ماهی صید شده بین آبهای مشترک و آبهای ساحلی بر گونه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

گونه	X محاسبه شده	ملاحظات
فیل ماهی	۷/۶۶	در سطح *٪۱ معنی دار اختلاف بین نسبت‌ها وجود دارد.
دراکول	۹۶/۶۴	در سطح *٪۱ معنی دار اختلاف بین نسبت‌ها وجود دارد.
قره برون	۲/۱۲	در سطح **٪۵ معنی دار اختلاف بین نسبت‌ها وجود ندارد.
چالباش	۴۹/۱۵	در سطح *٪۱ معنی دار اختلاف بین نسبت‌ها وجود دارد.
شیب	۰/۵۸	در سطح *٪۵ معنی دار اختلاف بین نسبت‌ها وجود ندارد.

جدول ب- مقایسه نسبت‌های تعداد ماهی خواری خاویاردان یک و ماهی‌های ماده رسیده بین آبهای مشترک و آبهای ساحلی بر گونه‌های مختلف را نشان می‌دهد.

گونه	X محاسبه شده	ملاحظات
فیل ماهی	۰/۰۵	در سطح *٪۵ معنی دار بین نسبت‌ها اختلاف وجود ندارد.
دراکول	۰/۶۲	در سطح *٪۵ معنی دار بین نسبت‌ها اختلاف وجود ندارد.
قره برون	۰/۰۸	در سطح *٪۵ معنی دار بین نسبت‌ها اختلاف وجود ندارد.
چالباش	۱/۳۶	در سطح *٪۵ معنی دار بین نسبت‌ها اختلاف وجود ندارد.
شیب	-	در سطح *٪۵ معنی دار بین نسبت‌ها اختلاف وجود ندارد.

* χ^2 با درجه آزادی ۱ = ۱/۶۳ برابر ۶/۶۳ می‌باشد.

** χ^2 با درجه آزادی ۱ = ۱/۳ برابر ۳/۸۴ می‌باشد.

نمودار ۱- فراوانی سنی ماهی دراکول به درصد در محدوده آبهای مشترک جنوب


شرقی دریای خزر



جدول ۱- فراوانی سنی
ماهی دراکول بر محدوده
آبهای مشترک جنوب شرقی
دریای خزر

نمودار ۲- فراوانی سنی ماهی قره برون به درصد در محدوده آبهای مشترک

جنوب شرقی دریای خزر




جدول ۲- فراوانی سنی ماهی
قره برون در محدوده آبهای
مشترک جنوب شرقی دریای خزر



بررسی چگونگی صید...

نمودار ۳- فراوانی سنی ماهی چالباش به درصد در محدوده آبهای

مشترک جنوب شرقی دریای خزر



جدول ۱۰- فراوانی سنی

ماهی چالباش در محدوده


آبهای مشترک جنوب شرقی

دریای خزر

درصد فراوانی سن

نمودار ۴- فراوانی سنی ماهی شبیب به درصد در محدوده آبهای

مشترک جنوب شرقی دریای خزر



جدول ۱۱- فراوانی سنی ماهی

شبیب در محدوده آبهای مشترک


جنوب شرقی دریای خزر

درصد فراوانی سن

نمودار ۵- فراوانی سنی قلی ماهی به درصد در محدوده آبهای مشترک

جنوب شرقی دریای خزر

Fr. %



جدول ۱۲- فراوانی سنی قلی ماهی

در محدوده آبهای مشترک جنوب


شرقی دریای خزر

سن	درصد فراوانی
۱۲	۲,۰
۱۳	۳,۰
۱۴	۹,۰
۱۵	۶,۰
۱۶	۳,۰
۱۷	۴,۰
۱۸	۱,۰
۱۹	۲,۰
۲۱	۱,۰
۲۲	۱,۰
۲۴	۱,۰
۲۵	۱,۰
۲۶	۱,۰

نمودار ۶- فراوانی طولی ماهی بر اکول در محدوده آبهای مشترک


جنوب شرقی دریای خزر

Fr. %




بررسی چگونگی صید

نمودار ۷- فراوانی طولی ماهی قره بیزن در محبوس آبهای




نمودار ۸- فراوانی طولی ماهی چالباش در محبوس آبهای مشترک

جنوب شرقی دریای خزر




نمودار ۹- فراوانی طولی ماهی شیپ در محدوده آبهای مشترک چوب شرقی دریای خزر



نمودار ۱۰- فراوانی طولی فیل ماهی در محدوده آبهای مشترک

جنوب شرقی دریای خزر





پیشنهادات

- ۱- ذخایر ماهیان خاویاری در سالهای اخیر در حوزه دریای خزر کاهش یافته است (مقیم، ۶۹) و به منظور کمک به بازسازی ذخایر فوق علاوه بر افزایش میزان تکثیر طبیعی و مصنوعی می‌بایست از میزان صید سالانه آنها کاست بنابراین از صید در مناطقی مانند آبهای مشترک که شرایط نامناسبی نیز دارد باید خودداری نمود.
- ۲- با توجه به ذخایر غنی کیلکا و امکان افزایش بهره برداری از ذخایر فوق پیشنهاد می‌گردد در صورت تعاملی به بهره برداری در محدوده آبهای مشترک بهره برداری از ذخایر ماهیان کیلکا مورد توجه قرار گیرد.

منابع :

- اصلاح پرویز، حسن ، ۱۳۷۰ ، اکلولوژی، توالد و ناسل و ذخایر ماهیان خاویاری (دراکول)، مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران.
- گریم، داریوش، ۱۳۶۹ ، حقوق بین المللی شیلات و مقررات حاکم بر آبهای دریائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران.
- عقیم، مهدی، م - حقدار ساحلی ۱۳۶۹ ، پژوهه ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری سال بهره برداری ۶۹، مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران
- نادری، عزت...، م، سیف نراقی، ۱۳۶۸ ، روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، دفتر تحقیقات و انتشارات بنر
- حمیدیزاده، محمد رضا، ۱۳۶۹ ، آمارکاربردی در اقتصاد، بازرگانی و مدیریت، انتشارات دفتر مرکز جهاد دانشگاهی.

Berg L.S, 1948, Freshwater Fishes of the U.S.S.R and Abjacent countrys VOL 1
Modkova.

تشکر و قدردانی

از برادران ارجمند اعضای محترم هیات مدیره شیلات، معاونت محترم تحقیقاتی و آموزشی شیلات، سپرست و معاونت بهره برداری ناحیه ۴ شیلات. آقای دکتر شهراب رضوانی ریاست محترم مرکز و تمامی همکاران محترم در مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران که نامشان در ذیل آمده برای همکاری هایشان و اساتید محترم دکتر بهرام کیابی دکتر کیوان و دکتر حاجی زاده بخاطر راهنمایی های علمی و فنی و آقای حسن فضلی برای تست آماری داده ها تشکر و سپاسگذاری من نمایم.

- تاج محمد خوجه کارشناس - داده کارشناس - حسن فضلی تست آماری داده ها - حسین طالشیان
تعیین سن - عبدالوهاب نظریزاده بیومتریست - عیسی دوجی بیومتریست - عبدالجليل رومی بیومتریست -
عبدالوهاب کر بیومتریست - سمیع الله خطیر نامنی بیومتریست - خدر حسن سورانی بیومتریست -
فیروزمهدلوتکمانی قایقران - احمد ترحمی پلاک زن - قلیر عمرخان صباد - عبدالرحیم نوماج صباد -
تاج محمد جهانی صباد - طواف عاشور قلیچی صباد - قربان وردی کر صباد - عازم محمد خوزینی صباد - نورمحمد
ایزدی صباد - امان شعبانی صباد - رضا گشتاسبی ایرانور کامپیوتر



Sturgeon Fishing in Common Waters of the Caspian Sea

Mehdi Moghim

Mazandaran Fisheries Research centre.

Sari

I.F.R.T.O

ABSTRACT

Caspian sea is the largest enclosed sea of the world. Up to 10 miles from the coastal line is included in the EEZ after which common water zone starts. The investigation was carried out in order to determine sturgeon stocks in the common waters of southeastern caspian sea and propose suitable fishing methods. The study lasted for one year during which fishing data, species composition, age composition, maturity stages and other parameters relating to sturgeon aquired from common and exclusive waters and compared with each other. The results showed greater density of immature and smaller sturgeons in the common waters. Also southeastern common waters of the caspian sea was found unsuitable for fishing of sturgeons.