

بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی

بر *Zataria multiflora* Boiss. (Labiatae)

ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و

ماهی قزلآلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)

مصطفی شریف روحانی^(۱)*؛ مسعود حقیقی^(۲)؛ حسین عصائیان^(۳) و
غلامرضا لشتو آقایی^(۴)

rohani@ifro.ir

۱- مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران خیابان فاطمی غربی، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶

۲- مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی، تنکابن جاده دو هزار، صندوق پستی: ۴۶۸۱۵-۴۶۷

تاریخ پذیرش: آذر ۱۳۸۶

تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۸۶

چکیده

بررسی حاضر اولین مطالعه در زمینه اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی بر روی ماهی در دنیا می‌باشد. در این تحقیق اثر بیهوش کنندگی غلظتهاي ۵۰ و ۱۰۰ قسمت در میلیون (ppm) اسانس آویشن شیرازی (*Zataria multiflora*) روی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) با میانگین وزنی 40 ± 4 گرم و ماهی قزلآلای رنگین کمان پرورشی (*Oncorhynchus mykiss*) با میانگین وزنی 15 ± 2 گرم مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، درجه حرارت آب ۱۶ تا ۱۷ درجه سانتیگراد، اکسیژن محلول 7 ± 0.2 میلی گرم در لیتر و $\text{pH}=8$ بود. میانگین زمان رسیدن به مرحله بیهوشی کامل در غلظتهاي ۵۰ و ۱۰۰ قسمت در میلیون چه در ماهی آزاد و چه در ماهی قزلآلای بترتب ۳ و ۲ دقیقه بود و میانگین زمان ایجاد تعادل و زمان برگشت از بیهوشی بترتب ۲ و ۳ دقیقه بود. در مقایسه بین زمان ایجاد بیهوشی و زمان برگشت از بیهوشی با غلظتهاي ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm معنی دار وجود داشت ($P < 0.0001$).

ماهی‌های بیهوش شده با غلظت ۱۰۰ ppm پس از انتقال به آب عاری از اسانس آویشن برای مدت زمان ۳۰ دقیقه آرام بودند و نسبت به محرك ضعیف خارجی (لمسی) واکنشی از خود نشان نمی‌دادند. در مقایسه میان زمان رسیدن به مرحله بیهوشی و زمان برگشت از بیهوشی با غلظتهاي مختلف اسانس آویشن، اختلاف معنی داری بین ماهی آزاد و ماهی قزلآلای وجود نداشت ($P > 0.05$).

این تحقیق نشان می‌دهد که اسانس آویشن شیرازی دارای اثرات بیهوش کنندگی است ولی بدليل ایجاد عوارض شدید تفسی غیرقابل برگشت و دفرمه شدن ماهی که مغایر با اخلاق شیلاتی است (مرگ همراه با زجر) بکارگیری آن در مقایسه با دیگر مواد بیهوش کننده موجود توصیه نمی‌شود و فقط از غلظت ۱۵ تا ۲۰ ppm می‌توان بعنوان آرامبخش جهت کاهش استرس به هنگام هر نوع دستکاری ماهی استفاده نمود.

لغات کلیدی: آویشن شیرازی، *Zataria multiflora*، ماهی آزاد، قزلآلای رنگین کمان، دریای خزر

* نویسنده مسئول

مقدمه

بیهودش کنندگی اسانس آویشن شیرازی در ماهی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

هدف از این تحقیق بررسی اثر بیهودشی اسانس آویشن شیرازی در ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزلآلای رنگین کمان پرورشی بود.

مواد و روش کار

در این تحقیق از ۴۰ عدد ماهی آزاد دریای خزر با میانگین وزنی 40 ± 4 گرم و 40 عدد ماهی قزلآلای رنگین کمان با میانگین وزنی 15 ± 2 گرم استفاده شد. هر یک از انواع ماهی‌ها در چهار گروه دهتایی تقسیم بندی شدند. برای انجام آزمایش با هر یک از غلظت‌های 50 ppm و 100 ppm اسانس آویشن شیرازی، از 10 عدد ماهی بصورت تصادفی در طشت‌های پلاستیکی حاوی 40 لیتر آب استفاده شد (2 تکرار برای هر غلظت). اسانس آویشن شیرازی به روش تعطیر حجمی توسط شرکت باریج اسانس تولید شده بود و درجه خلوص آن 100 درصد فرض گردید. در آنالیز شیمیایی اسانس آویشن شیرازی بکار گرفته شده در این تحقیق که در پژوهشکده گیاهان دارویی به روش کروماتوگرافی گاز مایع متصل به طیفسنج جرمی (GC/MS) انجام شد، بیشترین مواد تشکیل دهنده آن را فلاونوپیدها عمدتاً تیمول به میزان $39/67$ درصد، کارواکرول $26/21$ درصد، پاراسیمن $10/62$ درصد، کارواکرول متیل استر $1/77$ درصد، لینالول $1/76$ درصد و بتا-کاریوفیلین $0/48$ درصد تشکیل می‌دادند. تیمول و کارواکرول مجموعاً نزدیک به 76 درصد بودند که خواص ضدغذنی کنندگی دارند.

قبل از بی بردن به خاصیت بیهودش کنندگی اسانس آویشن شیرازی، از غلظت‌های 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 50 و 100 قسمت در میلیون جهت بررسی اثرات ضد قارچی این اسانس بر روی ماهی استفاده شده بود که در این راستا پس از انجام آزمایش‌های مقدماتی غلظت‌های 50 و 100 قسمت در میلیون بعنوان غلظت‌های هوشبر مشخص شدند. درجه بی‌حسی در ماهی به غلظت ماده هوشبر و مدت زمان غوطه‌وری در آن ماده هوشبر بستگی دارد (جدول ۱). مطابق با جدول یک مرحله 4 بعنوان زمان رسیدن به بیهودشی و مرحله 1 بعنوان زمان برگشت از بیهودشی در نظر گرفته شد. برای انجام آزمایش، ابتدا مقدار غلظت‌های 50 ppm و 100 ppm این اسانس برای 40 لیتر آب

آویشن شیرازی (*Zataria multiflora*) از تیره نعناع، گیاهی پایا، با بوتهایی در پایه چوبی، پر ساقه، گردنه‌پوش و معطر است. ارتفاع آن به 40 تا 80 سانتیمتر می‌رسد. این گیاه دارای ساقه متعدد با پوست خاکستری متمایل به سفید و برگهای کوچک دارای دمبرگ کوتاه، مدور یا بیضی شکل است. از آویشن برای معطر کردن سس‌ها، غذاهای گوشتی و ماهیها در کنسروسازی و همچنین در مراسم مذهبی از عطر آن استفاده می‌شود (زمان، ۱۳۷۹). در طب سنتی ایران از گیاه آویشن شیرازی عنوان ماده ضد عفونی کننده، بی‌حس کننده و ضد اسپاسم استفاده می‌گردد (زرگری، ۱۳۷۱). سراخه‌های آن حاوی اسانس روغنی (ماده اصلی تشکیل دهنده این اسانس تیمول و کارواکرول است)، تانن‌ها، مواد اصلی تلخ، ساپونین‌ها و ضد عفونی کننده‌های گیاهی می‌باشد.. دو ماده فعال و مهم این گیاه، تیمول و کارواکرول می‌باشند. تیمول نوعی فنل است و در فرآورده‌های دارویی عنوان ماده ثابت کننده مصرف می‌شود. اسید روزمارینیک دیگر ماده فعال موجود در روغن اصلی این گیاه است که دارای اثرات ضد باکتری، ضد ویروسی، آنتی اکسیدان و ضد التهابی است (Parnham & Kesselring, 1985; Mohagheghzadeh et al., 2000 ; Osakabe et al., 2004).

بیهودش کننده‌ها در ماهی به جهت کاهش استرس ناشی از دستکاری ماهی‌ها به هنگام انجام فعالیتهای تحقیقاتی، واکسیناسیون، تشخیص رسیدگی جنسی و تخم‌کشی از مولدین در عملیات تکثیر مصنوعی، جانجایی و نقل و انتقال ماهیها از مکانی به مکان دیگر، اعمال جراحی و دیگر موارد از اهمیت خاصی برخوردارند.

تاکنون در تحقیقات شیلاتی، مدیریت شیلات، تکثیر و پرورش و بهداشت ماهی از بیهودش کننده‌های شیمیایی بسیاری استفاده شده است (Ross & Ross, 1999; Brown, 1993; Summerfelt & Smith, 1990; Peake, 1998; Anderson et al., 1997 ; Soto & Burhanuddin, 1995 ; Keene et al., 1998) ولی در ارتیاط با گیاه آویشن شیرازی گزارشی منتشر نشده است و در دنیا اولین بار است که اثر

انفرادی اضافه شدند (روش غوطه‌وری). پس از آن، مراحل مختلف بیهوشی در هر ماهی مشاهده و زمان مرحله ۴ بیهوشی (جدول ۱) هر یک از ماهی‌ها ثبت شد. سپس ماهی‌های بیهوش شده در هر یک از طشت‌ها بلافاصله به طشت‌های آب عاری از اسانس آویشن که بخوبی هوادهی می‌شدند، بازگردانده شدند و زمان مرحله بازگشت از بیهوشی (رسیدن به حد تعادل) ثبت شد (لازم به ذکر است که منظور از رسیدن به حد تعادل این است که ماهی از وضعیت قرارگیری به پهلو، به وضعیت طبیعی بر می‌گشت).

(ترتیب ۲ و ۴ میلی لیتر) محاسبه و در ظروف پلاستیکی ۱۰۰ میلی لیتری دربدار ریخته شد. سپس هر یک از این غلظت‌ها با ۱۰ میلی لیتر از آب طشت مذکور بخوبی ترکیب و رقیق شدند. پس از آن ترکیب حاصله به آب طشت‌های پلاستیکی حاوی ۴۰ لیتر آب (با دمای ۱۶ تا ۱۷ درجه سانتیگراد، اکسیژن محلول 7 ± 0.2 میلی‌گرم در لیتر و $pH=8$) که بخوبی هوادهی شده بودند، اضافه شد. سپس به هر یک از طشت‌های حاوی ماده بیهوشی مذکور، تعداد ۱۰ عدد ماهی قزل‌آلایا ماهی آزاد بیهوشی با میانگین وزنی 15 ± 2 گرم و 40 ± 4 گرم بصورت

جدول ۱: مراحل بیهوشی (برگرفته از: Summerflet & Smith, 1990)

مرحله	شرح	پاسخ رفتاری ماهی
۰	طبیعی	پاسخ طبیعی به محرکهای خارجی، تعداد حرکات سریوش آبتشی و تونیسیته عضلات طبیعی
۱	تسکین سبک	کاهش پاسخ به محرکهای خارجی؛ کاهش تعداد حرکات سرپوشش آبتشی؛ تعادل طبیعی
۲	تسکین عمیق	عدم پاسخ به محرکهای خارجی به جزء محرکهای قوی؛ کاهش تعداد حرکات تنفس؛ تعادل طبیعی
۳	عدم جزیبی تعادل	کاهش جزیبی تonus عضلات؛ توقف شنا؛ افزایش تعداد حرکات تنفس؛ واکنش به محرکهای ملامسه‌ای و ارتعاشی قوی
۴	عدم تعادل کل	عدم تعادل و فقدان عمومی تonus عضلات؛ کاهش تعداد حرکات تنفس ولی منظم؛ عدم واکنش نخاعی
۵	واکنش ناپذیری	کاهش واکنش به طور نامنظم؛ کاهش بیش از حد تعداد حرکات تنفس؛ کاهش بیش از حد ضربان قلب؛ از بین رفتن همه واکنش‌ها
۶	نارسایی مغزی (مرحله آسپیکسی یا خفگی)	توقف حرکات تنفسی؛ و ایست سریع قلب

نتایج

و $p = 0.01$ بود. پس از ثبت زمان برگشت از بیهودی ماهیها (مرحله یک جدول ۱) در آب عاری از انسان آویشن شیرازی دارای هواه، زمان رسیدن به حالت طبیعی نیز (مرحله صفر جدول ۱) با دو غلظت ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm مورد توجه قرار گرفت که نسبتاً طولانی و بترتیب ۲۵ و ۴۵ دقیقه بود. پس از این مدت، ماهیها به وضعیت اولیه خود همانند رفتارهای ماهی طبیعی بازگشتند. در این آزمایشها و در فاصله زمانی ذکر شده هیچگونه تلفاتی وجود نداشت. ولی افزایش مدت زمان غوطه‌وری ماهیها با غلظت‌های مذکور موجب عوارض شدید در ماهیها شد و شدت این عوارض به غلظت انسان آویشن و طول مدت زمان غوطه‌وری بستگی داشت. علائم ظاهری ماهیها در مسمومیت با انسان آویشن شیرازی بشرح زیر خلاصه شده است:


- تیره شدن رنگ پوست؛
- افزایش فعالیت و تحریک‌پذیری؛
- تشكیل موکوس فراوان روی پوست و سطح تیغه‌های آبششی؛
- افزایش تعداد دفعات باز و بسته شدن سرپوشاهای آبششی؛
- وضعیت شنای به پشت عمدتاً در کف استخر و به میزان کمتر در سطح آب؛
- ایجاد انحنای شدید ستون فقرات احتمالاً به دلیل انقباض شدید عضلات اسکلتی.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین زمان رسیدن به عدم تعادل و ایجاد بیهودی با غلظت‌های ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm انسان آویشن شیرازی چه در ماهی آزاد و چه در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی بترتیب ۳ و ۲ دقیقه بودند و میانگین زمان برگشت از بیهودی (رسیدن به حد تعادل و نه واکنش به حرکت‌های خارجی) بلافاصله پس از انتقال ماهی‌های بیهودشده به آب عاری از انسان آویشن شیرازی دارای هواه بترتیب ۲ و ۳ دقیقه بودند (جدول ۲). در مقایسه زمانهای ایجاد بیهودی و زمانهای برگشت از بیهودی بین دو غلظت مختلف انسان آویشن شیرازی اختلاف معنی‌دار وجود داشت ($P < 0.0001$). این نتایج نشان می‌دهد که زمان ایجاد بیهودی رابطه مستقیم با غلظت انسان داشت. به این صورت که بیهودی با غلظت ۱۰۰ ppm سریعتر از غلظت ۵۰ ppm ایجاد شد. بر عکس، زمان برگشت از بیهودی با غلظت انسان رابطه معکوس داشت. به این صورت که زمان برگشت از بیهودی با غلظت ۵۰ ppm ۱۰۰ ppm سریعتر از غلظت ۱۰۰ ppm ایجاد شد. منحنی همبستگی زمان رسیدن به بیهودی و زمان برگشت از بیهودی با هر یک از غلظت‌های ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm انسان آویشن شیرازی بترتیب در نمودارهای ۱ و ۲ نشان داده شده‌اند. معادله رگرسیون زمان ایجاد بیهودی (X) و زمان برگشت از بیهودی (Y) با غلظت ۵۰ ppm انسان آویشن شیرازی، بصورت $Y = 0.58X + 15.89$ و $Y = 2.39X - 106.83$ ؛ و با غلظت ۱۰۰ ppm بصورت $Y = 0.014$


جدول ۲: نتایج اثر بیهودی غلظت‌های مختلف انسان آویشن شیرازی در ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی

غلظت انسان آویشن شیرازی (ppm)	میانگین زمان از دست دادن تعادل (ثانیه)	میانگین زمان برگشت از بیهودی و رسیدن به حد تعادل (ثانیه)	میانگین زمان بیهودی کامل (ثانیه)	میانگین زمان بیهودی کامل بیهودی و رسیدن به حد تعادل (ثانیه)
۵۰	۸۹***	۸۸***	۱۸۰***	۱۲۰***
۱۰۰	۵۷	۵۸	۱۲۱	۱۲۰

*ستاره‌ها نشانه اختلاف معنی‌دار بین غلظت‌های ۵۰ ppm و ۱۰۰ ppm در هر نوع از ماهیها در مراحل بیهودی یکسان است ($P < 0.0001$).



نمودار ۱: منحنی همبستگی زمان ایجاد بیهوشی ($AT=X$) و زمان برگشت از بیهوشی ($RT=Y$) با ۵۰ قسمت در میلیون انسان آویشن شیرازی ($p=0.014$, $Y= 0.58X+15.89$)



نمودار ۲: منحنی همبستگی زمان ایجاد بیهوشی ($AT=X$) و زمان برگشت از بیهوشی ($RT=Y$) با ۱۰۰ قسمت در میلیون انسان آویشن شیرازی ($p= 0.01$, $Y= 2.39X-106.83$)

بحث

به طور کلی، این تحقیق نشان می‌دهد که انسان آویشن شیرازی دارای اثرات آرامبخشی و بیهودگی است. از غلظت‌های کم آن (15 ppm تا 20 ppm) می‌توان برای ایجاد آرامبخشی و کاهش استرس در ماهی به هنگام هر نوع دستکاری ماهی استفاده کرد. همچنین غلظت‌های 50 ppm تا 100 ppm ماده دارای اثرات بیهودگی است و احتمالاً این اثر ناشی از فلاونوپیدهای موجود در انسان آویشن شیرازی باشد. با این وجود استفاده از این ماده بعنوان بیهودی توصیه نمی‌شود زیرا نسبت به سایر بیهوده‌ها عوارض تنفسی شدیدتر و تلفات بیشتری را در ماهی موجب می‌شود. علام مسمومیت با انسان آویشن شیرازی بسیار حاد بوده و با ایجاد اختلالات شدید تنفسی موجب تلفات و مرگ ماهیها در فاصله زمانی کوتاه می‌شود.

تیره شدن رنگ پوست، افزایش فعالیت و تحریک‌پذیری، تشکیل موکوس فراوان روی پوست و سطح تیغه‌های آبشی، افزایش تعداد دفعات باز و بسته شدن سرپوشاهای آبشی، وضعیت شنای به پشت عمده‌ای در کف استخر و به میزان کمتر در سطح آب، ایجاد انحنای شدید ستون فقرات احتمالاً بدليل انقباض شدید عضلات اسکلتی و بالاخره مرگ از جمله اثرات سوئی است که در بیهودی با انسان آویشن شیرازی ایجاد می‌شوند. بیشترین مواد تشکیل‌دهنده و فعال انسان آویشن شیرازی، تیمول و کارواکرول هستند که این مواد دارای ساختمان فنلی بوده و احتمالاً می‌توانند مسبب اصلی ایجاد اثرات سوء باشند. مشابه همین عوارض در مسمومیت با ترکیبات فل‌گزارش شده است (نظمی و همکاران، ۱۳۸۴).

منابع

- چیت ساز، ح.، ۱۳۷۹. مطالعه اثرات بیهودی گل میخک (عصاره و انسان) در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ۷۴ صفحه.
- زدگری، ع.، ۱۳۷۱. گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، صفحات ۱ تا ۵۷.
- زمان، س.، ۱۳۷۹. گیاهان دارویی، روشاهی کشت، برداشت و شرح مصور رنگی ۲۵۶ گیاه. انتشارات ققنوس، ۳۶۷ صفحه.
- شريف‌پور، ع.؛ سلطانی، م.؛ عبدالahi، ح. و قیومی، ر.، ۱۳۸۱. اثر بیهودگی انسان گل میخک (*Eugenia caryophyllata*) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی. مجله علمی شیلات ایران، سال یازدهم، شماره ۴، صفحات ۵۹ تا ۷۴.

نتایج این تحقیق نشان داد که انسان آویشن شیرازی اثرات آرام بخشی و بیهودگی در ماهی دارد. انسان آویشن شیرازی با کمترین غلظت (10 ppm) موجب اثر تسکینی سبک در ماهیان آزاد دریای خزر و قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی شد. غلظت‌های بالاتر از 20 ppm انسان آویشن شیرازی موجب بیهودی در ماهی شدند ولی غلظت‌های 50 ppm و 100 ppm آن برای ایجاد بیهودی مناسبتر بودند. در این تحقیق اثر بیهودگی کنندگی غلظت‌های 50 ppm و 100 ppm قسمت در میلیون انسان آویشن شیرازی مورد آزمایش قرار گرفت که این اثر وابسته به غلظت بود. بدین صورت که زمان رسیدن به بیهودی با غلظت بیشتر سریعتر ایجاد شد و زمان برگشت از بیهودی نیز کندر ایجاد شد. درجه و عمق بیهودی با انسان آویشن شیرازی به غلظت آن و مدت زمانی که ماهی در آن غلظت غوطه‌ور می‌شد، بستگی داشت. تمام فعالیتهای ماهیان مورد آزمایش پس از بازگشت از بیهودی طبیعی بودند و هیچگونه عوارض مشاهده نشد و تمام ماهیها رفتار طبیعی داشتند (حداقل ۳ روز پس از اتمام آزمایشها). با افزایش غلظت انسان آویشن شیرازی یا افزایش مدت زمان غوطه‌وری ماهیها در غلظت‌های مذکور عوارضی در ماهیها ایجاد می‌شد که شامل: هیجان بیش از حد، شتاب در شنا کردن، شنا با مسیرهای کوتاه و بی‌هدف در جهات مختلف، از دست دادن کامل تعادل، به پشت افتادن ماهی و بالاخره انحنای ستون فقرات بدنیان انقباض شدید عضلات و مرگ در ماهی بود. شدت این عوارض و میزان تلفات با غلظت و مدت زمان غوطه‌وری رابطه مستقیم داشت. در مقایسه بین زمانهای ایجاد بیهودی و برگشت از بیهودی با غلظت‌های مختلف انسان آویشن شیرازی در دو گونه ماهی قزل‌آلای ماهی آزاد دریای خزر در شرایط محیطی یکسان، تفاوت معنی دار وجود نداشت ($P > 0.05$). با توجه به این مقایسه، به نظر می‌رسد که در شرایط محیطی یکسان اثر بیهودی انسان آویشن شیرازی به گونه ماهی بستگی نداشته باشد.

تاكنوون اثرات Antinociceptive (کاهش حساسیت به تحريكات دردناک) انفوژیون آبی و عصاره اتانولی آویشن شیرازی در رت و نیز عصاره هیدروالکلی قسمتهای هوایی این گیاه نشان داده شده است (Hosseinzadeh et al., 2000 ; Ramezani 2004 ; Jaffary et al., 2004 ; Hosseinzadeh et al., 2000; Ramezani et al., 2004; Jaffary et al., 2004; Martinez-Vazquez et al., 2004; Jaffary et al., 2004). اثرات ضد دردی و آنتی نوسيپتivo عصاره آویشن شیرازی را به فلاونوپیدهای نسبت می‌دهند (Hosseinzadeh et al., 2000; Ramezani et al., 2004; Jaffary et al., 2004; Martinez-Vazquez et al., 2004; Jaffary et al., 2004). عده فلاونوپیدهای انسان آویشن شیرازی، تیمول، کارواکرول، پی-سیمن، لینالول و گاما-ترپین هستند.

- Mohagheghzadeh, A. ; Shams-Ardekani, M. and Ghannadi, A. , 2000.** Volatile constituents of callus and flower-bearing tops of *Zataria multiflora* Boiss (Lamiaceae). *Flavour Fragr J.* Vol. 15, pp.373-376.
- Osakabe, N. ; Yasuda, A. ; Natsume, M. and Yoshikawa, T. , 2004.** Rosmarinic acid inhibits epidermal inflammatory responses: Anticarcinogenic effect of *Perilla frutescens* extract in the murine two stage skin model. *Carcinogenesis.* Vol. 25, pp.549-557.
- Parnham, M.J. and Kesselring, K. , 1985.** Rosmarinic acid. *Drug Future.* Vol. 10, pp.756-757.
- Peake, S. , 1998.** Sodium bicarbonate and clove oil as potential anaesthetics for nonsalmonid fishes. *North American Journal of Fish Management.* Vol. 18, pp.919-924.
- Ramesh, M. ; Rao, Y.N. ; Rao, A.V. ; Prabhakar. M.C. ; Muralidhar, N. , 1998.** Antinociceptive and anti-inflammatory activity of a flavonoid isolated from *Caralluma attenuate*. *Journal of Ethnopharmacol.* Vol. 62, pp.63-66.
- Ramezani, M. ; Hosseinzadeh, H. and Samizadeh, S. , 2004.** Antinociceptive effects of *Zataria multiflora* Boiss fractions in mice. *Journal of Ethnopharmacology.* Vol. 91, No. 1, pp.167-170.
- Ross, LG. and Ross, B. 1999.** Anaesthetic and sedative techniques for aquatic animals. London: Blackwell Sciences, Ltd. 2nd ed.
- Soto, G.G. and Burhanuddin, 1995.** Clove oil as a fish anaesthetic for measuring length and weight of rabbitfish. *Aquaculture.* Vol. 136, pp.149-152.
- Summerfelt, R.C. and Smith, L.S. , 1990.** Anesthesia, surgery, and related techniques. In: (eds. C.B. Schreck and P.B. Moyle). *Methods for Fishery Biology.* American Fisheries Society. Bethesda, Maryland, USA. pp.213-272.
- مهرابی، ی. ، ۱۳۷۶.** مطالعه اثر بیهوشی پودر گل میخک روی ماهی قزل آلا رنگین کمان. مجله آبزی پروری، معاونت تکثیر و پرورش شیلات ایران، سال ششم، شماره ۲۱، صفحات ۳۶ تا ۳۹.
- نظامی، ش.؛ پژند، ذ.؛ خوار، ح.؛ افسرده، ع. ، ۱۳۸۴.** تعیین LC₅₀ طی ۹۶ ساعت دو ترکیب نفتی فل و ۱-۴فنتل بر بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (*Acipenser persicus*). مجله علمی شیلات ایران، سال چهاردهم، شماره ۱، صفحات ۱۴۷ تا ۱۶۰.
- Anderson, W.G. ; Mckinley, R.S. and Colvecchia, M. , 1997.** The use of clove oil as an anesthetic for rainbow trout and its effects on swimming performance. *North American Journal Fishery Management,* Vol. 17, No. 2, pp.301-307.
- Brown, L.A. , 1993.** Anesthesia and restraint. In: (ed. M.K. Stoskopf). *Fish Medicine.* Philadelphia: WB Saunders Company. pp.79-90.
- Hosseinzadeh, H. ; Ramezani, M. and Salmani, G.A. , 2000.** Antinociceptive, anti-inflammatory and acute toxicity effects of *Zataria multiflora* Boiss extracts in mice and rats. *Journal of Ethnopharmacology.* Vol. 73, No. 3, pp.379-385.
- Jaffary, F. ; Ghannadi, A. and Siahpoush, A. , 2004.** Antinociceptive effects of hydroalcoholic extract and essential oil of *Zataria multiflora*. *Fitotrapia.* Vol. 75, pp.217-220.
- Keene, J.K. ; Noakes, D.L.G. ; Moccia, R.D. and Soto, C.G., 1998.** The efficiency of clove oil as an anesthetic for rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss* (Walbaum). *Aquaculture Research,* Vol. 29, pp.89-101.
- Martinez-Vazquez, M. ; Ramirez Apan, T.O. ; Aguilar H. and Bye, R. , 1996.** Analgesic and antipyretic activities of an aqueous extract and of the flavon linalin of *Buddleia cordata*. *Planta Med.* Vol. 62, pp.137-140.

A study of the anesthetic effect of *Zataria multiflora* Boiss (Labiatae) essence on *Oncorhynchus mykiss* and cultured *Salmo trutta caspius*

Sharif Rohani M.^{(1)*}; Haghghi, M.⁽²⁾; Assaeian, H.⁽³⁾ and
Lashtoo Aghaee, Gh.R.⁽⁴⁾

rohani@ifro.ir

1- Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran

2, 3, 4- Coldwater Fishes Research Center (CFRC), P.O.Box: 46815-467 Tonekabon, Iran

Received: May 2006

Accepted: November 2007

Keywords: *Zataria multiflora*, Anesthetics, *Salmo trutta caspius*, *Oncorhynchus mykiss*, Caspian Sea, Iran

Abstract

For the first time in the world, the effect of *Zataria multiflora* essence in concentrations of 50 and 100 ppm on *Oncorhynchus mykiss* fry weighing on average 15 ± 2 g and cultured *Salmo trutta caspius* weighing on average 40 ± 4 g was studied. The water temperature was 16-17°C, dissolved oxygen was 7 ± 0.2 and pH was 8 during the investigation. *Oncorhyncus mykiss* and *Salmo trutta caspius* reached complete sedation during an average time of 3 and 2 minutes respectively in the two concentrations. The mean balance and recovery time were 2 and 3 minutes respectively. Results showed that the sedation and recovery time are significantly different in the two species and with the two concentrations of the sedative ($P<0.0001$).

The fish anesthetized with 100ppm concentration of the sedative were calm for 30 minutes after transfer to clean water and showed no reaction to weak stimuli such as touching. The two concentrations of the sedative had no significantly different effect on the time to complete sedation and recovery in the two species ($P>0.05$). The research also showed that *Zataria muliflora* essence has an anesthetic effect on the two species, but because of the unwanted severe irreparable breathing side effects and the accompanied body deformation of the two species, the essence is not suggested as an anesthetic for the fish.

The essence is not recommended as a general anesthetic, but it may be used in 15-20ppm as a sedative during manipulation of the fish.

* Corresponding author