

## انگل‌های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت

ارغوان میار<sup>(۱)</sup>؛ عباس بزرگنیا<sup>(۲)</sup>؛ جمیله پازوکی<sup>(۳)</sup>؛ مریم برزگر<sup>(۴)</sup>؛  
محمود معصومیان<sup>(۵)</sup> و بهیار جلالی<sup>(۶)\*</sup>

Behiar\_jalali@yahoo.com

۱۴۱۵۵-۷۷۵ ۱، ۲، ۴ و ۶- واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی:

۳- دانشکده زیست محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۵- موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶

تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۸۶ تاریخ دریافت: اردیبهشت ۱۳۸۶

### چکیده

در تحقیق حاضر فون انگلی ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت برای اولین بار گزارش می‌گردد. در این بررسی تعداد ۸۰ عدد ماهی در تابستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ از محل ورودی رودخانه برار به رودخانه چالوس در مرزن آباد و نیز نواحی شرقی و غربی دریاچه ولشت بوسیله تور برتابی صید و زنده به آزمایشگاه مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی مرزن‌قزل منتقل گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. سه گونه انگل تک یاخته شامل *Trichodina trutta* و *Ichthyophthirius multifiliis* و *Leuciscus cephalus* از پوست و باله بررسی قرار گرفتند. سه گونه انگل تک یاخته شامل *Oncorhynchus mykiss* و *Chilodonella hexastica* از پوست *Gyrodactylus derjavini* از پوست و آبشش ماهی *O. mykiss*، انگل انگلهای پریاخته شامل پنج گونه منوژن شامل: *Gyrodactylus sp1* و *Chalcalburnus chalcoides* از پوست و آبشش *Gyrodactylus sp2* و *Tetraonchus capoeta gracilis* از پوست و آبشش *Gyrodactylus sp3* و *Barbus capito* از آبشش *Esox lucius* از پوست و آبشش *Argulus foliaceus* از باله ماهی *menonteron* و *Chalcalburnus chalcoides* از آبشش ماهی *Bothrioccephalus gowkongensis*، سستود *Capoeta capoeta gracilis* از روده *Myxobolus saidovi* و *Bothrioccephalus gowkongensis* از آبشش ماهی *Esox lucius* از روده *Raphiascaris acus* و *B. capito* برای اولین بار از ماهی *B. capito* جدا شده و این ماهی بعنوان میزبان جدید این انگل در ایران معرفی می‌شود. انگل *Myxobolus saidovi* نیز برای اولین بار از رودخانه چالوس گزارش می‌گردد. بعلاوه بغير از *Tetraonchus menonteron*، سایر گونه‌های انگلی یافت شده از ماهیان دریاچه ولشت برای اولین بار گزارش می‌شود.

**کلمات کلیدی:** انگل، ماهی، میزبان، آب شیرین، استان مازندران، ایران

\*نویسنده مسئول

**مقدمه****انگل‌های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت**

و آبشنش به کمک ذره بین (بزرگنمایی ۲-۴) و بررسی‌های میکروسکوپی با نمونه‌برداری از پوست، آبشش، باله‌ها و چشم ماهیان انجام شد.

شناسایی ماهیان با استفاده از کلید شناسایی (عبدلی، ۱۳۷۸) و مأخذ موجود در وبسایت دکتر Brian Coad صورت پذیرفت. انگل‌ها با استفاده از کلیدهای شناسایی انگل‌های آب شیرین (Gussev 1983)، Lom (1985, 1992) و Dykova (1983) و جلالی (۱۳۷۷) شناسایی شدند. تثیبت و رنگ‌آمیزی نمونه‌های انگلی با پیروی از دستور العمل Fernando و همکاران (1972) و Gussev (1983) انجام گردید.

**نتایج**

در این تحقیق ۱۲ گونه انگل از ۵ گونه ماهی رودخانه چالوس و ۳ گونه ماهی دریاچه ولشت جداسازی و تا حد جنس و گونه شناسایی شدند (جداول ۱ و ۲). از میان انگل‌های شناسایی شده سه گونه انگل تک یاخته شامل *Ichthyophthirius multifiliis* از پوست قزل‌آلاء، *Trichodina trutta* از قزل‌آلاء و *Chilodonella hexastica* از پوست قزل‌آلاء و سفید ماهی جدا شدند. همچنین انگل‌های پریاخته شامل *Gyrodactylus sp1* از قزل‌آلاء و *Gyrodactylus derjavini* ماهی کولی، *Gyrodactylus sp2* از ماهی زردک، *Tetraonchus menonteron* از آبشنش اردک ماهی بدست آمدند. انگل *Myxobolus saidovi* از زردک ماهی سیاه ماهی، سستود *Bothriocephalus gowkongensis* از زردک و نماتود *Raphiascaris acus* از روده اردک ماهی جدا گردیدند.

در میان انگل‌های بدست آمده سستود *Bothriocephalus gowkongensis* برای اولین بار از ماهی زردک جدا شده و این ماهی بعنوان میزبان جدید این انگل معرفی گردید. نتایج این بررسی در جداول ۱ و ۲ ارائه شده است.

رودخانه چالوس در بخش شمالی البرز مرکزی و در استان مازندران جریان داشته و جزء حوضه آبریز خزر محسوب می‌شود و دریاچه ولشت در جنوب غربی شهرستان چالوس و شمال شرق کلاردشت قرار دارد. با اینکه این دو توده آبی از یک منطقه سرچشمه می‌گیرند ولی دارای اکوسیستم‌های متفاوتی می‌باشند، چنانچه یکی رودخانه‌ای (lotic) و دیگری دریاچه‌ای (lentic) است. تا بحال مطالعات جامعی در مورد ماهیان دریاچه ولشت و منشاء آنها صورت نگرفته است و تحقیقات مربوط به شناخت فون انگلی دریاچه ولشت نیز محدود به بررسی‌های انجام گرفته توسط Molnar و Jalali در سال ۱۹۹۰ می‌باشد که حضور منوزن *Tetraonchus menonteron* را در آبشنش اردک ماهیان دریاچه گزارش کردند. بررسی‌های انجام گرفته توسط ملک در سال ۱۳۷۱ منجر به شناسایی متاسرکر ترمانت *Clinostomum complanatum* در حفره آبشنی سیاه ماهیان رودخانه تنکابن شد. شمسی در سال ۱۳۷۷ از ماهیان *Leuciscus cephalus* و *Capoeta capoeta* رودخانه شیرود اندگل‌های متاسرکر ترمانت *Clinostomum complanatum* و از *Bunocotyle cingulata* را گزارش سیاه ماهی در رودخانه چالوس تا بحال هیچ تحقیقی در مورد انگل‌های نمود. در رودخانه چالوس تا بحال هیچ تحقیقی در مورد انگل‌های ماهیان بومی یا ماهیان معرفی شده انجام نشده است. هدف تحقیق حاضر، بررسی و شناسایی انگل‌های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت و ارزیابی تهدیدات ناشی از انگل‌های یافته شده برای ماهیان پرورشی به ویژه قزل‌آلاء می‌باشد.

**مواد و روش کار**


تعداد ۸۰ عدد ماهی به منظور بررسی‌های انگل شناسی طی چهار مرحله در تابستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ (در هر فصل ۴۰ عدد ماهی) نمونه‌برداری گردید. ماهیان بوسیله تور پرتایی و قلاب صید شده و بصورت زنده به آزمایشگاه مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی مرزن قزل منتقل شدند. پس از بیهوش نمودن ماهیان، بررسی‌های انگل شناسی با بررسی پوست، باله‌ها

جدول ۱: ماهیان صید شده از رودخانه چالوس و دریاچه ولشت در تابستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵


نام علمی	خانواده	نام محلی	وزن (گرم)	محل صید
<i>Oncorhynchus mykiss</i> Walbaum, 1792	Salmonidae	قرلآلای رنگین کمان	۱۰ تا ۵	رودخانه چالوس
<i>Alburnoides bipunctatus</i> Bloch, 1782	Cyprinidae	ماهی کولی	۱۲ تا ۱۶	رودخانه چالوس
<i>Barbus capito</i> Guldenstaedt, 1773		ماهی زردک	۱۲ تا ۲۵	رودخانه چالوس
<i>Capoeta capoeta gracilis</i> Keyserling, 1861		سیاه ماهی	۲۰ تا ۲۵	رودخانه چالوس
<i>Chalcalburnus chalcoides</i> Guldenstaedt, 1772		شاه کولی	۱۲ تا ۱۲	دریاچه ولشت
<i>Leuciscus cephalus</i> Linnaeus, 1758		سفید ماهی	۱۰ تا ۷۵	رودخانه چالوس و دریاچه ولشت
<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Esocidae	اردک ماهی	۷۵ تا ۹۶	دریاچه ولشت

جدول ۲: انگل‌های حدا شده از ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت


گروه انگلی	نام علمی	میزبان	اندام	تاریخ	محل صید ماهی
Protozoa	<i>Ichthyophthirius multifiliis</i> Fouquet, 1876	قرلآلای	پوست	تابستان ۱۳۸۴	رودخانه چالوس
	<i>Trichodina trutta</i> Mueller, 1937	قرلآلای	پوست و باله	تابستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵	رودخانه چالوس
	<i>Chilodonella hexastica</i> Kiernik, 1909	قرلآلای، سفید ماهی	پوست	تابستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵	رودخانه چالوس
	<i>Myxobolus saidovi</i> Gasimagomedov, 1970	سیاه ماهی	آبشش	بهار ۱۳۸۵	رودخانه چالوس
	<i>Tetraonchus menonteron</i> Wagener, 1857	اردک ماهی	آبشش	تابستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵	دریاچه ولشت
	<i>Gyrodactylus derjavini</i> Mikhailov, 1975	قرلآلای	پوست و آبشش	تابستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵	رودخانه چالوس
	<i>Gyrodactylus sp1</i>	کولی	پوست و آبشش	بهار ۱۳۸۵	رودخانه چالوس
	<i>Gyrodactylus sp2</i>	ماهی زردک	پوست و آبشش	بهار ۱۳۸۵	رودخانه چالوس
	<i>Gyrodactylus sp3</i>	سیاه ماهی	پوست و آبشش	بهار ۱۳۸۵	رودخانه چالوس
Metazoa	<i>Bothriocephalus gowkongensis</i> Yeh, 1955	ماهی زردک	روده	تابستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵	رودخانه چالوس
	<i>Raphidascaris acus</i> Block, 1779	اردک ماهی	روده	بهار ۱۳۸۵	دریاچه ولشت
	<i>Argulus foliaceus</i> Mueller, 1785	کولی	باله	بهار ۱۳۸۵	دریاچه ولشت




شکل ۲: قزل‌آلای *Trichodina trutta* از پوست و باله قزل‌آلای بزرگنمایی (x1000)



شکل ۱: قزل‌آلای *Ichthyophthirius multifiliis* از پوست ماهی قزل‌آلای بزرگنمایی (x100)



شکل ۴: قلاب‌های اپستوهاپتور *Tetraonchus menonteron* از آبشش اردک ماهی بزرگنمایی (x1000)



شکل ۳: آبشش سیاه ماهی *Myxobolus saidovi* از آبشش سیاه ماهی بزرگنمایی (x1000)

(1986) مبنی بر نابودی بخش اعظم ماهیان آزاد و قزل‌آلای رودخانه‌های نروژ به دلیل عفونت با *Gyrodactylus salaryi* گواهی بر جدی بودن تهدید ناشی از انگل‌های این جنس می‌باشد. با توجه به اینکه برنامه بهره‌برداری از قفس‌های توری شناور برای پرورش ماهی قزل‌آلای در دریاچه ولشت تدوین شده است، بنابراین ماهیان ۱۵ تا ۴۵ روز قبل از انتقال باید در شرایط قرنطینه‌ای مطمئن قرار گیرند و پس از حصول اطمینان از *Chilodonella Ichthyophthirius* سلامتی آنها بویژه از نظر *Gyrodactylus* و بالاخره *Gyrodactylus* نسبت به انتقال آنها به قفس‌های شناور اقدام گردد. آلودگی‌های انگلی جزو مشکلات مهم در جریان توسعه پرورش ماهی قزل‌آلای در دریاچه ولشت محسوب می‌گردند که در صورت عدم توجه به آنها می‌توانند به کاهش شدید ماهی قزل‌آلای پرورشی در دریاچه ولشت منجر گردد.

با اینکه رودخانه چالوس و دریاچه ولشت در یک اکوسیستم بزرگ خزری قرار دارند، اما دارای فون ماهیان و به دنبال آن انگل‌های اختصاصی متفاوتی می‌باشند. این تفاوت ممکن است به وضعیت هیدرولوژیک دو توده آبی که یکی رودخانه‌ای و دیگری دریاچه‌ای است، مربوط شود.

فون انگلی ماهیان دریاچه ولشت از نظر تنوع فقیر بوده و دو گونه انگلی یافت شده امکان دارد به همراه اردک ماهی به دریاچه وارد شده باشد، که نشانگر این واقعیت است که شرایط قرنطینه‌ای که جزو قوانین معرفی ماهی از منطقه‌ای به منطقه دیگر می‌باشد در این دریاچه رعایت نشده است.

انگل‌های تکیاخته و منوزن *Gyrodactylus derjavini* یافت شده در ماهیان قزل‌آلای در شرایط پرورشی جزو انگل‌های *Jensen* و *Johnsen* گزارش محسوب می‌گردند. گزارش *Jensen* و *Johnsen*

## بحث

- Coad, B.**, 1979. Fresh water fishes of Iran. Journal of Bombay Natural History Society. Vol. 76, pp.86-105.
- Fernando, C.H. ; Furtado, J.I. ; Gussev, A.V. ; Hanek and Kakong, S.A.**, 1972. Methods for the study of fresh water fish parasites. University of Waterloo, Biology Series. 76P.
- Jalali, B. and Molnar, K.**, 1990. Occurrence of monogeneans on fresh water fishes of Iran. II: *Dactylogyrus spp.* on cultured Iranian fishes. Acta. Veterinary. Hungarica. Vol. 34, No 4, pp.239-242.
- Johnsen, B.O. and Jensen, A.J.**, 1986. Infestations of Atlantic salmon (*Salmo salar*) by *Gyrodactylus salaries* in Norwegian rivers. Journal of Fish Biology. Vol. 29, pp.233-241.
- Lom, J. and Dykova, I.**, 1992. Protozoan parasites of fishes. Elsevier Science Publishers, Netherlands. pp.10-125
- Gussev, A.V.**, 1983. The methods of collection and processing of fish parasitic monogenean materials. Nauka, Leningrad, USSR. 48P. (in Russian).
- Gussev, A.V.**, 1985. Monogenea. In: (ed. O.N. Bauer). Key to parasites of freshwater fishes of USSR. Nauka Leningrad, USSR. Vol. 2, 424 P. (in Russian).

طی این بررسی ۹ گونه انگل از ماهیان رودخانه چالوس و ۳ گونه انگل از ماهیان دریاچه و لشت یافت شدند. غیر از انگل منوزن *Tetraonchus menonteron* دو گونه دیگر برای اولین بار از دریاچه *Ichthyophthirius multifiliis* می‌گزارش می‌گردند. انگل‌های *Chilodonella* و *Trichodina* قزل آلاز استان مازندران گزارش می‌گردند. سیاه ماهی بعنوان میزبان انگل *Myxobolus saidovi* و ماهی زردک بعنوان میزبان انگل سستود *Bothriocephalus gowkongensis* برای اولین بار در کشور معرفی می‌گردند. در میان انگل‌های یافته شده چهار گونه *Gyrodactylus* و یک گونه *Tetraonchus* دارای ویژگی میزبانی نیز می‌باشند. در بین این گونه‌ها *Gyrodactylus derjavini* دارای بالاترین توان بیماریابی است که در جریان توسعه پرورش ماهی قزل آلا در رودخانه چالوس و انشعابات آن باید مورد توجه قرار گرفته و روش‌های اجرائی مؤثری برای پیشگیری از شیوع *Gyrodactylus* طراحی گردد.

براساس مطالعه حاضر، لزوم انجام تحقیقات جامع و تفصیلی بر روی دریاچه و لشت در قالب یک طرح با هدف شناخت وضعیت لیمنولوژیک و اکولوژیک دریاچه و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن ضروری است. بعلاوه باید شیوه‌های مدیریتی دریاچه که متناسب با میزان بزرگی رودخانه و پایدار از آن از جنبه‌های اکوتوریسم و شیلاتی باشد تدوین گردد.

## منابع

- جلالی جعفری، ب.، ۱۳۷۷. انگل‌ها و بیماریهای انگلی ماهیان آب شیرین ایران. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان، اداره آموزش و ترویج، تهران. ۵۶۴ صفحه.
- شمسی، ش.، ۱۳۷۷. شناسایی انگل‌های کرمی ماهیان رودخانه گرگانرود، تجن، تنکابن و شیرود. مؤسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.
- ملک، م.، ۱۳۷۲. بررسی آводگی انگلی سیاه ماهی به *Clinostomum complanatum* (Rudolph, 1819) و سیکل زندگی آنها. بولتن علمی شیلات، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۲، صفحات ۴۵ تا ۶۵

## Fish parasites in Valasht Lake and Chalus River

Miar A.<sup>(1)</sup>; Bozorgnia A.<sup>(2)</sup>; Pazooki J.<sup>(3)</sup>; Barzegar M.<sup>(4)</sup>;  
Masoumian M.<sup>(5)</sup> and Jalali B.<sup>(6)\*</sup>

behiar\_jalali@yahoo.com

1,2,4,6 - Fisheries Dept. Sciences and Research Branch, Islamic Azad University,  
P.O.Box: 14515-775 Tehran, Iran

3 - Dept. of Biological Sciences, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran

5 - Iranian Fisheries Research and Training Organization, P.O.Box: 14155-6116  
Tehran, Iran

Received: May 2007

Accepted: February 2007

**Keywords:** Parasites, Fish, Host, Freshwater, Mazandaran Province, Iran

### Abstract

Fish parasites from Valasht Lake and Chalus River were studied in spring 2005 and summer 2006. Fish specimens were caught by hand net and transported to local laboratory alive. We found three protozoa species, *Trichodina trutta* and *Ichthyophthirius multifiliis* on *Oncorhynchus mykiss*; and *Chilodonella hexastica* on the skin of *O. mykiss* and *Leuciscus cephalus*. We also separated metazoan parasites from the fish in the two sampling sites that included *Gyrodactylus derjavini* infecting skin and gill of *O. mykiss*, *G. sp1* infecting *Alburnoides bipunctatus*, *G. sp2* from *Barbus capito* and *G. sp3* from *Capoeta capoeta gracilis* and *Tetraonchus menonteron* that infested the gills of *Esox lucius*. Other parasites which we found were *Myxobolus saidovi* from the gills of *C. c. gracilis*, *Bothrioccephalus gowkongensis* from intestine of *Barbus capito*, *Raphidascaris acus* from intestine of *E. lucius* and finally *Argulus foliaceus* from skin of *Chalcalburnus chalcooides*. This is a first time report of a new host, *B. capito* for *Bothrioccephalus gowkongensis* and a new locality Chalus River for *Myxobolus saidovi* parasites. Furthermore, with the exception of *Tetraonchus menonteron* which have been reported before, the rest of the parasites of the fishes from Valasht Lake are reported for the first time.

---

\* Corresponding author