

## بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازماندگی

### بچه میگوی سفید هندی

(*Penaeus indicus*, H.Milne Edward, 1837)

آرش جاهدی<sup>(۱)</sup>، عبدالمحمد عابدیان<sup>(۲)</sup> و جاسم غفله مرزعی<sup>(۳)</sup>

arashjahedi@yahoo.com

۱ و ۲ - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور صندوق پستی: ۴۶۴۱۴-۳۵۶

۳ - مرکز تحقیقات آبی پروری جنوب کشور، اهواز، صندوق پستی: ۶۱۳۳۵-۴۱۶

تاریخ ورود: تیر ۱۳۸۲ تاریخ پذیرش: آذر ۱۳۸۲

### چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (*Penaeus indicus* H.Milne Edward, 1837) در پنج سطح شامل صفر (تیمار شاهد بدون افزایش بستر مصنوعی) ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد افزایش بستر مصنوعی با سه تکرار به صورت طرح کاملاً تصادفی انجام پذیرفت. بچه میگوهای سفید هندی ۳۵ روزه (PL35) با میانگین وزن  $0.42 \pm 0.02$  گرم به مدت ۹۰ روز در مخازن ۴ تنی، با تراکم ۱۵۷ عدد در هر مخزن معادل ۳۰ عدد در مترمربع، پرورش یافتند. در این آزمایش شاخصهای رشد و بازماندگی بچه میگوها در تیمارهای مختلف در دوره پرورش بررسی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش بستر مصنوعی بر برخی شاخصهای رشد بچه میگوی سفید هندی (*Penaeus indicus*) دارای اثر معنی دار بود ( $P < 0.05$ ). بیشترین میانگین افزایش وزن بدن، بالاترین میانگین وزن نهایی بدن بچه میگوها، میانگین ضریب رشد ویژه (SGR)، میانگین تولید و همچنین کمترین میزان میانگین ضریب تبدیل غذایی (FCR) در تیمار ۴۰ درصد افزایش بستر مصنوعی بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش بستر مصنوعی اثر معنی داری بر شاخص افزایش طول کاراپاس انتهایی و بازماندگی نداشت ( $P > 0.05$ ).

**کلمات کلیدی:** میگوی سفید هندی، *Penaeus indicus*، بستر مصنوعی، رشد، بازماندگی

## مقدمه

میگوها اصولاً کفزی بوده و تمایل به شنای زیاد ندارند. با توجه به اینکه معمولاً در کف استخر با کمبود اکسیژن مواجه هستند این کمبود عامل محدود کننده‌ای برای رشد و تولید این آبزیان بشمار می‌رود (دندانی، ۱۳۷۸ و Tidwell et al., 1998).

میگوها معمولاً همه چیزخوار بوده اما گوشتخواری را ترجیح می‌دهند. در صورت توزیع غیریکنواخت غذا و یا تراکم بالای میگوها در واحد سطح، اقدام به هم نوع خواری (Cannibalism) می‌کنند (دندانی، ۱۳۷۵).

از طرفی تراکم بالای میگوها از عوامل مستعدکننده بیماریها محسوب می‌شود. شرایط تغذیه مناسب و کاهش استرس ناشی از تراکم موجب کنترل و پیشگیری بیماری ویبریوزیس می‌گردد (آوخ کیسمی، ۱۳۷۷). استقرار بسترهای مصنوعی در مخازن موجب کم شدن تراکم میگوها در واحد سطح و در نتیجه کم شدن فشار استرس ناشی از تراکم می‌شود. این ساختارها به توزیع بیشتر غذا در مخازن نیز کمک کرده، همچنین استفاده بهتر از ستون آب را نیز برای میگوها فراهم می‌نماید.

در این راستا استفاده از بسترهای مصنوعی بعنوان یکی از عوامل مؤثر بر میزان تولید و بازماندگی گونه‌های مختلف میگو مورد توجه بوده است (Tidwell et al., 1999 ; Tidwell et al., 1998 ; Kumlu & Eroldogan, 2000 ; Kumlu et al., 2001).

در دنیا مطالعات زیادی در این زمینه بویژه بر روی گونه میگوی سفید هندی (*Penaeus indicus*) صورت نگرفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی در سطوح مختلفی بر میزان رشد و بقای بچه میگوهای سفید هندی (بالتر از PL35) که در حال حاضر مهمترین گونه پرورشی ایران می‌باشد.

## مواد و روش کار

این تحقیق در ایستگاه تحقیقات شیلاتی بندر امام خمینی - ماهشهر واقع در بندر صیادی امام خمینی (ره) وابسته به مرکز تحقیقات شیلات استان خوزستان اجرا شد. در این آزمایش ۱۵ مخزن بتونی با ابعاد (۳۸۰ × ۱۳۸ سانتیمتر) برای پرورش بچه میگوها مورد استفاده قرار گرفت. حجم هر یک از این مخازن حدود ۵۰۰۰ لیتر بود که با ۴۰۰۰ لیتر آب پر شدند (ارتفاع آب ۷۵ سانتیمتر در نظر گرفته شد). هر سه روز، ۳۰ درصد آب از طریق سیفون جهت برداشت مدفوع و مواد باقیمانده تعویض می‌شد. در داخل هر مخزن چهار عدد سنگ هواکار گذاشته شد تا اکسیژن لازم تامین شود. سنگهای هوا به دو دستگاه هواده با قدرت ۴ اسب بخار متصل بودند که هر ۸ ساعت یکی از آنها مورد استفاده قرار می‌گرفت. سقف هر مخزن بوسیله توری‌های چشمه ریز به منظور جلوگیری از پرش میگوها به بیرون پوشیده شد.

بچه میگوهای مورد استفاده در این آزمایش از استان بوشهر تهیه گردیدند و بلافاصله به ایستگاه تحقیقات شیلاتی بندر امام خمینی (ره) منتقل شدند و بعد از سازگاری در مخازن بتونی ۴ تنی ذخیره سازی شدند. بست لاروهای تهیه شده در مرحله PI<sub>10</sub> بودند که بعد از رسیدن به سن PL<sub>35</sub> توزین و بطور تصادفی داخل مخازن پرورشی به تعداد ۱۵۷ عدد بچه میگو (معادل ۳۰ عدد در مترمربع) در هر مخزن ذخیره‌سازی شدند. متوسط وزن بچه میگوهای داخل هر مخزن بطور جداگانه برآورد شد و طول کاراپاس حدود ۵۰ عدد بچه میگو اندازه‌گیری گردید و میانگین طول کاراپاس برای کل تیمارها در نظر گرفته شد. بسترهای مصنوعی بوسیله چهارچوبی از لوله پلیکا نیم اینچ ساخته شده که سطح آن با توری پلاستیکی پوشیده شد. فاصله بسترها تا کف مخازن، ۲۵ سانتی‌متر و فاصله طبقات با یکدیگر، ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد.

زیست‌سنجی بچه میگوها هر ۱۵ روز یکبار انجام شد. برای سنجش رشد وزنی میگوها ۳۰ درصد میگوها از مخازن صید شده و بعد از خشک کردن با حوله، بوسیله ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۱ گرم توزین و میانگین وزن بدن بدست آمد. برای سنجش رشد طولی بچه میگوها، طول حذقه‌ای کاراپاس بچه میگوها (عابدیان، ۱۳۸۰) (از ناحیه حذقه‌ای کاراپاس تا انتهای کاراپاس) بوسیله کولیس با دقت ۰/۰۵ میلی‌متر اندازه‌گیری شد و سپس میانگین آن بدست آمد. پس از انجام عمل زیست‌سنجی، مخازن مجدداً آبگیری

شده و بچه میگوها به داخل مخزن بازگردانده می‌شدند.

غذادهی با استفاده از غذاهای تجاری آغازین ثمر کل خوزستان و هووراش بوشهر روزانه در سه وعده در ساعات ۸، ۱۴ و ۲۰ انجام شد. غذادهی با بررسی وضعیت مخازن و میزان غذاخوری به صورت اشباع انجام شد (Santiago, 1996).

در طول دوره آزمایش pH، دما و شوری آب بوسیله pH متر دیجیتال پرتابل، دماسنج الکلی و شوری سنج چشمی مدل ATAGO بصورت روزانه در ساعت ۱۱ صبح اندازه‌گیری شد. دوره نوری (photoperiod) در داخل سالن پرورش بدلیل وجود پنجره‌های متعدد از دوره نوری شبانه روز پیروی گردید.

برای ارزیابی تاثیر سطوح مختلف افزایش بسترهای مصنوعی روی میگوها از شاخصهای رشد شامل افزایش وزن بدن (Weight gain) (Allan & Maguire, 1992)، ضریب رشد ویژه Feed Conversion Ratio (FCR) (Taccon, 1990) Spwcifi Growth Rate (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (Bukhari et al., 1997) و بازماندگی استفاده شد تا نتیجه آزمایش بر مبنای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در این بررسی پنج سطح مختلف افزایش بسترهای مصنوعی شامل صفر (شاهد) ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد با سه تکرار در نظر گرفته شد که مجموعاً ۱۵ عدد مخزن ۵۰۰۰ لیتری مورد استفاده قرار گرفت. مخازن در یک سالن بصورت طرح کاملاً (Completely Randomized Desgin) تصادفی توزیع شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و با روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (One-way) ANOVA انجام شد. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون LSD در سطح ۵ درصد ( $P=0/05$ ) و محاسبه داده‌ها و ترسیم نمودارها از بسته نرم‌افزاری EXCEL استفاده شد.

## نتایج

میانگین pH در تیمارهای مختلف بین ۷/۴۷ و حداکثر ۸/۳ و تغییرات روزانه دمای آب بین حداکثر ۳۱

درجه سانتی‌گراد در اواسط دوره پرورش و حداقل ۲۷ درجه سانتی‌گراد در اواخر دوره پرورش در نوسان بود. میانگین دمای آب در کل دوره پرورش ۲۹/۳۹ درجه سانتی‌گراد و تغییرات شوری نیز در کل دوره بین حداقل ۴۵ و حداکثر ۴۸ قسمت در هزار متغیر بود.

نتایج مربوط به اثر بسترهای مصنوعی بر روی شاخص‌های رشد میگوی سفید هندی در جدول (۱) نشان داده شده است.

نتایج آنالیز واریانس یک طرفه (One-way ANOVA) نشان داد که افزایش بستر مصنوعی دارای اثر معنی‌دار ( $P < 0/05$ ) روی افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و تولید بچه میگوهای سفید هندی (*Penaeus indicus*) بود. بالاترین میزان افزایش وزن بدن در تیمار ۴۰ درصد افزایش بستر با مقدار میانگین  $7/33 \pm 0/39$  گرم بدست آمد که این میزان با مقدار افزایش وزن بچه میگوها در تیمارهای ۲۰ و ۶۰ درصد افزایش بستر اختلاف معنی‌دار نداشت ( $P > 0/05$ ) ولی با مقادیر بدست آمده در تیمارهای شاهد و ۸۰ درصد اختلاف معنی‌دار داشت ( $P < 0/05$ ).

بالاترین میزان ضریب رشد ویژه در تیمار ۴۰ درصد افزایش بستر مصنوعی بدست آمد  $3/254 \pm 0/036$  که این مقدار با مقادیر بدست آمده برای تیمارهای ۲۰، ۶۰ و ۸۰ درصد افزایش بستر اختلاف معنی‌دار نداشت ( $P > 0/05$ ) ولی با مقدار بدست آمده برای تیمار شاهد با مقدار  $3/03 \pm 0/04$  دارای اختلاف معنی‌دار بود ( $P < 0/05$ ).

کمترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار ۴۰ درصد بدست آمد ( $3/11 \pm 0/17$ )، که با مقادیر بدست آمده برای تیمارهای ۲۰ و ۶۰ درصد اختلاف معنی‌دار نداشت ( $P > 0/05$ ) ولی با مقدار بدست آمده برای تیمار شاهد و ۸۰ درصد اختلاف معنی‌دار داشت ( $P < 0/05$ ).

بالاترین میزان میانگین تولید (بازماندگی × رشد) در تیمار ۴۰ درصد برابر با  $1009/8 \pm 20$  گرم بدست آمد که این مقدار با میزان تولید بدست آمده برای تیمارهای شاهد، ۲۰ و ۶۰ درصد افزایش بستر اختلاف معنی‌دار نداشت ( $P > 0/05$ ) ولی با مقدار بدست آمده برای تیمار ۸۰ درصد اختلاف معنی‌دار داشت ( $P < 0/05$ ). کمترین میزان تولید نیز مربوط به تیمار ۸۰ درصد با مقدار  $838/56 \pm 28/3$  گرم بود.

نتایج آنالیز واریانس یک طرفه (One-way ANOVA) نشان داد که افزایش بسترهای مصنوعی بر

میزان افزایش طول کاراپاس و بازماندگی بچه میگوهای سفید هندی (*P. indicus*) اثر معنی دار ندارد ( $P > 0/05$ ). میزان رشد طولی کاراپاس بچه میگوها در تیمارهای مختلف اختلاف چندانی نداشت که بالاترین میزان میانگین افزایش طول کاراپاس در تیمار ۴۰ درصد ( $13/12 \pm 0/48$  میلی متر) و کمترین میزان آن ( $12/6 \pm 0/12$  میلی متر) در تیمار ۸۰ درصد بدست آمد.


همچنین بالاترین میزان بازماندگی در تیمار شاهد با مقدار  $92/14 \pm 7/55$  درصد و پائین ترین میزان آن در تیمار ۸۰ درصد با میزان  $80/59 \pm 4/92$  درصد بود.

نمودار ۱ نیز نشان دهنده روند رشد وزنی بچه میگوی سفید هندی (*Penaeus indicus*) در طول دوره پرورش و در طی دوره های ۱۵ روزه زیست سنجی است. نتایج نشان داد که اثر افزایش بسترهای مصنوعی روی افزایش وزن بدن از روز شصتام پرورش به بعد دیده می شود. همانطور که در شکل مشخص است بچه میگوها در تیمار ۴۰ درصد افزایش بستر دارای بیشترین رشد و در تیمارهای ۲۰ و ۶۰ درصد افزایش بستر تقریباً رشد همسانی را داشتند.

جدول ۱: میانگین شاخص های رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (*Penaeus indicus*) در تیمارهای مختلف مورد آزمایش

| تیمار      | فاکتور | افزایش وزن بدن (گرم) | افزایش طول کاراپاس (میلی متر) | ضریب رشد ویژه (SGR) | ضریب تبدیل غذایی (FCR) | بازماندگی (درصد)  | تولید (رشد × بازماندگی) (گرم) |
|------------|--------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| شاهد (صفر) |        | $6/59 \pm 0/07b$     | $12/62 \pm 0/08a$             | $3/03 \pm 0/02a$    | $3/46 \pm 0/02b$       | $92/14 \pm 7/55a$ | $952/85 \pm 75/67ab$          |
| ۲۰ (درصد)  |        | $6/99 \pm 0/49ab$    | $12/99 \pm 0/62a$             | $3/21 \pm 0/12b$    | $3/27 \pm 0/22ab$      | $80/89 \pm 8/13a$ | $888/98 \pm 124/05ab$         |
| ۴۰ (درصد)  |        | $7/33 \pm 0/39a$     | $13/12 \pm 0/48a$             | $3/25 \pm 0/08b$    | $3/11 \pm 0/17a$       | $87/87 \pm 4/26a$ | $1009/8 \pm 20b$              |
| ۶۰ (درصد)  |        | $7/00 \pm 0/41ab$    | $12/90 \pm 0/41a$             | $3/19 \pm 0/06b$    | $3/26 \pm 0/19ab$      | $80/68 \pm 8/65a$ | $883/13 \pm 28/38ab$          |
| ۸۰ (درصد)  |        | $6/66 \pm 0/15b$     | $12/60 \pm 0/12a$             | $3/19 \pm 0/08b$    | $3/42 \pm 0/08b$       | $80/59 \pm 4/92a$ | $838/56 \pm 28/2a$            |

a, b, ab: داده های در یک ستون با حروف متفاوت دارای اختلاف معنی دار هستند ( $P < 0/05$ )



نمودار ۱: روند تغییرات رشد وزنی بچه میگوهای سفید هندی (*Penaeus indicus*) در تیمارهای مختلف در طی دوره پرورش و دوره‌های زیست سنجی

## بحث

نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که استقرار بسترهای مصنوعی بر برخی از شاخصهای رشد (افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و تولید) تاثیر معنی داری داشته و بر برخی شاخصهای دیگر شامل طول کاراپاس و بازماندگی اثر معنی دار نداشت.

در این زمینه بیشتر کارهای انجام شده در دنیا روی گونه *Macrobrachium rosenbergii* بوده است و اکثراً اثر افزایش سطح بستر را در افزایش تولید میگو تایید کرده‌اند، برای مثال Smith و Sandifer به نقل از Tidwell و همکاران (۱۹۹۸) گزارش کردند که افزایش بستر در مخازن نوازگاهی میگوی آب شیرین (*Macrobrachium rosenbergii*) سبب استفاده بهتر میگو از ستون آب و کاهش مرگ و میر شده است و یا در گزارشی دیگر که توسط Cohen و همکاران به نقل از Tidwell و همکاران (۱۹۹۸) ارائه

گردیده است افزایش بستر مصنوعی در استخرهای پرورش میگوی آب شیرین سبب افزایش ۱۴ درصدی تولید و افزایش ۱۳ درصدی اندازه میگو شده است. همچنین در تحقیق Tidwell و همکاران (۱۹۹۸) گزارش شده که افزایش بستر (به میزان ۲۰ درصد) بر شاخصهای وزن نهایی و محصول در هکتار میگوی آب شیرین (*Macrobrachium rosenbergii*) اثر معنی دار داشته است و باعث بهبود آنها گردید. همچنین ضریب تبدیل غذایی (FCR) با افزایش بستر مصنوعی بهبود یافته هر چند اختلاف معنی داری با تیمار بدون بستر نداشت. همچنین مشخص گردید افزایش بستر اثر معنی داری بر بازماندگی میگوی آب شیرین (*Macrobrachium rosenbergii*) نداشت و از لحاظ عددی میزان آن نیز کمتر شده است، که این نتایج به طور کلی قابل مقایسه با نتایج این تحقیق می باشند.

در مطالعه‌ای دیگر Tidwell و همکاران (۱۹۹۹) با ۸۰ درصد افزایش بستر وضعیت بهتری در مورد شاخصهای رشد و بقای میگوی آب شیرین نسبت به تیمار بدون افزایش بستر داشتند. هر چند افزایش بستر بر وزن نهایی و بازماندگی میگوها اثر معنی داری نداشت. ( $P > 0.05$ )

Eroldogan و Kumlu (۲۰۰۰) گزارش کردند که افزایش بستر مصنوعی بر رشد بچه میگوهای *Penaeus semisulcatus* تاثیر معنی داری نداشت. میزان افزایش وزن بدن در تیمارهای مختلف مشابه بود و افزایش بستر مصنوعی بر رشد میگوها اثر معنی داری نداشت ( $P > 0.05$ ). اما از نظر عددی میزان افزایش وزن بدن در تیمار با افزایش بستر مصنوعی بیشتر بود. همچنین بیشترین میزان بازماندگی در تیمار شاهد گزارش شد که از نظر شاخص بازماندگی نتایج مشابهی با نتایج این تحقیق دارد ولی از نظر رشد متفاوت می باشد.

Kumlu و همکاران (۲۰۰۱) گزارش کردند که افزایش بستر (به میزان ۳۳۰ درصد) هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی به طور معنی دار ( $P < 0.05$ ) سبب کاهش میزان بقا، طول کل، وزن بدن و بیوماس میگوی (*Metapenaeus monoceros*) نسبت به تیمار بدون افزایش بستر شده است، که متفاوت با نتیجه کلی این تحقیق می باشد. البته در تحقیق حاضر نیز افزایش بستر بیش از ۴۰ درصد مطلوب نبوده و حتی بین تیمار شاهد و تیمار ۸۰ درصد در بیشتر شاخص‌های رشد اختلاف معنی دار مشاهده نشد. این امر می تواند به این دلیل باشد که افزایش بستر تا میزان ۴۰ درصد باعث کم شدن استرس ناشی از



تراکم گردیده است و نتیجه این امر در افزایش وزن میگوها منعکس شده است ولی افزایش بیش از حد سطح بسترهای مصنوعی، شاید سبب مزاحمت در جابجایی میگو شده و همین امر باعث استرس و افت بازماندگی در میگو شد که با نتایج Kumlu و همکاران (۲۰۰۱) قابل مقایسه است.

با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق می‌توان این نتیجه کلی را بیان کرد که استقرار بسترهای مصنوعی روی رشد بچه میگوهای سفید هندی (*P. indicus*) تاثیر معنی‌دار داشته ولی بر شاخص بازماندگی و شاخص افزایش طول کاراپاس بچه میگوهای سفید هندی (*P. indicus*) تاثیر معنی‌دار نداشت.

افزایش بستر مصنوعی تا سطح ۴۰ درصد می‌تواند باعث بهبود برخی شاخص‌های رشد گردد. همچنین به نظر می‌رسد از نتایج این تحقیق بتوان به خصوص در مرحله نوزادگاهی استفاده نمود.

## تشکر و قدردانی

از مهندس اسمعیل پقه، مهندس سهند شمس اسحق و مهندس سعید کیوان شکوه که در کلیه مراحل انجام این تحقیق ما را یاری نمودند و همچنین از کارکنان و کارگران ایستگاه تحقیقات شیلات بندر امام خمینی (ره) به منظور کمک در کارهای کارگاهی و نیز از مسئولین و دست‌اندرکاران مؤسسه تحقیقات شیلات استان خوزستان که امکانات لازم جهت انجام این تحقیق را فراهم کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

## منابع

- آوخ کیسمی، م.، ۱۳۷۷. بررسی آلودگی ویبریوزیس در مزارع پرورش میگوی منطقه حله بوشهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس. ۸۸ صفحه.
- دندانی، ع.، ۱۳۷۸. مدیریت تغذیه در استخرهای پرورش میگو (غذادهی). معاونت تکثیر و پرورش آبزیان اداره آموزش و ترویج. ۶۸ صفحه.
- عابدیان، ع.، ۱۳۸۰. تأثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (*Penaeus indicus*, Milne Edwards, 1837) در شوریه‌های متفاوت آب. رساله دکترای رشته

شیلات - گرایش تکثیر و پرورش آبزیان. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور. دانشگاه تربیت مدرس. ۱۳۲ صفحه.

- Allan, G.L. and Maguire, G.B. , 1992.** Effects of pH and salinity on survival, growth and osmoregulation in *Penaeus monodon* Fabricius. *Aquaculture*. Vol. 107, pp.33-47.
- Bukhari, F.A. ; Jones, D.A. and Salama, A.L. , 1997.** Optimal salinity for the culture of *Penaeus indicus* from the Red Sea. *JKAU: Mar. Sci.*, Vol. 8, pp.137-147.
- Kumlu, M. and Eroldogan, O.T. , 2000.** Effects of temperature and substrate on growth and survival of *Penaeus semisulcatus* (Decapoda:penaeidae) Postlarvae. *Turk Journal of zool*. Vol.24, pp:337-341.
- Kumlu, M. ; Ebel, A.F. and Busch, R.L. , 2001.** The effects of salinity and added substrate on growth and survival of *Metapenaeus monoceros* (Decapoda: Penaeidae) postlarvae. *Aquaculture*. Vol. 196, pp.177-188.
- Santiago, C.B. , 1996.** Approches and design of fish nutrition experiments . Training Course on Fish Nutrition, SEAFDEC, Philippines, pp.1-7.
- Tacon, A.G.J. , 1990.** Standars methods for the nutrition and feeding of formed fish and shrimp. *Argent laboratories press*. pp.4-27.
- Tidwell, H. ; Coyle, D. and Schulmeister, G. , 1998.** Effects of added substrate on production and population chatacteristics of fresh water prawns *Macrobrachium rosenbergii* in ponds. *World aquaculture Society*. Vol. 29, pp.17-21.
- Tidwell. H. ; Shawn Coyle ; Weibel, C. and Jeef Evans , 1999.** Effects and intractions of stocking density and added substrate on production and population structure of freshwater prawn *macrobrachium rosenbergii*. *World Aquaculture Society*. Vol. 30, pp.174- 179.

## Effects of Added Artificial Substrate on the Growth and Survival of Juvenile Indian White Prawn

(*Penaeus indicus*)

Jahedi A.<sup>(1)</sup> ; Abedian M.<sup>(2)</sup> and Marammazi J.<sup>(3)</sup>

arashjahedi@yahoo.com

1,2 – Faculty of Marine Science and Natural Resources, Tarbiat Modarres University, P.O.Box: 14155-356 Noor, Iran

3- Khouzestan Fisheries Research Center, P.O.Box: 61335-416 Ahwaz, Iran

Received: April 2003

Accepted: December 2003

**Keywords:** Indian White Prawn, *Penaeus indicus*, Growth, Survival

### Abstract

The effects of added artificial substrates on juveniles of Indian white prawn (*Penaeus indicus*) were evaluated. Three replicate tanks were randomly assigned to receive added substrate to increase available surface 20, 40, 60 and 80 percent. Control tanks received no added substrate. Juveniles with mean weight of  $0.42 \pm 0.027$ g were raised for 90 days in 5000 lit concrete tanks filled with 4000 lit of water and stocked at a density of 30 ind/m<sup>2</sup>. Growth and survival of *P. indicus* juveniles were studied during the culture period.

Results showed that substrates significantly ( $P < 0.05$ ) affected growth performances of Indian white prawn. Highest specific growth rate (SGR) and highest yield obtained in tanks with 40% added substrate in compare with other groups. Carapace length gain and survival rate had not significantly differences ( $P > 0.05$ ).