

تأثیر تراکم ذخیره‌سازی میگوی سفید هندی

(بر شرایط بهداشتی استخرهای پرورشی *Penaeus indicus*)

در منطقه تیاب شمالی استان هرمزگان

سعید تمدنی جهرمی و بهروز قره‌موی

stamadoni@yahoo.com

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس صندوق پستی: ۱۵۹۷

تاریخ ورود: اردیبهشت ۱۳۸۲ تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۸۳

چکیده

با توجه به نقش پرورش میگو در اقتصاد منطقه جنوب کشور، بررسی عوامل بیماری‌زا همچون عوامل باکتریایی، قارچی و انگلی که نقش بسزایی در کاهش برداشت از استخرهای پرورشی ایفا می‌نمایند مهم و ضروری می‌باشد. در این بررسی اثر تراکمهای ذخیره‌سازی میگوی سفید هندی (*P. indicus*) بر شرایط بهداشتی استخرهای پرورشی در سیستم پرورش نیمه متراکم با ۴ تیمار هر کدام بترتیب با ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۵ عدد میگو در متربمربع مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج حاصل از بررسی بهداشتی میگو در تیمارهای مورد بررسی نشان داد که از نظر آلودگی باکتریایی ویبریو هاروی (*V. harveyi*) و از نظر آلودگی قارچی آسپرژیلوس نایجر (*A. niger*) و پنی سیلیوم (*Penicillium*) فراوانی بیشتری از سایر باکتریها و قارچها داشته و از نظر آلودگی انگلی نیز کوتیکول و آبشش میگو به انگل *Epistilis Zoothamnium* و *Epistilis* آلوده بودند.

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نیز اختلاف معنی‌داری بین افزایش آلودگی باکتریایی و انگلی را با افزایش تراکم میگو نشان داد ($p < 0.05$) و لیکن این اختلاف در استخرهای مختلف به جهت یکسان بودن رعایت شرایط بهداشتی معنی‌دار نبوده است ($p > 0.05$). همچنین رابطه خطی بین افزایش میزان آلودگی باکتریایی و انگلی به نسبت افزایش تراکم میگو در استخرهای مورد بررسی نیز وجود داشته است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که با افزایش تراکم ذخیره‌سازی میگوها، میزان آلودگی باکتریایی، قارچی و انگلی افزایش یافته است.

لغات کلیدی: میگوی سفید هندی، *Penaeus indicus*، شرایط بهداشتی، تیاب شمالی، استان هرمزگان

مقدمه

محدودیت صید از دریاها و اقیانوس‌ها باعث شده است تا تولید آبزیان ناشی از فعالیتهای آبزی پروری حجم قابل توجهی از سهم آبزیان در تأمین پروتئین حیوانی بشر را به خود اختصاص دهد. در این راستا پرورش میگویی دریایی در ایران نیز طی سالهای اخیر به سرعت توسعه یافته است. با نوجه به نوبات بودن صنعت تکثیر و پرورش میگو در ایران، مشکلات مختلفی کم و بیش در این زمینه وجود دارد و آگاهی بر راه حل‌های این مشکلات، رهگشایی پرورش و تولید بهتر خواهد بود. گسترش سطح زیر کشت در شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران در بیشتر موارد کار آسانی نیست و نیازمند هزینه‌های فراوانی می‌باشد ولی بالا بردن تولید در واحد سطح منطقی‌ترین و اصولی‌ترین کاری است که برای افزایش میزان تولیدات آبزی پروری می‌توان انجام داد. بوبیزه در کشور ما که در اغلب موارد میزان تولید در واحد سطح نسبت به سایر کشورهای پرورش‌دهنده میگو از حد متعارف کمتر است. برای افزایش تولید میزان میگو در واحد سطح بایستی استانداردهای لازم در عوامل تولید را شناسایی نمود و با بکارگیری آنها در مدیریت استخراج موجب افزایش تولید با هزینه کمتر گردید. یکی از عوامل مؤثر در میزان تولید، رعایت تراکم ذخیره سازی میگو در سیستم پرورش نیمه متراکم می‌باشد. سیستمهای پرورش میگو بطور کلی به سه روش گستردۀ، نیمه‌متراکم و متراکم تقسیم می‌شوند، اما با توجه به اینکه سهم عوامل تولید (تراکم بچه میگو، میزان تولید در واحد سطح، سهم غذای طبیعی و نوع غذای دستی مصرفی و...) متغیر است و از الگوی معینی پیروی نمی‌کند، مرزبندی این سیستم‌ها بطور دقیق امکان‌پذیر نیست. بعنوان مثال در کشور تایلند، تراکم ۶۰ عدد بچه میگو در مترمربع از ویژگیهای سیستم نیمه متراکم به حساب می‌آید، در حالیکه در برخی از کشورها چنین تراکمی معرف سیستم متراکم است (شکوری، ۱۳۷۶). تراکم ذخیره سازی میگو بسته به امکانات ساختمانی استخراجها و روش‌های هوادهی متغیر است. پرورش متراکم میگو با بکارگیری دانش زیست‌شناسی میگو و مدیریت افراد مجبور امکان‌پذیر است. هدف نهایی، افزایش تولید به روش متراکم می‌باشد ولی امروزه بسیاری از کشورها که روش‌های متراکم را در پرورش میگو اعمال می‌نمودند بدليل آنکه زیست محیطی و بیماریهای ناشی از آن برای استمرار تولید میگو دوباره به روش‌های نیمه متراکم و گستردۀ روی آوردند (Teng, 1988).

تمام مزارع پرورش میگو در ایران خصوصاً در منطقه هرمزگان از سیستم نیمه متراکم استفاده می‌کنند و تراکم بچه میگو در استخر از ۱۶ تا ۲۵ عدد در مترمربع در نوسان می‌باشد، در صورتیکه شیلات ایران تراکم ۲۲ عدد در مترمربع را توصیه نموده است. هدف پرورش میگو همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر، افزایش سرمایه و سودآوری است ولی اگر فکر کنیم هر چه تعداد بچه میگو را زیادتر کنیم سود

بیشتری داریم دچار اشتباہ اساسی شده‌ایم. در پاره‌ای موارد دیده شده است که افزایش تراکم بچه میگو منجر به ار بین رفتن کل جمعیت میگوها شده است (Chanratchakool *et al.*, 1995).

از طرف دیگر افزایش تراکم ذخیره‌ساری ماهی یا سخت‌پوستان (میگو) در استخرها معمولاً باعث مشکلاتی از قبیل بد شدن کیفیت آب و رسوبات کف استخر می‌گردد. افزایش تراکم ذخیره‌ساری، حساسیت میگوها نسبت به بیماری را افزایش داده و باعث فشار بر روی منبع غذایی طبیعی داخل استخرها و همچنین باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی شده و در نتیجه قیمت غذای تمام شده نیز بالا می‌رود (Geoffi & Maguire, 1992). در این مطالعه نقش افزایش تراکم ذخیره‌ساری میگو در بالابردن عوامل میکروبی، قارچی و انگلی در استخرهای پرورشی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش کار

این تحقیق در مزرعه پرورش میگوی آبزیان بندر تیاب از توابع شهرستان میناب که در ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی بندرب Abbas واقع است انجام شده است.

این مزرعه ۲۰ هکتاری بوده که دارای ۱۸ استخر می‌باشد. برای انجام این تحقیق ۱۲ باب استخر یک هکتاری انتخاب گردید. تراکم ذخیره‌ساری بصورت ۴ تیمار، ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۵ عدد میگو در متربیع و با سه تکرار بوده است (جدول ۱).

بست لاروهای تهیه شده در کیسه‌های پلاستیکی بسته‌بندی و بوسیله خودرو در مدت یک ساعت از مرکز تکثیر به مزرعه حمل گردیدند. هر کدام از کیسه‌ها قبل از بسته‌بندی با اکسیژن هوادهی شده، سپس درب آنها توسط نوار پلاستیکی بسته و درون بونولیت قرار داده شد. ذخیره‌ساری تمام استخرها در هنگام شب صورت گرفته و بطور میانگین زمان تطابق سازی در هنگام رهاسازی با توجه به شوری آب و دما برای هر استخر سه ساعت بوده است.

جهت بررسی آلودگی‌های انگلی و باکتریایی و قارچی میگوهای پرورشی در استخرها مورد آزمایش هر ماه از هر استخر ۵ تا ۱۰ عدد میگو به صورت تصادفی صید گردید. میگوهای صید شده درون سطلهای حاوی آب همان استخر قرار گرفته و بلافصله به مکان آزمایشگاه صحرایی منتقل و حداقل ۵ عدد میگوی زنده انتخاب و جهت بررسی آلودگی‌های انگلی، باکتریایی و قارچی مورد آزمایش قرار می‌گرفتند. برای بررسیهای انگلی از تمام اندامهای خارجی و داخلی میگو گسترش‌های مرطوب تهیه و در زیر میکروسکوپ مشاهده گردیدند (مجیدی، ۱۳۷۶).

برای بررسی آلودگی انگلی سطح کوتیکول از نظر، کدورت و وجود برخی از آلودگیها مانند بارناکل، زالو،

تعییر رنگ و دتراسیون در عضلات و جراحات موجود بر روی برانش مشاهده گردید. برای بررسی آلدگیهای باکتریایی از پوشش خارجی، اندامهای حرکتی، آبشنش و هپاتوبانکراس میگوهای مورد نظر در شرایط استریل، با آنس نمونهبرداری گردید و از همولنف آنها نیز توسط سرنگ انسولین نمونهبرداری به عمل آمده و بر روی محیطهای کشت مقدماتی نظیر TCBS^(۱) منتقل گردید. سپس پتربی دیشهای محیطهای کشت کدگذاری شده و به آزمایشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شدند. پس از طی انکوباسیون، نتیجه رشد یا عدم رشد باکتری در محیط کشت ثبت گردیده و سپس نسبت به خالص سازی کلنجها اقدام گردید. در مرحله بعد نمونه باکتریایی از نظر آزمایش اکسیداز بروزی و نمونههای اکسیداز منفی براساس کدهای مربوطه ثبت گردیده و به علت عدم ارزش بیماری زایی این نوع باکتریها برای میگو، از ادامه آزمایشات تشخیصی صرف نظر گردید. اما باکتریهایی که از اکسیداز مثبت بودند مورد آزمایشات دیگری بشرح ذیل قرار گرفتند. رشد در درجه حرارت ۳۷ درجه سانتیگراد، رشد در محیط کشت بدون نمک، رشد در محیط کشت حاوی ۳ درصد نمک، رشد در محیط کشت حاوی ۷ درصد نمک، رنگ پرگنه در محیط TCBS، رنگ تولیدی در محیط TSI، آزمایشات ONPG، ژلاتینی، سیمون سیترات، اوره آز، اندل، نیترات، اورنیتین، لیزین، اینوزتیول، سوربیتول، مانیتول، سوکروز، SH2 و تست حرکت (Michael et al., 1990).

در نهایت براساس جداول تشخیصی و کلیدهای شناسایی، جنس و اکثر گونههای باکتریایی تعیین گردیدند (تاجبخش، ۱۳۷۶؛ مجیدی نسب، ۱۳۷۷).

به منظور بررسی آلدگیهای قارچی نمونهبرداری از نواحی پوشش خارجی، اندامهای حرکتی، آبشنش، هپاتوبانکراس و همولنف در آزمایشگاه صحرایی مطابق روش مشرووحه که در قسمت بررسی آلدگیهای باکتریایی توضیح داده شد، انجام گرفت، با این تفاوت که بجای کشت خطی از کشت تلقیحی در محیط اسپوراد دکستروز آگار (SDA) حاوی کلرامفینل (۱/۱۰ گرم در لیتر محیط کشت) استفاده گردیده و سپس محیطهای کشت به آزمایشگاه قارچ‌شناسی دانشگاه تهران منتقل شدند. پس از طی دوره انکوباسیون، نتایج منفی ثبت گردیده و مابقی نمونهها که حاوی پرگنهای قارچی بودند مورد آزمایشات قارچ‌شناسی قرار گرفتند. در برخی موارد اقدام به اسلايد کالچر پرگنهای گردید و در نهایت براساس مشخصات پرگنه و خصوصیات میکروسکوپیک آنها طبق جداول تشخیصی و کلیدهای شناسایی، جنس و اکثر گونههای قارچی تعیین گردیدند.

1- Thiosolphate Citrate Bile Salt Sucrose Agar





جدول ۱: تراکم و تاریخ ذخیره‌سازی پست لاروهای میگو در استخراهای یک هكتاری مورد آزمایش

شماره تیمار	شماره استخ	تراکم ذخیره	تاریخ ذخیره	سازی
				سازی
	۸۰/۲/۲۶	۱۸.....	۱۵	T ₁
	۸۰/۲/۲۸	۱۸.....	۱۷	
	۸۰/۲/۲۳	۱۸.....	۱۸	
	۸۰/۳/۹	۲۰.....	۹	T ₂
	۸۰/۲/۲۷	۲۰.....	۱۱	
	۸۰/۳/۲۹	۲۰.....	۱۶	
	۸۰/۲/۲۳	۲۲.....	۱۲	T ₃
	۸۰/۲/۲۴	۲۲.....	۱۳	
	۸۰/۲/۲۵	۲۲.....	۱۴	
	۸۰/۳/۱۵	۲۵.....	۷	T ₄
	۸۰/۳/۸	۲۵.....	۸	
	۸۰/۳/۸	۲۵.....	۱۰	

از نرم‌افزار SPSS و Excel برای رسم نمودارهای مربوطه و از آزمون آنالیز Regresion، واریانس یکطرفه و آزمون Z برای بررسی‌های آماری استفاده گردید.

نتایج

نتایج حاصل از آزمایش ۴۸۰ عدد میگو از نظر آلودگی‌های باکتریایی، قارچی و انگلی در ۴ تیمار مورد نظر بصورت درصد آلودگی‌های باکتریایی، قارچی و انگلی بطور مجزا در نمودارهای ۱ تا ۱۲ نشان داده‌اند. باکتریهای شناسایی شده شامل ویبریو سپلندیدوس (*Vibrio splendidus*), ویبریو آلبینولیتیکوس (*Vibrio parahomolyticus*), ویبریوباراهمولیتیکوس (*Vibrio alginolyticus*) و جنس ویبریو (*Vibrio sp.*) بودند که در تمام تیمارها فراوانی باکتری جنس ویبریو و ویبریوهاروی از سایر گونه‌های باکتری بیشتر بوده است (نمودارهای ۱ تا ۴).



N= منطقه

V= گونه و بیریو

V.al = ویریو آجینتو لیتیکوس

V.h = ویریو هاروی


V.p = ویریو پاراهمولیتیکوس

V.spl = ویریو سپلیتیکوس


از نظر آводگی قارچی، تنوع بیشتری از نظر تعداد قارچ‌های جداسازی شده به چشم خورد. قارچ‌های

جداسازی شده شامل کلادوسپوریوم (*Cladosporium*), مخمر (*Yeast*), هایف استریل (*Sterilized*) (*Aspergillus spp.*), آسپرژیلوس (*Aspergillus fumigatus*) و آسپرژیلوس (*Aspergillus flavus*). آسپرژیلوس فومیگاتوس (*Aspergillus flavus*) و آسپرژیلوس


نایجر (*Aspergillus niger*) می‌باشد که در تمام تیمارها فراوانی قارچ‌های آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم بیشتر از سایر قارچ‌ها بوده است (نمودارهای ۵ تا ۸).




نمودار ۴: درصد آنودگی قارچی در میکوپاتی نیمار - آفته درخت مریع



نمودار ۵: درصد آنودگی قارچی در میکوپاتی نیمار - آفته درخت مریع



نمودار ۸: درصد آنودگی قارچی در میکوپاتی نیمار - آفته درخت مریع




نمودار ۲۲: درصد آنودگی قارچی در میکوپاتی نیمار - آفته درخت مریع


- N=منفن
- CL=کلستریلوروم
- Pen=پنیتیلیس
- Mu=مرکور
- A.spp=آسپرژیلوس
- A.fl=آسپرژیلوس فلاوریوس
- A.N=آسپرژیلوس نایجر

از نظر آنودگی انگلی در هر تیمار مورد بررسی تقریباً یکسان و انگلهای تکیاختهای مژه‌دار برعی تریش زوثامنیوم (*Zoothamnium*), اپیستیلیس (*Epistylis*) و ورتیسلا (*Vorticella*) شناسایی گردیدند. در هر


نیمار درصد آلودگی کوتیکول و آبشش با زئوتامنیوم بیشتر از تکیاخته‌های دیگر بوده است (نمودارهای ۹ تا ۱۲ و شکل ۱).




نمودار ۹: درصد آلودگی شکلی در میگوهای نیمار، آفتده در متر مربع





نمودار ۱۰: درصد آلودگی شکلی در میگوهای نیمار ۱۸ آفتده در متر مربع



نمودار ۱۲: درصد آلودگی شکلی در میگوهای نیمار ۲۵ آفتده در متر مربع





نمودار ۱۱: درصد آلودگی شکلی در میگوهای نیمار ۲۵ آفتده در متر مربع




شکل ۱: کلنی (بالا) و نمونه‌ای از انگل زنوتامنیوم (پائین) در بافت آبشش میگو (بزرگنمایی $\times 40$)

نمودار ۱۳ و ۱۴ رابطه رگرسیون خطی بین میانگین سرانه تعداد انگلها و باکتری (Vibrio) با تراکم میگوی سفید هندی را نشان می‌دهد.



نمودار ۱۳: رابطه بین میانگین سرانه تعداد انگل‌های زootامنیوم (الف) و اپیستلیس (ب) با تراکم‌های میگوی سفید هندی



نمودار ۱۴: رابطه بین میانگین سرانه تعداد باکتری ویبریو با تراکم میگوی سفید هندی

جدول ۲ و ۳ خلاصه نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه آلودگیهای انگلی و باکتریایی را از نظر میزان تراکم در استخیرهای مختلف را نشان می‌دهد.

جدول ۲: نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه آلودگیهای باکتریایی و انگلی با تراکم‌های مختلف

Sig	میزان F برای	Mean square	df	Sum of square	
تراکم‌های مختلف			(درجه آزادی)		
* ۰/۰۰	۳۰	۷۴	۳	۲۲۲	ویریو
* ۰/۰۲	۵	۳۰۷	۳	۹۲۲	ژئوتامینیوم
* ۰/۰۰	۳۳	۱۴۰۰	۳	۴۲۰۰	اپس تیلیس

*: وجود اختلاف معنی دار در سطح اطمینان ۹۵ درصد

جدول ۳: نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه آلودگیهای باکتریایی و انگلی در استخیرهای مختلف

Sig	میزان F برای	Mean square	df	Sum of square	
تراکم‌های مختلف			(درجه آزادی)		
۱/۰۰	۰	۰	۲	۰	ویریو
۰/۴۵	۱	۱۱۰	۲	۲۲۱	ژئوتامینیوم
۰/۸۳	۰	۹۰	۲	۱۸۱	اپس تیلیس

بحث

اگرچه حضور عوامل بیماری‌زا از تمام نقاط دنیا گزارش شده است ولی در کشورهای گوناگون عوامل آلوده کننده تا حدی با هم متفاوت می‌باشند. مثلاً در مورد باکتریها در مالزی گونه‌های *V. vibrio ordalii*, *V. vulnificus*, *V. splendidus* و *V. harveyi*، در فیلیپین *V. anguillarum* و *V. vulnificus*, در تایلند *V. anguillarum* و *V. alginolyticus*, در تایوان *V. parahaemolyticus*, *V. fluvialis* و *V. harveyi*, در ایران گونه‌های *V. harveyi*, *V. tubishii*, *V. damsela* و *V. anguillarum* را بعنوان گونه‌های غالب جدا کرده‌اند (صادق نبوی، ۱۳۷۸).

در بین قارچهایی که از نظر بیماری‌زایی در آبزیان از جمله میگوها، حائز اهمیت می‌باشند اکثرآ بد گوندهای لازنیدیوم، هالیفتوروس و ساپرولگینا بعنوان مهاجم در مراحل رشد لاروی و گوندهایی نظیر فوزاریوم سولانی و گوندهای مختلف فوزاریوم در مراحل بلوغ اشاره شده است (Sindermann & Lightner, 1988). در ایران علاوه بر قارچ فوزاریوم که بالقوه برای میگو می‌تواند بیماریزا باشد قارچهای سمی نظیر آسپرژیلوس فلاووس، آلتزاریا و پنی‌سیلیوم و فوزاریوم شناسایی شده‌اند (زرگر، ۱۳۷۶).

از بین تکیاخته‌های موجود Ruany & Pan در سال ۱۹۸۶ (برگرفته از: صالحی، ۱۳۸۱)، گزارش داده‌اند که مهمترین تکیاخته‌های بیماری‌زا برای لارو *P. merguiensis* و *P. monodon* در تایلند تکیاخته‌های پری‌تریش زئوتامنیوم و اپیستیلیس می‌باشند (صالحی، ۱۳۸۱). در بررسیهایی که در کشور چین صورت پذیرفته معمول ترین و جدی‌ترین تکیاخته‌های آلدوه کننده مؤثر بر میگو را زئوتامنیوم، اپیستیلیس و ورتیسلا معرفی کرده‌اند (Chen, 1992). در ایران در منطقه قفاس آبادان نیز تکیاخته‌های زئوتامنیوم، ورتیسلا و اپیستیلیس از میگوی سفید هندی و میگوی ببری سیاه‌گزارش شده‌اند (تمجیدی، ۱۳۷۶).

در بررسی حاضر نیز از با اهمیت‌ترین باکتریهای جداسازی و شناسایی شده در هر تیمار می‌توان باکتریهای ویبریوس‌پلندیدوس، ویبریوالرینولیتیکوس، ویبریوباراهمولیتیکوس، ویبریوهاروی و گونه دیگری از این جنس را نام برد که در تمام تیمارها فراوانی باکتری جنس ویبریو بخصوص ویبریوهاروی از سایر گونه‌های باکتریایی بیشتر بوده است و همچنین با افزایش تراکم ذخیره سازی (۲۵ و ۲۲ عدد میگو در مترمربع) فراوانی باکتریها نیز افزایش یافته است. در جنس ویبریو، متجاوز از بیست گونه وجود دارد که از نظر بیماری‌زایی گونه‌های پاراهمولیتیکوس، آنگوئیلاروم و آلرینولیتیکوس برای میگو حائز اهمیت می‌باشند (مجدى نسب، ۱۳۷۷). بیماریهای حاصل از این باکتریها هر چند بعنوان یک بیماری اولیه باکتریایی از میگوهای پرورشی به فراوانی گزارش شده‌اند ولی در حقیقت اکثرآ بعنوان یک بیماری ثانویه به دنبال عوامل نامساعد دیگر نظیر استرس‌های تغذیه‌ای، تراکم بالا، صدمات و آسیب‌ها و حتی آلدگی‌های باکتریایی دیگر رخ می‌دهند. به همین دلیل عده‌ای معتقدند که ویبریوها در حقیقت جزء عوامل بیماری‌زای فرucht طلب هستند (صدقی مرودستی، ۱۳۷۰ و مجدى نسب، ۱۳۷۷). بین میانگین سرانه تعداد انگل زئوتامنیوم با تراکم میگو رابطه معنی دار خطی وجود دارد یعنی با افزایش تراکم میگو در استخراجها میزان آلدگی انگلی به زئوتامنیوم نیز افزایش یافته و همین نتایج در مورد انگل اپیستیلیس (ب) نیز صادق است.

نمودار ۲ رابطه خطی بین تعداد باکتری *Vibrio* با افزایش تراکم میگو را نشان می‌دهد. مشاهده

می‌گردد که این رابطه نیز خطی بوده و با افزایش تراکم می‌گویی تعداد این باکتری نیز افزایش می‌باشد. مشاهدات مشابهی نیز توسط مجذی نسب در سال ۱۳۷۷ بر روی استخراهای پرورش می‌گویی انجام شده است.

از نظر آلودگی قارچی نیز تیمار T4 با تراکم ۲۵ عدد می‌گویی در متربريع نسبت به سایر تیمارها از فراوانی آلودگی بیشتری برخوردار بوده است. در میان گونه‌های قارچی جدا شده، قارچهای آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم در تمامی تیمارها از فراوانی بالاتری برخوردار بوده‌اند. از نظر آلودگی انگلی، تمامی تیمارهای مورد بررسی تقریباً یکسان بوده و تک یاخته‌های زئوتامنیوم و اپیستیلیس در همه آنها مشترک می‌باشد و در تمام تیمارها درصد آلودگی کوتیکول نسبت به آبشنش بیشتر می‌باشد و همچنین درصد آلودگی کوتیکول و آبشنش به انگل زئوتامنیوم بیشتر از اپیستیلیس بوده است.

این تک یاخته‌ها ممکن است بصورت مجموعه جانوری سطح‌زی آزاد باشند که بر روی اجسام موجود در حوضچه‌ها، دیواره‌ها و بستر مخازن و استخراهای پرورش بصورت همزیست سطحی روی سطح بدن می‌گویند. می‌گویی در تمام مراحل زندگی ممکن است به این تک یاخته‌ها آلوده شود. ظهور آلودگی‌ها با این عوامل فرصت طلب در مزارع پرورشی، ناشی از سوء مدیریت می‌باشد. این سوء مدیریت می‌تواند شامل گل آلودگی آب دریا، پایین بودن اکسیژن محلول آب و وجود مواد فاسد و بویژه باقی مانده‌های غذا در کف حوضچه‌ها و بستر استخراهای باشد. در صورتی که این آلودگی شدید باشد، باعث اختلال در تنفس و حرکت می‌گوید و در نهایت منجر به مرگ می‌گردد (مجذی نسب، ۱۳۷۷ و ۱۹۹۲). (Biswass,

در دوره پرورش، در هیچ یک از تیمارهای مورد بررسی هیچ گونه علائمی که حاکی از عفونت شدید باکتریایی، قارچی و انگلی باشد مشاهده نگردید. دلایل این امر را می‌توان در مدیریت آب استخراج خلاصه کرد. عدم وجود اختلاف معنی‌دار بین آلودگی‌های باکتریایی و انگلی به نسبت استخراهای مختلف نشان می‌دهد که وضعیت هر ۱۲ استخراج از لحاظ مدیریت بهداشت و آب یکسان بوده و استخراهای مورد بررسی تفاوت چندانی از لحاظ وضعیت بهداشتی خود نداشته‌اند ($p < 0.05$). مهمترین عامل در پیشگیری از بیماری‌های حاصل از این عوامل، تعویض روزانه آب استخراج است که این امر باعث خروج مواد غذایی و باقیمانده مدفعه (که محل تجمع عوامل باکتریایی، قارچی و انگلی است) می‌گردد (مجذی نسب، ۱۳۷۷).

با توجه به اینکه شوری آب ورودی استخراهای در منطقه تیاب شمالی نسبتاً بالا (بالاتر از ۴۰ ppt) می‌باشد، برای تنظیم شوری بایستی مرتبأ استخراهای مورد آبگیری و تعویض آب قرار گیرند. بدین ترتیب مهمترین عامل پیشگیری از شدت شیوع این عوامل که همان حفظ کیفیت آب و تعویض آن می‌باشد

رعايت مي گردد. همچنين بكارگيري آهک جهت تنظيم H استخرها احتمالاً می تواند در کاهش اين عوامل بيماري زا مؤثر باشد.

نتایج بدست آمده از اين بررسی نشان می دهد با افزایش تراکم ذخیره سازی، تنوع و فراوانی عوامل بیماری زای باکتریایی، قارچی و انگلی، هر چند به صورت اندک، افزایش یافته است. نتایج حاصل از آزمون واریانس یکطرفه، آلودگیهای باکتریایی و انگلی با تراکم‌های مختلف اختلاف معنی داری را بین آلودگی با تراکم‌های ایجاد شده نشان داد. این امر نشان‌گر افزایش مقدار آلودگی با افزایش میزان تراکم می‌باشد. در (۰/۰۵ < p) تراکم‌های بالا میزان غذاده‌ی نیز افزایش می‌باید و تمام غذای داده شده مورد مصرف میگوها قرار نمی‌گیرد و لذا در کف استخر جمع شده و باعث کاهش کیفیت آب و بوجود آمدن محیطی مناسب برای رشد و نمو عوامل بیماریزا می‌گردد که این خود یکی از مواردی است که باعث افزایش عوامل بیماریزا در تراکم‌های بالا می‌شود.

تشکر و قدردانی

از جناب آقای دکتر استکی ریاست محترم پژوهشکده اکولوزی خلیج فارس و دریای عمان، آقای مهندس زرشناس معاونت محترم پژوهشکده و همچنین آقای مهندس صالحی و مهندس روحانی به دلیل مساعدتهای لازم تشکر و قدردانی می‌گردد. از سرکار خانم آمنه شهیازی بخاطر تایپ این مقاله تشکر می‌گردد.

منابع

- تاجبخش، ح.، ۱۳۷۶. باکتری‌شناسی عمومی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم. ۷۹۳ صفحه.
- تمجیدی، ب.، ۱۳۷۶. بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه قفاس آبادان. مؤسسه تحقیقات شیلات. صفحات ۴۰ تا ۵۰.
- زرگر، ا.، ۱۳۷۶. جداسازی و شناسایی فلور قارچی میگوهای پرورشی ایران در مرحله تکثیر. پایان نامه دانشگاه تهران، شماره ۲۵۶۹.
- شکوری، م.، ۱۳۷۶. پرورش میگو، تراکم بیشتر با مدیریت بهتر. فصل نامه آبزی پرور، سال پنجم، زمستان ۱۳۷۶. صفحات ۱۰ تا ۱۲.
- صادق نبوی، س.م.، ۱۳۷۸. مطالعه آلودگیهای ویبریو در میگوهای پرورشی سفید هندی و بیری سبز.

صفحات ۷ تا ۱۰.

صالحی، ع.، ۱۳۸۱. تعیین بهترین تراکم ذخیره‌سازی میگوی سفید هندی در پرورش نیمه متراکم در استان هرمزگان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. ۵۷ صفحه.

صدیق مروستی، ع.، ۱۳۷۰. بیوتکنیک تکثیر و پرورش میگو و وضعیت آن در ایران. پایان‌نامه دکترای دامپزشکی، دانشگاه تهران، شماره ۱۹۶۸، ۲۲۸۵ تا ۲۸۷. صفحات ۲۰۸ صفحه.

مجدی نسب، ا.، ۱۳۷۷. بیماریهای میگوی پرورشی. انتشارات نوربخش. ۱۹۶۸، ۲۰۸ صفحه.

Biswass, K.P. , 1992. Prevention and control of fish and prawn disease. Narendra pubishiny House. 144 P.

Chanratchakool, P. ; Turnbull, F. ; Funge, S. Smith and Limsuwan, C. , 1995.
Health management in shrimp ponds. Aquatic Animal Health Research Institute Bangkok. 117 P.

Chen, Y.H. , 1992. Water quality requirements and management for marine shrimp culture. In Wyban, Journal of proceedings of the special session on shrimp farming world aquaculture. pp.30-41.

Geoffi, A. and Maguire, G.B. , 1992. Effects of stocking density on production of *Penaeus monodon fabricis* in model farming ponds. Aquaculture, 1992. Vol.107. pp.49-66.

Michael, B.N. ; Saram, H.D. and Singh, T. , 1990. Technical and economic aspects of shrimp farming, proceeding of the aquatch 90 conference Kuala Lampur, Malaysis, 11-14, June. 341 P.

Sindermann, C.J. and Lightner, D.V. , 1988. Disease diagnosis and control in North American marine aquaculture. Elsevier Science publishers second edition. Vol. 6, 127P.

Tesng, W.Y. , 1988. Shrimp mariculture second edition. Chien cheng publication. aquaculture in shrimp ponds. Aquatic Animal Health Institute Bangkok.

Effect of stocking density of Indian white shrimp (*Penaeus indicus*) on pond health indices in north Tiab (Hormuzgan Province)

Tamadoni Jahromi S. and Gharhavi, B.

Stamadoni@yahoo.com

Persian Gulf and Oman Sea Ecological Institute, P.O.Box: 1597

Bandar Abbas, Iran

Received: May 2003

Accepted: June 2004

Keywords: Stocking density, *P. indicus*, Persian Gulf, Iran

Abstract

Regarding to the role of shrimp culture on economy of southern region of Iran, investigation of disease agents seems to be very important.

In this study the effects of stocking density of *P. indicus* (4 treatments) on health indices of pond in semi-intensive system was investigated.

The investigated health indices were: bacterial, fungal and parasitic agents. The obtained data from this study indicated that the *vibrio spp.*, *Aspergillus sp.* and *Epystilis sp.* had the highest contamination rate of the pond. ANOVA showed significant difference between the increase of bacterial and parasitical contaminations respect to stocking density ($p<0.05$).

These differences are not significant among the ponds because the health indices were same for all of them ($p>0.05$).

The liner regression showed relationship between the increase of bacterial and parasitical contaminations respect to stocking density.

Also results showed that increasing of the shrimp density caused increase in all pathogen agents.