

## ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از آبهای شور منطقه گناباد

فرشته قاسمزاده<sup>(۱)</sup>; عباس متین فر<sup>(۲)</sup>; شهلا جمیلی<sup>(۳)</sup> و علیرضا زارعی<sup>(۴)</sup>

fghassemzadeh@science.um.ac.ir

۱ و ۴ - گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

۲ و ۳ - موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶

تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۸۳ تاریخ ورود: تیر ۱۳۸۲

### چکیده

در این تحقیق که در منطقه گناباد انجام شد، ذخایر آرتمیا در منطقه با نمونه برداریهای فیزیکی و شیمیایی آب و تعیین فراوانی فیتوپلانکتونهای مناسب جهت تنفسیه آرتمیا و نیز دانسته آرتمیا در طول یکسال (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱) تقریباً هر فصل دو بار و از دو ایستگاه مورد مطالعه قرار گرفت و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب اندازه گیری شد. نمونه برداری پلانکتونی توسط تور پلانکتونی با چشمکه ۲۰ میکرون صورت گرفت. در بررسیهای فیتوپلانکتونی بیشترین گونه شناسایی شده *Nitzschia* بود که در تمام طول سال وجود داشت. این جلبک از عمدۀ ترین غذایان مصرفی آرتمیا محسوب می شود. بطور کل در فصول بهار و اوایل پاییز فراوانی جمعیت فیتوپلانکتونها در منطقه بیشتر از فصول دیگر سال بود. تغییرات تراکم آرتمیا نیز در طول سال مشاهده گردید. با در نظر داشتن فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مؤثر در تولید (دما ۸,۵ تا ۲۲ درجه سانتیگراد، شوری آرتمیا ۷۰,۲۷ ppt، اکسیژن محلول ۲,۱ تا ۴,۶ میلی گرم در لیتر، pH ۹ تا ۷,۵) می بودن پتانسیل تولید آرتمیا بدلیل نفتر غذایی، مشخص گردید که مناسب ترین زمان و مکان جهت تولید آرتمیا از اوخر اردیبهشت ماه تا آبان ماه در ناحیه کالشور می باشد. بنابراین از نتایج این تحقیقات می تیزان در برنامه ریزی آبزی پروری آرتمیا استفاده کرده و جهت افزایش اشتغال، ارزآوری و توسعه روستایی مورد استفاده قرار داد.

**لغات کلیدی:** آرتمیا، فیتوپلانکتون، کال شور، گناباد، ایران

**مقدمه**

آرتمیا از شاخه بند پایان (Arthropoda)، رده سخت پوستان (Crustaceae)، زیر رده آبشنش پایان (Branchiopoda)، راسته بی زرهیان (Anostraca)، خانواده آرتمیده (Artemidae) و جنس آرتمیا (Artemia) می باشد. امروزه وجود آرتمیا از ۵ قاره جهان از ۵۰۰ منطقه جغرافیایی گزارش شده است. آرتمیا قادر است شوریهای بین ۴۰ تا ۲۲۰ ppt را تحمل کند (آق و نوری، ۱۳۷۴). این جانور بدلیل غنی بودن از نظر غذایی، برای انسان، دام و طیور، بخصوص آبزیان و بوبیله در مرحله لاروی مناسب می باشد (آق و نوری، ۱۳۷۶).

تمامی ذرات و موجودات ریز شناور و معلق در آب می توانند در چرخه فیلتراسیون آرتمیا وارد و در صورتی که قابل هضم باشند عنوان غذای آرتمیا محسوب شوند. آرتمیا ذرات غذایی از ۱ تا ۵۰ میکرون را بدون انتخاب فیلتر می کند و از راه دیگری به جز آسامیدن نمی تواند غذا کسب نماید. تغذیه غیرانتخابی ممکن است جانور را دچار مشکل کند و مواد غیر غذایی را نیز بخورد (Coutteau, 1992).

فیتوپلانکتونها، باکتریها و ریزه های غذایی، غذای با کیفیت برای آرتمیا هستند که در این میان جلیکها از بقیه مهمترند (Chatterjee & Mohanty, 1994; Sorgeloos et al., 1986; Browne & Browne, 1991; Lenz, 1991). از جمله فیتوپلانکتونهایی که برای آرتمیا دارای ارزش غذایی هستند می توان به میکرو جلبکها اشاره کرد که در این میان نیز گونه هایی مناسبند که براساس پتانسیل تولید توده ای، اندازه سلول و قابلیت هضم و سایر ویژگیها انتخاب شوند. از مهمترین غذای هایی، که واجد شرایط فوق هستند می توان به دیاتومه هایی مانند *Navicula* و *Nitzschia* و جلبک های سبز مانند *Dunaliella* و *Tetraselmis* اشاره کرد (Coutteau, 1992; Browne et al., 1991).

تولید آرتمیا در یک اکوسیستم به شرایط زنده و غیرزنده و نیز واکنشهای بیولوژیک آن اکوسیستم وابسته است. عبارت دیگر فراوانی آرتمیا به غذای در دسترس، دما و شوری وابسته می باشد (Sorgeloos, 1996).

از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر روی تولید آرتمیا دما (مطلوبترین دما ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد)، pH (مطلوبترین آن بین ۷/۸ تا ۸/۵)، اکسیژن محلول (اپتیمیم تولید در غلظت ۲/۵ میلی گرم در لیتر)، شوری، (مطلوبترین ۱۰۰ ppt تا ۱۵۰ ppt) را می توان نام برد و از مناسبترین غذای های نیز می توان به *Dunaliella* به عنوان غذای اصلی و برخی دیاتومه ها چون *Nitzschia* که در درجه دوم قرار دارند، اشاره نمود. (Dhont et al., 1993; Coutteau, 1992).

تولید بیوماس آرتمیا در غلظت اکسیژن کمتر از ۲ میلی گرم در لیتر کاهش می باید. بنابراین برای اپتیمیم تولید، حداقل غلظت ۲/۵ میلی گرم در لیتر مناسب است (Dhout et al., 1993). مواد مغذی شامل فسفر و ازت از مهمترین عوامل محدود کننده رشد فیتوپلانکتون محسوب می شوند. در دسترس بودن فسفات و نیترات، تنوع و فراوانی فیتوپلانکتونها در اکوسیستم های آبی (از جمله آبهای شور) را افزایش داده و شرایط مناسب برای تولید و پرورش آرتمیا را فراهم می نماید.

شناخت و بررسی شرایط زنده و غیرزنده در اکوسیستم‌های طبیعی می‌تواند در امر آبزی پروری اهمیت داشته و سبب کاهش چشمگیر در هزینه‌های تولید و پرورش آبزیان گردد. هدف از این تحقیق بررسی سیکل سالانه عوامل مؤثر در بررسی ذخایر تولید آرتمیا و ارتباط آنها با فیتوپلانکتونها به عنوان غذای اصلی آرتمیا و مقایسه این عوامل با شرایط اپیتمم تولید می‌باشد که در نهایت پس از مطالعات تکمیلی در خصوص تغذیه و شرایط تولید جلبک می‌توان به تولید و پرورش آرتمیا در این ناحیه اقدام نمود.

## مواد و روش کار

حوضه آبریز کویر نمک در غرب حوضه آبریز کویر مرکزی در شمال کویر لوت (طول جغرافیایی  $3^{\circ} ۵۷'$ ، عرض جغرافیایی  $۳۵^{\circ} ۳۶' - ۳۳^{\circ} ۲۵'$ ) واقع شده است. وسعت کل حوضه آبریز  $۳۸۶۱۰$  کیلومترمربع است (ولایتی و توسلی، ۱۳۷۰).

مهمترين عوامل در تعیین ايستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه وجود آرتمیا در آن منطقه، قابلیت دسترسی (با توجه به کویری بودن و نامن بودن منطقه) و نیز وجود آب دائم در طول سال در رودخانه بود.

بر این اساس دو ايستگاه مدنظر قرار گرفت که ايستگاه اول در  $۳۵$  کیلومتری مشهد - گناباد (کالشور) و ايستگاه دوم در منطقه یونسی واقع در محور مشهد - بجستان تعیین شد (شکل ۱).


نمونه‌برداری دوبار در هر فصل ( $۱۳۸۰ - ۱۳۸۱$ ) از هر دو ايستگاه جهت آزمایشهای فيزيکوشيميايی آب و نيز مطالعات پلانكتونی مورد نظر انجام گرفت (بدليل شرایط خاص منطقه امكان نمونه‌برداری در دفعات بيشتر وجود نداشت).

جهت نمونه‌برداری، گالن  $۴$  ليتری از آب پر شد و بعد از قرار دادن در جعبه آکاسيو حاوي يخ پس از  $۳$  ساعت به آزمایشگاه منتقل گردید. برای تعیین اکسیژن محلول از روش وینکلر پس از عمل تثبیت اکسیژن (در زمان نمونه‌برداری) استفاده شد. برای نمونه‌برداری پلانكتونی از روش فيلترکردن و با استفاده از تور پلانكتون‌گیری با چشمی  $۲۰$  ميكرون استفاده گردید، به اين ترتيب که حجم  $۱۰۰$  ليتر آب حاوي نمونه از تور پلانكتون‌گیری گذرانده شده و سپس فيلتر و تغليظ گردید. پس از رسیدن به حجم  $۲۵۰$  ميلی ليتر، نمونه‌ها با فرماليين  $۴$  درصد تثبیت و جهت شناسايی و شمارش به آزمایشگاه منتقل شدند. فاكتورهایی مانند شوري توسط شوري سنج، سختی آب به روش سنجش حجمی با EDTA، نيترات به روش فنل دی سولفونیک اسید، سولفیت به روش تیتراسیون یدومتری، سولفات به روش توژین رسوب خشک شده، فسفات به روش رنگ‌سنجدی (روش Deniges)، قلیانیت به روش استفاده از اندیکاتور متیل اورانژ، دمای آب با دماستج و دبی نیز با استفاده از فرمول

## ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از...

$Q = \sum_{i=1}^n V_i \times A_i$ ، (سرعت متوسط  $\times$  سطح مقطع = دبی)،  $V_m = K \times V \times S$  سنجش شد (خمیری و رومپ، ۱۳۷۷؛ Franson, 1980).


برای شناسایی و شمارش پلانکتونها ابتدا نمونه‌های جمع‌آوری شده به مدت ۴۸ ساعت در مکانی تشییت گردیدند تا رسوب گذاری کامل شود بعد از آن حجم نمونه را بدون کاهش پلانکتونها به حجم ثابتی رسانده و پس از اختلاط کامل به محفظه شمارش منتقل و بعد از ۲۴ ساعت که نمونه‌ها رسوب دادند با استفاده از کلیدهای شناسایی (Gerloff & Cholonky, ;Bellinger, 1992 ; Padmaja, 1972) با میکروسکوپ اینورت نمونه‌ها شناسایی و شمارش گردیدند. برای شناسایی و شمارش آرتمیا نیز از لام بگرو استفاده شد (Gerloff & Cholonky, 1970 ; APHA, 1992).




شکل ۱: موقعیت دو ایستگاه نمونه‌برداری

## نتایج

جداول ۱ و ۲ کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده طبقه، این تحقیق را در دو ایستگاه نشان می‌دهد. محدوده تغییرات pH در کالشور بین ۷/۵ تا ۹ و در یونسی بین ۷ تا ۸/۶ بود. محدوده شوری در یونسی بین ppt ۱۰۱.۸ تا ۳۲۲.۹ و کالشور ppt ۷۰ تا ۱۲۵.۸ بود. محدوده اکسیژن محلول نیز در یونسی بین ۱.۹ تا ۴۵ میلی‌گرم در لیتر و در کالشور ۲۱ تا ۴۶ میلی‌گرم در لیتر بدست آمد. محدوده تغییرات دما در کالشور بین ۸/۵ تا ۲۲ درجه سانتیگراد و در یونسی بین ۹/۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد بود. در کالشور دامنه تغییرات پارامترهای  $\text{NO}_3^-$  بین صفر تا ۸ میلی‌گرم در لیتر، فسفات بین ۰۰۰۳ تا ۰۰۸ میلی‌گرم در لیتر، سختی کلن بین ۱۰۲۰۰ تا ۲۰۸۵۰ میلی‌گرم در لیتر، دبی آب ۶ تا ۴۵ لیتر در ثانیه، EC بین ۸۱۲۷۳ تا ۲۳۵۵۶۵ mho/cm بدست آمد (نمودارهای ۱ تا ۷).




نمودار ۱: تغییرات شوری در دو ایستگاه کالشور و یونسی




نمودار ۲: تغییرات اکسیژن در دو ایستگاه کالشور و یونسی


## ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از...





نمودار ۳: تغییرات قلیانیت در دو ایستگاه کالشور و یونسی




نمودار ۴: تغییرات سختی کل در دو ایستگاه کالشور و یونسی

نمودار ۵: تغییرات CO<sub>2</sub> در دو ایستگاه کالشور و یونسی

نمودار ۶: تغییرات  $\text{CO}_3^{2-}$  در دو ایستگاه کالشور و یونسی


نمودار ۷: تغییرات فسفات در دو ایستگاه کالشور و یونسی

در یونسی دامنه تغییرات پارامترهای  $\text{NO}_3^{-}$  بین ۰/۰۲ تا ۰/۰۶ میلی گرم در لیتر، فسفات ۰/۰۰۱ تا ۰/۰۷ میلی گرم در لیتر، سختی کل ۱۴۰ تا ۶۹۹۵۰ mho/cm<sup>2</sup> و EC ۹۲۳۹۵ تا ۲۷۳۴۵۳ تا ۰/۰۲ میلی گرم در لیتر، سختی کل ۱۴۰ تا ۶۹۹۵۰ میلی گرم در لیتر، دبی آب صفر تا ۶/۲ لیتر در ثانیه و نسبت نیتروژن به فسفر در رشد جلبک‌ها اهمیت دارد که در این مطالعه در ایستگاه کالشور این نسبت صفر تا ۱۰۰ و در ایستگاه یونسی ۱۰ تا ۲۰۰ می‌باشد. نمودار ۸ تغییرات فیتوپلانکتونها را در دو ایستگاه نشان می‌دهد. نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده منجر به شناسایی ۵ خانواده از ۲ شاخه مختلف شد که شامل خانواده‌های Naviculaceae نامیده شده، Nitzschiaeae، Oscillatoriaceae، Chrysophytaeae، Cymbellaceae و خانواده‌های Anabaenaceae، Nostocaceae و Cyanophyceae از شاخه Anabaena بودند. تغییرات فیتوپلانکتونها در ایستگاه کالشور بین  $۱۲۰/۴ \times 10^6$  cell/m<sup>3</sup> و  $۰/۰۲ \times 10^6$  cell/m<sup>3</sup> در نوسان بود. در ایستگاه یونسی نیز این تغییرات در محدوده بین  $۴۵/۱۸ \times 10^6$  cell/m<sup>3</sup> و  $۱/۲ \times 10^6$  cell/m<sup>3</sup> قرار داشت.



نمودار ۸: تغییرات کلی فیتوپلانکتونها در دو ایستگاه کالشور و یونسی

نمودار ۹ فراوانی آرتمیا را در دو ایستگاه نشان می‌دهد. در کالشور از مهر ماه ۱۳۸۰ تا پایان بهار ۱۳۸۱ فراوانی آرتمیا بتدريج کمتر شده است و در اردیبهشت شاهد حضور سیست ۳۰۱ (۳۰۱ سیست در ۱۰۰ لیتر آب جمع‌آوری شده) در آب رودخانه بودیم و از آن به بعد مقدار آرتمیا به مقدار خیلی کم افزایش پیدا نمود. بطوریکه در مهر ماه ۱۳۸۱ به ۱۶۳ عدد آرتمیا در مترمکعب رسید. در یونسی جمعیت آرتمیا با یک افت شدید در طول دوره مطالعه مواجه بود بنحویکه از آذر ماه ۱۳۸۰ به بعد تعداد آن بتدريج کم شد و به ۲ عدد در مترمکعب در مهرماه ۱۳۸۱ رسید.



نمودار ۹: تغییرات تراکم آرتمیا در دو ایستگاه کالشور و یونسی

## جدول ۱: تغییرات عوامل فیزیکوشیمیایی و پلانکتونی در ایستگاه کالشور

مهر ماه ۱۳۸۱	شهریور ۱۳۸۱	تیر ماه ۱۳۸۱	اردیبهشت ۱۳۸۱	بهمن ماه ۱۳۸۰	آذر ماه ۱۳۸۰	مهر ماه ۱۳۸۰	$\text{HCO}_3^-$ (میلی گرم در لیتر)
۱۰۲۵	۱۶۱	۱۸۳	۶۱	۹۱۵	۹۴۵	۷۹۳	$\text{CO}_3^{2-}$ (میلی گرم در لیتر)
۰	۰	۰	۱۵	۰	۱۴	۱۲	$\text{NO}_2^{+}$ (میلی گرم در لیتر)
۴,۸۹	۵,۱	۵,۰۴	۳,۵۳	۵۴	۱,۲	۵,۴	$\text{NO}_3^-$ (میلی گرم در لیتر)
۰,۰۵	۰,۰۲	۰,۰۱	۰,۰۰۳	۰,۰۱	۰,۰۰۳	۰,۰۸	$\text{PO}_4^{3-}$ (میلی گرم در لیتر)
۸,۳	۷,۸	۷,۵	۹	۸,۱	۸,۵	۸,۱	pH
۱۲۵	۱۲۰	۱۵۰	۷۵	۷۵	۸۶	۸۵	قلیانیت
۱۵۵...	۱۶۱...	۲۲۵۰۶۵	۸۱۲۷۳	۱۱۹۴۴۵	۹۴۶۶۵	۱۴۱۳۹۰	$\text{Ec mho/cm}$
۲۰۸۵۰	۱۵۱۰۰	۱۳۰۰۰	۱۰۲۰۰	۱۲۸۵۳	۱۳۶۵۰	۱۶۶۴۰	سختی کل (میلی گرم در لیتر)
۱۰۵,۸	۱۱۶	۱۰۸,۰۴	۷۰,۲۷	۹۰,۹	۱۰۴	۱۱۳	PPT شوری
۳,۲	۲,۱	۲,۴	۴,۶	۳,۹	۳,۲۸	۲,۶۷	$\text{O}_2$ (میلی گرم در لیتر)
۲۰	۲۰	۲۲	۱۷	۱۰	۸,۵	۱۶	دمای آب (درجه سانتیگراد)
۱۰	۸	۶	۴۰	۲۶	۳۵	۱۸	دبي آب (لیتر در ثانیه)
۱۶۳	۱۲۰	۱۲۳	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۶	۳۷۲	$\text{No/m}^3$ فیتوپلانکتون $\text{cell/m}^3$
$۴۸,۶ \times 10^{-7}$	$۸,۰۲ \times 10^{-7}$	$۹,۸۶ \times 10^{-7}$	$۷,۰۸ \times 10^{-7}$	$۱۲,۴۶ \times 10^{-7}$	$۱۰,۶۰۴ \times 10^{-7}$	$۱۲۰,۴ \times 10^{-7}$	

جدول ۲: تغییرات فیزیکو شیمیایی و پلانکتونی در ایستگاه یونسی

زمان نمونه برداری	آذرماه	بهمن ماه	اردیبهشت ماه	تیر ماه	شهریور ماه	مهر ماه	۱۳۸۱
عامل اندازه گیری شده							
۶۹۰,۴	۴۷۳	۳۲۳,۳	۱۸۳	۹۸	۱۸۰	$\text{HCO}_3^-$	(میلی گرم در لیتر)
.	.	.	۹	۰	.	$\text{CO}_3^{2-}$	(میلی گرم در لیتر)
۲,۹۴	۲,۹	۵,۲	۳,۱	۴,۹	۱,۴	$\text{NO}_2^{2-}$	(میلی گرم در لیتر)
۰,۰۵	۰,۰۳	۰,۰۷	۰,۰۰۱	۰,۰۶	۰,۰۰۱	$\text{NO}_3^-$	(میلی گرم در لیتر)
۰,۷۰	۳۱۰	۲۶۵	۱۵۴	۱۰۸	۱۰۶	$\text{PO}_4^{3-}$	(میلی گرم در لیتر)
۷,۳	۷	۷,۳	۸,۲	۸	۸,۶	pH	
۰,۰۷	۰,۰۳	۰,۰۷	۰,۰۰۱	۰,۰۶	۰,۰۰۱	قلیانیت	
۲۰۰۲۹۰	۱۸۳۰۰	۲۷۳۴۵۴	۹۲۳۹۵	۱۱۲۹۷۶	۹۸۹۶۳	$\text{Ec mho/cm}$	
۶۹۹۵۰	۲۶۴۰۰	۱۰۷۰۰	۱۴۴۸۰	۱۴۰۹۰	۱۴۴۸۰	سختی کل	
۳۲۲,۹	۱۶۰	۱۳۵,۹	۱۰۱,۸	۱۰۶,۳	۱۱۶	PPT شوری	
۲,۱	۲,۲	۱,۹	۴,۳	۴,۵	۲,۹۷	$\text{O}_2$	(میلی گرم در لیتر)
۲۰	۲۸	۲۷	۲۲	۱۰	۹۵	دمای آب	
.	.	.	۶۲	۳۲	۱۲	دبي آب	(درجه سانتیگراد)
۲	۱۵	۵۰	۸۰	۹۰	۱۹۰	$\text{No/m}^3$ آرتمیا	
$1,2 \times 10^{-7}$	$1,4 \times 10^{-7}$	$7,26 \times 10^{-7}$	$40,78 \times 10^{-7}$	$10,05 \times 10^{-7}$	$45,18 \times 10^{-7}$	فیتوپلانکتون	
						$\text{cell/m}^3$	

## بحث

محدوده تغییرات pH کالشور بین ۷/۵ تا ۹ می‌باشد که در مقایسه با محدوده پیشنهادی Stappen (1996) ۷/۸ تا ۸/۵ و همچنین طبق نظر Dhont & Lavens (1993) مناسب به نظر می‌رسد. زیرا تغییرات pH آب با تغییرات  $\text{CO}_2$  در ارتباط است که یکی از شرایط زیستی آرتمیا است.

نسبت N/P رشد جلبکها را تعیین می‌کند. این نسبت در دریاچه Sonachi طبق گزارش Melack (1988) می‌تواند در مقادیر بالا با توده فیتوپلانکتونی همبستگی مشبّتی داشته باشد، که این مطلب در مورد ایستگاه کالشور در تحقیق حاضر نیز صادق است. این نسبت بستگی به شرایط محیطی منطقه دارد. مطالعات Chatlerjee & Mohanty (1994) بر روی دو دریاچه در هندوستان این نسبت را ۶ به ۱ و برای جلبک‌های سبز تراسالمیس، دونالیلا و دیاتومه‌های ناوی کولا و نیشیا نسبت ۱۰ به ۱ (1991) „Browne et al (1991)“ پیشنهاد شده است. با توجه به نسبت N/P در این تحقیق می‌توان جهت پرورش آرتمیا، با استفاده از آبهای کشاورزی در منطقه که درجه شوری بالای نیز دارند اقدام نمود. تنوع در میزان مواد غذایی در اکوسیستم آبهای شور مختلف وجود دارد که برخی از آنها از پتانسیل تولید بالای آرتمیا برخوردار است، از جمله می‌توان آبهای، شور در منطقه دریایی کریک، استرالیای جنوبی را نام برد که نسبت N به P در استخرهای با تولید بالای آرتمیا از یک بیشتر است (قاسم زاده، ۱۳۷۹).

در کالشور نوسانات شوری با دما، دبی آب و تبخیر همخوانی دارد بنحویکه در اردیبهشت ماه کمترین شوری (۷۰,۲۷ ppt) به دلیل بارش باران و افزایش دبی آب رودخانه (بالاترین دبی ۴۵ لیتر در ثانیه) می‌باشد. از تیرماه به بعد شوری به دلیل افزایش دما و افزایش مقدار تبخیر و کاهش بارندگی نسبت به ماههای قبل چار تغییر می‌شود و افزایش می‌یابد. در کالشور در تیر و شهریور ماه شوری بالاست لذا اکسیژن محلول کاهش نشان می‌دهد. علت افزایش در مهر ماه ۱۳۸۱ را می‌توان به وزش باد در سطح آب در منطقه نسبت داد. یکی دیگر از دلایل آنرا نیز می‌توان افزایش میزان فتوسنتر توسط جلبکها (شکوفایی جلبکی) ذکر نمود (Sorgeloos et al., 1986).

تغییرات  $\text{O}_2$  در ایستگاه یونسی نیز از شرایط اپتیمم برای آرتمیا کمتر است. لذا کاهش آرتمیا را علاوه بر شوری به این عامل نیز می‌توان نسبت داد (Dhont et al., 1993 و 1993). دمای آب در کالشور محدوده‌ای بین ۸,۵ تا ۲۲ درجه سانتیگراد و در یونسی ۹,۵ تا ۲۸ درجه سانتیگراد را داراست که با توجه به کویری بودن منطقه قابل توجیه است. برای نژاد پارتنوژنیکا دمای ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتیگراد مناسب گزارش شده است (Sorgeloos, 1996).

با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد آرتمیا در منطقه مورد مطالعه نژاد پارتنوژنیکا است که البته نیاز به مطالعات بیوسیستماتیک و سیتوژنتیک آن می‌باشد.

علت وجود دبی آب رودخانه برغم عدم بارندگی در ماههای گرم سال در کالشور به خاطر وجود زه‌آبهای دو دشت گیسور و جنگل می‌باشد. جداول ۱ و ۲ و ۳ و ۴ مقایسه‌ای را بین میزان مواد غذایی و

فاکتورهای مؤثر در تولید آرتمیا و تولید فیتوپلانکتون در منطقه کالشور و دیگر مناطق جهان را نشان می‌دهند.

جدول ۳: میزان مواد غذایی در اکوسیستم‌های آب شور

منبع	شرابط غذایی	مواد غذایی (میکروگرم در لیتر)			اکوسیستم‌های آب شور
		PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	شوری (ppt)	
Gasemzadeh <i>et al.</i> , 1996 a & b	Oligotrophic	۷-۲۲	۵-۱۹	۵۵۶-۲۱۳	Dry Creek (South Australia)
Rahman <i>et al.</i> , 1993	Oligotrophic	۱-۳	<۱-۳	۵۷-۲۹۷	Vedaranyam (India)
Rahman <i>et al.</i> , 1993	Oligotrophic	۱-۲	<۱-۲	۴۵-۳۲۶	Kelambakkam (India)
Jones <i>et al.</i> , 1981	Eutrophic	۸۰۰-۹۰۰	۱۰۰-۲۵۰	۳۷-۱۲۰	Dry Creek (South Australia)
Sammy, 1985	Oligotrophic	۳-۲۵	* ND		Dampier (Western Australia)
Javor, 1983a	Oligotrophic	*	۰-۱۲۴		Exportadora de sal (Mexico)
Javor, 1983b	Eutrophic	۰-۴	۰-۲۲۹۴		Western salt (California, USA)
Landry & Jaccard, 1982	Moderately eutrophic	۱-۶	۲۵-۸۸۶		Salin - de - Giraud (France)
Carplan, 1957	Eutrophic	۲۸-۱۲۳۵	۳۱-۲۰۱۵		Alviso (California, USA)

\* تعیین نشده است

جدول ۴: تغییرات عوامل غیر زنده در دریاچه دیدوانا هند از دسامبر ۱۹۸۳ تا ژانویه ۱۹۸۵

ماههای سال											عوامل فیزیکی و شیمیایی
D	N	O	S	A	M	F	J	D		Water temperature (درجه سانتیگراد)	
۱۷,۷	۱۸,۵	۲۲,۰	۲۴,۰	۲۵,۰	۲۰,۰	۱۵,۳	۱۳,۰	۱۶,۰	pH		
۸,۵	۸,۸	۸,۸	۹,۰	۸,۲	۸,۶	۸,۸	۹,۱	۹,۰	Dissolved oxygen (میلیگرم در لیتر)		
۱/۸۷	۴/۴۱	۷/۱۰	۴/۷۹	۰/۶۰	۰/۶۴	۰/۰۷	۰/۰۰	۷/۱۲	Salinity (ppt)		
۲۰۳,۰۰	۷۰,۴۵	۳۴,۷۷	۱۰,۷۳	۲۳۷,۵۶	۱۲۰,۴۰	۸۲,۶۵	۶۴,۸۵	۴۶,۳۰	CO <sub>3</sub> (ppm)		
۲۲۶,۷	۱۵۰,۵	۱۴۵,۵	۴۸,۵	۴۹۸,۵	۲۹۰,۵	۲۰۹,۵	۱۷۷,۰	۱۴۶,۰	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (ppm)		
۳۷۴,۲	۲۷۵,۰	۱۸۰,۰	۱۵۸,۵	۱۵۷۴,۰	۱۰۶۴,۵	۶۲۶,۰	۴۵۰,۰	۳۷۲,۵	Total alkalinity (ppm)		
۶۰۰,۹	۴۲۵,۰	۳۲۵,۰	۲۰۷,۰	۲۰۷۲,۵	۱۳۵۵,۰	۸۳۵,۵	۶۲۷,۰	۵۱۸,۵	Nitrate (µg/l)		
۱۱۹۰,۰	۱۵۲۰,۰	۵۷۱,۰	۷۷۰,۰	۸۷۴,۰	۹۷۵,۰	۴۷۰,۰	۴۲۰,۰	۲۲۰,۰	Nitrite (µg/l)		
۲,۶	۱,۹	۰,۸	۰,۵	۱۳,۰	۳,۳	۱,۱	۲,۲	۰,۰	Inorganic phosphate (µg/l)		
۲۲۷,۰	۱۲۳,۰	۳۴,۰	۱۹,۰	۴۱,۰	۸۸,۰	۶۴,۰	۷۴,۰	۰,۰	Silica (میلیگرم در لیتر)		
۲,۰۹	۳,۵۵	۱,۱۱	۰,۳۰	۴,۰۲	۱,۶۶	۰,۴۱	۰,۴۹	۰,۰			

تغییرات فیتوپلانکتون در این منطقه دارای دو شکوفایی پاییزه و بهاره است که با مطالعات انجام شده روی دریاچه‌های مناطق معتدل، از جمله دریاچه Didwana در هند مطابقت دارد (Lenz, 1987 ; Browne *et al.*, 1991 ; Bhargava *et al.*, 1987). در زمستان جمعیت فیتوپلانکتونی به علت کاهش دما و شدت کم تابش نور خورشید کاهش یافته و فراوانی آن کم می‌گردد (Smith, 1989). در تابستان این تراکم پائین آمده که علت آنرا به چرای آرتمیا (Grazing) می‌توان نسبت داد. این مطلب در دریاچه مونو و دریاچه نمک به اثبات رسیده است (Wetzel, 1983; Wetzel & Linkens, 2000) در پاییز سال ۱۳۸۱ به علت افزایش شوری، شکوفایی فیتوپلانکتون نسبت به سال ۱۳۸۰ کمتر شده است. در ایستگاه یونسی به دلیل افزایش شوری، شکوفایی در جلبک‌ها کمتر مشاهده می‌شود.

## ارزیابی پتانسیل تولید آرتمیا در بخشی از...

حداکثر جمعیت فیتوپلانکتون ( $Cell/m^3$ ) $(120,4 \times 10^6)$  در درجه شوری ppt ۱۱۳ در پائیز ۱۳۸۰ مشاهده شده است. از آن به بعد تا اواخر زمستان به دلیل کاهش دما (۸,۵ و ۱۰ درجه سانتیگراد) بترتیب در آذر و بهمن) تراکم فیتوپلانکتونها و همچنین آرتمیا کم شده است.

تراکم آرتمیا در آذر ماه و بهمن ماه کاهش یافته و تعداد آنها تقریباً ثابت می‌ماند. به عبارت دیگر در این ماهها برغم پایین بودن دما و کاهش فیتوپلانکتونها به عنوان منبع غذایی، آرتمیا این دو محدودیت را تحمل نموده ولی عملاً فاقد رشد و تکثیر می‌باشد چرا که تعداد آن ثابت است: بتدریج با رسیدن به انتهای زمستان تعداد آن‌ها نیز کمتر می‌شود.

در اوایل بهار با شکوفایی فیتوپلانکتونها و نوسانات شوری و اکسیژن محلول، سیست زایی آرتمیا شروع می‌شود. در اواخر بهار و تابستان، در اثر پدیده‌های چریدن آرتمیا (Grazing)، کمبود اکسیژن محلول (۲/۴ میلی گرم در لیتر) و نبود جریان مناسب آب، تراکم فیتوپلانکتونها کاهش یافته و لذا رشد و تراکم آرتمیا را نیز دچار رکود کرده است. از آنجایی که قدرت تغذیه و پاک‌کنندگی آرتمیا از میکروجلبک‌ها بسیار بالاست، لذا لازم است تا میکروجلبک زیادی در محیط وجود داشته باشد. مطالعات انجام شده در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد که عوامل و شرایط محیطی از اواخر فصل بهار تا نیمه پاییز جهت افزایش میکروجلبک فراهم است که در این شرایط تولید آرتمیا نیز زیاد می‌گردد.

بر این اساس جانورانی که خوب تغذیه می‌کنند روده‌های به هم پیوسته و پری داشته و بر عکس آرتمیاهایی که خوب تغذیه نمی‌کنند دارای شکمی نسبتاً خالی همراه با وقفه‌هایی در روده می‌باشند. که به دلیل کمبود مواد غذایی است (Coutteau, 1992). خالی بودن معده و روده در غالب نمونه‌های جمع‌آوری شده در طی دوره تحقیق نشان دهنده کمبود ذخایر غذایی آرتمیا در منطقه و تقریباً در همه فصول است.

با توجه به نظر (1996) Stappen که تراکم آرتمیا را به غذای در دسترس آن و دما و شوری وابسته می‌داند، بهترین زمان رشد از نظر عوامل غیرزنده محیطی اواخر بهار تا نیمه پاییز (محدوده دما بین ۱۷ تا ۲۲ درجه سانتیگراد و شوری ۱۰,۸ تا ۱۱,۶ ppt) است.

Bhargava *et al.*, 1987 در دریاچه Didvana هند نیز طی بررسیهایی، محدوده شوری ۹۰ تا ۱۵۰ ppt و دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد را برای رشد آرتمیا در این ناحیه، که تغییرات عوامل غیر زنده آن مشابه با منطقه مورد مطالعه می‌باشد، گزارش نموده‌اند.

در تابستان جهت افزایش دبی و تقویت ذخایر غذایی آرتمیا (فیتو پلانکتونها) با توجه به عدم بارندگی، بالا بودن قبایل و کمبود آب می‌توان با افزایش زه آبهای زمینهای اطراف رودخانه و افزایش دبی، ظرفیت تولید را در ایستگاه کالشور بالا بردا، بر آین اساس نیز باستی ذخایر آبی منطقه، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر آن بررسیهای زمین‌شناسی حاکی از آن است که نوع خاک منطقه رسی دانه‌ای بوده و pH آن حدود ۷/۵ می‌باشد. زمین‌شیپی در حدود ۱/۲ درصد به طرف رودخانه دارد لذا به علت وجود زیب زیاد عملاً استخراج‌سازی در کناره رودخانه از نظر اقتصادی مقرنون به صرفه نیست ولی می‌توان با ساخت استخرهایی در طول رودخانه در ایستگاه کالشور و افزایش دبی آب از طریق حفر چاه به تولید بیشتر اقدام نمود.

با استفاده از مطالعات مقدماتی، انجام شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که در ایستگاه کالشور گتاباد به دلیل زه آبهای دشت‌های اطراف، دبی آب در شرایط معمولی نسبتاً خوب است. در این ایستگاه فاکتورهای مؤثر در تولید آرتمیا (شوری، دما، O<sub>2</sub> و pH) در شش ماهه گرم سال از ابتدا نسبی برخوردارند. در این ماهها چرخش مواد در رودخانه به کندی صورت می‌گیرد لذا برای افزایش تولید آرتمیا می‌توان، با ساخت استخرهایی در طول رودخانه و حفر چاه جهت افزایش دبی آب و غنی‌سازی محیط و در نهایت افزایش زی توده پلانکتونی، شرایط مناسبی برای تولید آرتمیا در منطقه فراهم آورد. برای غنی‌سازی آبهای در صورت نیاز نیز می‌توان از کودهای آلی یا شیمیایی استفاده نمود. در این میان کود مرغی حاوی بیست درصد پروتئین است که می‌تواند به عنوان یک منبع غذایی برای آرتمیا محسوب گردد. استفاده از این کود به علت بالا بودن فسفر و کمبود نیتروژن آن، باعث تولید جلبکهای رشته‌ای می‌شود، که بزرگتر از آن هستند که توسط آرتمیا مصرف شوند، لذا به این نکته نیز باستی توجه گردد. از سایر ترکیبات نیز می‌توان استفاده کرد، که نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه می‌باشد تا بتوان کود مناسبی را انتخاب کرد که به عنوان ماده غذایی برای سیستم مفید بوده و موجب تغییرات نامناسب اکولوژیک نگردد.

## تشکر و قدردانی

از زحمات خانم دکتر نجات خواه ریاست محترم دانشکده علوم و فنون دریایی، آقای مهندس حافظیه به پاس راهنماییها یشان، آقایان مهندس نکوئی و مهندس کوشش مسئولین محترم امور تغذیه و آزمایشگاه شیلات خراسان، خانم مهندس لشکر بلوکی و خانم تهامی و کلیه پرسنل پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (ساری) و دیگر عزیزانی که در ماجرا این پژوهه کمک نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌نماییم.

## منابع

- آق، ن. و نوری، ف. ، ۱۳۷۴. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی مورفولوژی، تولید مثل و مراحل مختلف رشد آرتمیا دریاچه ارومیه، معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه، ۱۲۰ صفحه.
- آق، ن. و نوری، ف. ، ۱۳۷۶. اکولوژی و پراکنش جهانی آرتمیا. گزارش زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه، ۷۵ صفحه.
- خمیری، ف.ا و رومپ، اچ، اچ. ، ۱۳۷۷. روش‌های آزمایش آب و فاضلاب و خاک، انتشارات دانشکده مازندران، ساری، ۱۳۳ صفحه.
- قاسمزاده، ف. ، ۱۳۷۹. کاربرد مطالعات بیولوژیک در تولید نمک صنعتی، مثالی از دریاچه‌های آب شور در استرالیای جنوبی. مجله علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، سری ۲، شماره ۱ صفحات ۲۱ تا ۳۲.
- ولایتی، س.ا و توسلی، س. ، ۱۳۷۰. منابع و مسائل آب استان خراسان. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۲۷ صفحه.
- APHA , 1992.** Standard methods for the examination of water and waste water. American Public Health Association, Washington, D.C, USA. 18th edition .874 P.
- Bellinger, E.G. , 1992.** A key to common Algae. Fourth edition. The Institution of Water and Environmental Management, 15 John Street, London, UK. WCIN 2EB. 137P.
- Bhargava, S.C.; Jakher, G.R. ; Saxena, M.M. and Sinha, R.K. , 1987.** Ecology of Artemia in Didwana Salt lake (India). In: Artemia research and its applications. Vol. 3, P. Sorgeloos; D.A. Bengetson; W. Decleir and E. Jaspers (Eds). Universa Press. Wetteren, Belgium.

- Browne. R.P. ; Sorgeloos, P. and Trotman, N.A. , 1991.** Semi-intensive culturing in Fertilized ponds. *In:* Browne, Sorgeloos and Trotman (eds). Artemia Biology, CRC press. BocaRatan. Ann Arbor, Boston, USA. pp.287-313.
- Carplan, L.H. , 1957.** Hydrobiology of Alvisco salt ponds, Ecology. Vol. 38, pp.375-395.
- Chatterjee. A.K. and Mohanty, R.C. , 1994.** Biological characteristics of two fresh water lakes in puri, District of Orissa Utkal university Press. pp.275-280.
- Coutteau, P. , 1992.** Microalgal. Laboratory manual of Aquaculture & Artemia Reference Center, University of Gent. Belgium. pp.7-48.
- Dhont, J.; Levens, P. and Sorgeloos, P. , 1993.** Preparation and use of Artemia as food for shrimp and prawn larvae, *In:* CRC Handbook of Mariculture. Crustacean Aquaculture Vol 1. 2nd Edition, CRC Press. BocaRatan. USA.
- Dhont, J. and Levens, P. , 1993.** Tank Production and use of on grown Artemia, Laboratory of aquaculture and relevance center university of Gent, Beligum. pp.164-194.
- Franson, M.A. , 1980.** Standard methods of examination of water and waste water, APLTA, Washington D.C., USA. 774P.
- Gerloff, J. and Chalonky, B.J. , 1970.** Diatomaceae II. Fredrich Hustedt Greenbook. 835P.
- Ghassemzadeh, F.; Williams, W.D. and Geddes, M.C. , 1996a.** The determination of nitrate in highly salinewater (abstract), INTECOL V International Wetlands Conference 22-28 September 1996, Perth, Westen Australia, Programme and Abstract, 129P.
- Ghassemzadeh, F.; Williams, W.D. and Geddes, M.C. , 1996b.** Physico-chemical factor in a solar saltfield at Dry Creek, Adelaide – with special reference to plant nutrient. Australia, Programme and Abstract, 63P.
- Javor, B.J. , 1983a.** Nutrients and ecology of the western salt and Expotadora de saltern brines. *In:* B.C. Shreiber and H. L. Harner (Eds), Sixth international symposium on salt, pp.195-203.

- Javor, B.J. , 1983b. Planktonic crop and nutrients in a saltern ecosystems. Limnology and Oceanography, Vol. 28, pp.153-159.
- Jones, A.G.; Ewing, C.M. and Melvine, M.V. , 1981. Biotechnology of solar saltfields. Hydrobiologia, Vol. 82, pp.391-406.
- Landry, J.C. and Jaccard, J. , 1982. Chimie des eaux libres dans le marais salant de salin - de - Giraud (sub de la France). Geologie Mediterraneene, Vol. 9, pp.3269-348.
- Lenz, P.H. , 1987. Ecological studies on Artemia, In: P. Sorgeloos. D. A. Bengtson, W. Decler and Jasper. Artemia research and its application Vol 3. Universa press, wetteren. Belgium. pp.5-18.
- Lenz, P.H. and Browne, R.A. , 1991. Ecology of Artemia. In: R.A. Browne; P. Sorgeloos and C.N.A. Troman (Eds) Artemia Biology. CRC. Press. USA, pp.237-253.
- Melack, J.M. , 1988. Primary producer dynamics associated with evaporative concentration in a shallow, equatorial soda lake, In: Hydrobiologia, Salin lakes, Vol. 154, pp.1-14.
- Padmaja, T.D. , 1972. Studies on coccoid blue green algae. In: T.V. Desikachary (Ed.), Taxonomy and biology of blue Green Algae. University of Madras Press, pp.75-127.
- Rahaman, A.A.; Sosamma-Esse and Ambikacevi, M. , 1993. Biological management of Indian solar saltworks. In: H. Kakihana; H.R. Hardy Hr., and T. Hoshi (Eds), Seventh Symposium on salt, Volume I. Elsevier, Amsterdam, pp.633-643.
- Sammy, N. , 1985. Biological systems in northwest Australian solar salt fields. In: B.C. Shreiber and H.L. Harner (Eds), Sixth Symposium on salt, Volume I. The salt Institute, Alexandria, Virginia. pp.207-215.
- Smith, R.L. , 1989. Ecology and field biology. Havever and Row. New York, USA. 849 P.
- Sorgeloos, P. , 1996. Use of Brine shrimp *Artemia spp.* in larval crustacean nutrition, a review, Labrotary of aquaculture and Artemia center, University of Ghent, Rozier 47 , B - 9000 Ghent, Belgium.

- Sorgeloos, P.; Lavns, P.; Leger, P.; Tackaret, W. and Versichele, D. , 1986.** Manual for the culture and use of Brine shrimp Artemian in aquaculture, FAO Publication. Faculty of Agriculture, State University of Ghent, Belgium.
- Stappen, J.V. , 1996.** Artemia. Biology and ecology, *In: P. Lavens ; P. Sorgeloos. Manual on the production and use of live food for aquaculture laboratory of aquaculture & Artemia Refrence Center. University of Ghent, Ghent Belgium.*
- Wetzel, R.G., 1983.** Limonology, W.B. Saunders company, London, UK. 797 P.
- Wetzel, R.G. and Likens, G.E. , 2000.** Limnologycal Analyses. Springer-Verlag, New York, USA. 391 P.

## Studying of *Artemia sp.* production in Gonabad salt-waters,

### Kavir-e-Namak Basin, eastern Iran

Ghassemzadeh F.<sup>(1)</sup>; Matinfar, A.<sup>(2)</sup>; Jamili, SH<sup>(3)</sup> and  
Zarei A.R.<sup>(4)</sup>

fghassemzadeh@science.um.ac.ir

1,4- Biology Department, Faculty of Science, University of Ferdowsi,  
Mashhad

2,3- Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box:14155-6116  
Tehran, Iran

Received: July 2003      Accepted: November 2004

**Keywords:** Artemia, Saline water, Abundance, Kaleshor, Iran

### Abstract

A preliminary stock assessment of *Artemia sp.* has been carried out in Gonabad salt-waters, situated in the Kavir-e-Namak Basin of eastern Iran for the first time. We conducted seasonal analysis of physico-chemical and biological properties of salt-waters for two stations in the study area over the year 2002. Hand-held plankton net used with a mesh size of 20mm to collect phytoplankton samples. We identified five families of phytoplankton in the salt-waters of the area. These were Nitzchiaceae, Naviculaceae, Cymbellaceae, Oscillatoriaceae and Nostocaceae. Phytoplankton species from family Nitzchiaceae were the most abundant, present in the waters year-round and comprised the main food item for *Artemia sp.* in the region.

Phytoplankton abundance was highest during spring and earlier autumn and *Artemia sp.* showed a fluctuation in their density over the year, increasing gradually from spring to winter in one station and from spring to autumn in another. Considering the optimal physico-chemical and biological properties for *Artemia sp.* production and development, we concluded that the best time period for *Artemia sp.* production is May to November in Kaleshor area.