

القای آنژیم سیتوکروم P4501A1 با بtanفتوFلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی (*Huso huso*)

کتابیون کریمزاده^(۱); علی مصطفائی^(۲); عباس اسماعیلی ساری^(۳)؛

محمد پورکاظمی^(۴) و عسکر زحمتکش^(۵)

karimzadehkathy@yahoo.com

۱- مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان، رشت
صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۲۸۳۶

۲- مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۳- دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
صندوق پستی: ۴۶۴۱۴-۳۵۶

۴- انسستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت صندوق پستی: ۴۱۶۲۵-۲۴۶۳
تاریخ ورود: فروردین ۱۳۸۴ تاریخ پذیرش: اردیبهشت ۱۳۸۴

چکیده

P4501A1 مهترین ایزوآنژیم سیستم مونوآکسیژنازی در ماهی است که توسط ترکیبات آروماتیک چند حلقه‌ای القای می‌شود. در پژوهش حاضر تأثیر ماده بtanفتوFلاون در القای این ایزوآنژیم در فیل ماهی بررسی گردید و برخی از خواص کینتیکی این ایزوآنژیم مورد مطالعه قرار گرفت. ماده بtanفتوFلاون به صورت داخل صفاقی به ماهیان تزریق گردید. میزان فعالیت آنژیم سیتوکروم P4501A1 از روی واکنش دی اتیلاسیون سوبسترا ۷- آنوكسی رزروفین (EROD) با روش فلورومتری و میزان نسبی پروتئین‌های القا شده با روش الکتروفورز در ژل پلیاکریل آمید در حضور سدیم دودسیل سولفات (SDS-PAGE) تعیین گردید. نتایج نشان داد که نرخ واکنش در فراکسیون میکروزومی ماهیان تیمار شده ۱۵ تا ۲۶ برابر ماهیان شاهد در شرایط مشابه آزمایش است. اپتیم فعالیت این آنژیم در دامنه دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد قرار می‌گیرد و فعالیت آنژیم در غلظت ۱/۵۳ میکرومولار از سوبسترا و غلظت ۱۸۰ میکروگرم پروتئین میکروزومی به حد اکثر می‌رسد. الگوی SDS-PAGE فراکسیون میکروزومی در ماهیان تیمار شده حضور پروتئینی را با وزن مولکولی حدود 58 ± 1 کیلو Dalton نشان می‌دهد که همان آنژیم سیتوکروم P4501A1 می‌باشد. بنابراین اثر القایی بtanفتوFلاون موجب القای ژن سیتوکروم P4501A1 و افزایش بیوسترن این آنژیم می‌گردد که بصورت افزایش در نرخ فعالیت آنژیم در واکنش EROD نمایانگر می‌شود.

لغات کلیدی: آنژیم سیتوکروم، AI-P4501A1، بtanفتوFلاون، فیل ماهی، *Huso huso*.

مقدمه

با پیشرفت و گسترش صنعت و تکنولوژی، اکوسیستم‌های آبی بطور فزاینده‌ای در معرض ترکیبات شیمیائی مختلفی مانند دی‌فنیل‌های چند کلره (PCBs)، هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقوی (PAHs)، دی‌اکسین‌ها و ترکیبات الکیلتین (Alkyltin) قرار گرفته‌اند. این ترکیبات در سلامت انسان و آبزیان اثرات جبران‌ناپذیری دارند (Addison, 1996 ; Sen & Arinc, 1998). هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقوی از آلاینده‌های آبی هستند که از پالایشگاه‌های نفت، صنایع تولید انرژی و حمل و نقل دریائی وارد اکوسیستم‌های آبی می‌شوند. ۳- متیل کلانترن (3MC) و بتانفتوفلاون (BNF) از هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقوی هستند که اثرات سرطان‌زاوی و جهش‌زاوی آنها شناخته شده است. این ترکیبات قادرند آنزیم سیتوکروم P4501A1 را که مهمترین ایزوآنزیم سیستم سیتوکروم P450 است، در ماهیان همانند پستانداران القا نمایند (Payen *et al.*, 2001 ; Sarasquete & Senger, 2001) (James *et al.*, 1979 ; 1987).

سیتوکروم P450 متعلق به خانواده بزرگی از آنزیم‌های اکسیژنаз چند عملکردی می‌باشد که مرحله اول تغییر شکل بیوتراسفورماسیون زنوبیوتیک‌ها را بعهده دارند (Nebert & Gonzalez, 1987 ; Ioannidis & Parks, 1990).

تحقیقات انجام گرفته طی ۲۰ سال گذشته، القای سیستم سیتوکروم P450 در ماهیان را نشان می‌دهد. نتایج بدست آمده، در ارزیابی منطقه مواجه شده با آلودگی و اثرات حاصله از آن اهمیت دارد و نقش مهمی در مدیریت محیط‌های زیست دریایی ایفا می‌کند. بنابراین اندازه‌گیری اکسیژنازهای چند عملکردی می‌تواند بعنوان ابزاری مهم در نظارت پیوسته آلودگی‌های شیمیایی بکار رود (& Siroska, 2004). القاپذیری این سیستم در پاسخ به تیمار با ترکیبات PCBs و PAHs در گونه‌های مختلفی از ماهیها نظیر *Rutilus rutilus* و *Sparus aurata*, *Gadus morhua* (Drastichova, 2004). این تغییرات شده است (Arinc & Sen, 1993, 1994 ; Goksoyr, 1985 ; Monod *et al.*, 1987).

ماهیان خاویاری از گونه‌های حساس و با ارزش از لحاظ اقتصادی بشمار می‌روند که ذخایر طبیعی آنها امروزه در معرض خطر جدی با آلاینده‌های شیمیایی قرار گرفته است (Kajiwara *et al.*, 2003).

لذا بررسی مکانیسم‌های متابولیسم سموم در این ماهیان از جایگاه خاصی برخوردار است.

اگر چه اندازه‌گیری مقادیر آلاینده‌ها با روشهای آنالیز دستگاهی از حساسیت زیادی برخوردارند اما به دلیل پر هزینه بودن این قبیل آنالیزها از یکطرف و در اختیار قرار نداشتن اطلاعات کافی پیرامون تاثیرات بالقوه آلاینده‌ها بر موجودات آبزی از طرف دیگر، اخیراً استفاده از سنجش‌های زیستی متداول گردیده است. در این میان بیومارکرها از مهمترین ابزار شناخته شده در سنجش‌های زیستی محسوب می‌شوند که کاربرد وسیعی نیز پیدا نموده‌اند. بنابراین در این پژوهش نرخ تاثیرماده بتانفتوفلاون بر فعالیت آنزیم سیتوکروم P4501A1 (بعنوان بیومارک) فیل ماهی دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش کار

۲۰ عدد فیل ماهی (*Huso huso*) در محدوده وزنی ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم و سن حدود دو سال از مجتمع تکثیر و پرورش شهید بهشتی سد سنگر واقع در استان گیلان در پائیز سال ۱۳۸۱ تأمین گردید.

کلیه آزمایش‌های شیمیایی به جز تیمار ماهیان در مرکز تحقیقات بیولوژی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد. مواد شیمیایی مورد استفاده از شرکت‌های مرک، سیگما، فارماسیا و بیوسنس تهیه گردیدند.

۲۰ عدد ماهی به ۴ گروه ۵ تایی (یک گروه شاهد و سه گروه آزمون) تقسیم گردیدند و در ونیرو نگهداری شدند. بتانفتوفلاون (سیگما) در غلظت ۳۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر در روغن ذرت آماده شد. به ازای هر کیلوگرم وزن ماهی، ۳۵ میلی‌گرم از این ماده بصورت درون صفاقی تزریق گردید. به ۳ گروه آزمون بر ترتیب ۳۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن ماهی طی یک روز، ۷۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن ماهی طی دو روز و ۱۰۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن ماهی طی سه روز از بتانفتوفلاون در روغن ذرت تزریق شد. گروه شاهد نیز همان حجم روغن ذرت را دریافت نمودند (Stegeman *et al.*, 1979). تیمار ماهیان در محل مجتمع تکثیر و پرورش شهید بهشتی انجام گرفت. پس از ۴۸ ساعت از آخرین تزریق، کبد ماهیان خارج گردید و توسط ازت مایع به آزمایشگاه منتقل و در همان دما تا زمان آزمایش نگهداری شد. بافت منجمد شده در بافر فسفات‌سدیم ۱/۰ مولار با pH برابر ۴/۰ حاوی کلریدپتاسیم ۱/۵ درصد (حجمی/ وزنی)، فنیل متیل سولفونیل فلوراید (PMSF) و آمینوکاپروئیک اسید ۰/۲۵ میلی‌مولا (سیگما) به کمک هاون در دمای صفر تا ۴ درجه سانتی‌گراد هموژن و یکنواخت گردید (Stegeman *et al.*, 1979). عصاره حاصله ۲۰ دقیقه در ۱۱۰۰۰xg در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شد. مایع رویی جدا و ۲ ساعت در ۵۵۰۰۰xg در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سانتریفیوژ شد. رسوب حاصل از این مرحله مجدداً در بافر فسفات به تعليق درآمد و در همان شرایط رسوب داده شد. رسوب در حجم کمی از بافر به تعليق درآمد. میزان فعالیت آنزیم سیتوکروم P4501A1 از روی واکنش دی‌اتیلاسیون سوبستراتی ۷-اتوكسی رزروفین طبق روش بورک و مایر (Burke & Mayer, 1974) با کمی تغییرات تعیین گردید. محلول واکنش در حجم نهایی ۲ میلی‌لیتر از بافر تریس ۱/۰ مولار با pH برابر ۷/۸ حاوی ۷-اتوكسی رزروفین ۷۶٪ میکرومولا، NADPH ۲۴٪ میلی‌مولا و ۵۰ میکرولیتر فراکسیون میکروزومی (با غلظت پروتئین مشابه در گروههای آزمون و شاهد) بود. در این آزمون، از رزروفین ۰/۱ میلی‌مولا بعنوان استاندارد داخلی (کالیبراتور) استفاده گردید. میزان فلورسانس نسبی در طول موج برانگیختگی ۵۳۰ نانومتر و نشر ۵۸۶ نانومتر توسط دستگاه فلورومتر کانترون (BIO-TEK) اندازه‌گیری و مقادیر فعالیت آنزیم بر حسب نانومول در دقیقه بر میلی‌گرم پروتئین میکروزومی محاسبه گردید.


غلظت پروتئین نمونه‌های میکروزوومی براساس روش لوری تعیین گردید. در این روش از آلومین سرم گاوی (BSA: شرکت سیگما) در دامنه غلظت ۲۵ تا ۳۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر برای رسم منحنی استاندارد استفاده گردید (Lowry *et al.*, 1951).

الکتروفورز پروتئین براساس روش لاملی در ژل جداکننده ۱۱ درصد و ژل متراکم کننده ۴ درصد صورت گرفت (Laemmli, 1970). پس از الکتروفورز پروتئین‌های میکروزوومی (با غلظت‌های مشابه در گروه‌های شاهد و آزمون) ژل با کوماسی آبی R-350 رنگ آمیزی گردید. مارکرهای وزنی مورد استفاده شامل مارکرها با وزن مولکولی پایین (فارماسیا) در محدوده وزنی ۱۴ تا ۹۶ کیلو Dalton بود.


داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا مقایسه کلی میانگین چند تیمار با روش آنالیز واریانس یکطرفه و سپس مقایسه میانگین هر تیمار با میانگین تیمارهای دیگر با استفاده از آزمون چندگانه دانکن صورت پذیرفت. وجود یا عدم اختلاف معنی‌دار بین میانگین‌ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد ($P < 0.05$) تعیین گردید.

نتایج

سیتوکروم P4501A1 از اکسیژنازهای چند عملکردی است که توسط انواعی از آلاینده‌های زیست محبطی القا می‌گردد. در این مطالعه تیمار فیل ماهیان دریای خزر با یک غلظت بتانفتوفلاون ۳۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن، فعالیت این آنزیم را بیش از ۱۵ بار افزایش داد. در ماهیان تیمار شده با دو و سه غلظت متوالی این ترکیب (گروه‌های ۳ و ۴) میزان افزایش فعالیت آنزیم بترتیب ۲۴ و ۲۶ برابر گروه شاهد بود (نمودار ۱). مقایسه الگوی پروتئینی فراکسیون میکروزوومی ماهیان تیمار شده و شاهد با روش SDS-PAGE بیانگر تفاوت‌های قابل توجهی در نوع و مقدار پروتئین‌های فراکسیون میکروزوومی بود (شکل ۱). همانطور که در این شکل بوضوح مشخص است، چندین باند پروتئینی در گروه آزمون شدت رنگ پذیری بیشتری نسبت به گروه شاهد دارند.



نمودار ۱: تاثیر مقادیر مختلف از ماده بتانفتوفلاون بر فعالیت آنزیم سیتوکروم P4501A1 در فیل ماهی



شکل ۱: SDS-PAGE میکروزومهای کبد فیل ماهی. مارکرهای وزنی با اوزان ۱۴، ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۷، ۹۶ کیلو دالتون (ستون M)، نمونه‌های تیمار شده در طی ۳ بار تزریق (ستون های ۱ و ۲)، نمونه‌های تیمار شده طی ۲ بار تزریق (ستون ۳)، نمونه‌های کنترل (ستون ۴).


نمودار ۲ رابطه میزان دیاتیلاسیون سوبستراتی ۷-اتوکسی رزروفین (EROD) توسط آنزیم سیتوکروم P4501A1 را نسبت به زمان نشان می‌دهد. افزایش میزان این واکنش تا ۲۰ دقیقه بصورت خطی بود و پس از آن از حالت خط مستقیم خارج گردید.

نتایج واکنش دیاتیلاسیون سوبستراتی ۷-اتوکسی رزروفین توسط آنزیم سیتوکروم P4501A1 کبد فیل ماهی در درجه حرارت‌های مختلف ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتی گراد نشان داد (نمودار ۳) که میزان فعالیت آنزیم در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد نسبت به سایر دماها بالاتر است. بررسی‌های آماری انجام شده نیز بین میزان فعالیت آنزیم در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد اختلاف معنی‌داری با سایر دماهای شرایط آزمایش نشان می‌دهد ($P < 0.05$). تأثیر غلظتهاي مختلف پروتئين میکروزوم کبدی بر میزان فعالیت EROD-7 در نمودار ۴ آمده است. این نتایج نشان داد که رابطه فعالیت با میزان پروتئین میکروزومی تا غلظت ۱۸۰ میکروگرم در میلی لیتر در شرایط واکنش، به صورت خطی می‌باشد و پس از آن از حالت خط مستقیم خارج می‌گردد. با توجه به داده‌های آماری اختلاف معنی‌داری بین رزروفین تولیدی در غلظتهاي ۲۰۰ و ۴۰۰ میکروگرم مشاهده نگردید.


غلظتهاي مختلف سوبستراتی ۷-اتوکسی رزروفین بر روی فعالیت EROD-7 آنزیم سیتوکروم P4501A1 میکروزومی در نمودار ۵ آمده است. همانگونه که این نتایج نشان می‌دهد، واکنش

القای آنزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و ...


دی اتیلاسیون در غلظت ۱/۵۳ میکرو مولار از سوبسترا اشباع می شود و فعالیت در غلظتهای بالاتر ۱/۵۳ میکرومولار از سوبسترا به صورت خطی افزایش نیافته و از حالت خط مستقیم خارج می گردد که داده های آماری نیز مؤید این موضوع می باشند ($P<0.05$).




نمودار ۲: تاثیر مدت زمان بر فعالیت آنزیم سیتوکروم P4501A1 در فیل ماهی



نمودار ۳: تاثیر درجه حرارت بر فعالیت آنزیم سیتوکروم P4501A1 در فیل ماهی



نمودار ۴: تاثیر غلظت پروتئین میکروزومی بر فعالیت آنزیم سیتوکروم P4501A1 در فیل ماهی



نمودار ۵: تاثیر اتوکسی رزروفین بر فعالیت آنزیم سیتوکروم P4501A1 در فیل ماهی

بحث

ماهیان خاویاری از نظر اقتصادی گونه‌های با ارزش و مهمی هستند. سیستم سیتوکروم P450 این ماهیان همانند سایر آبیان با انواعی از آلاینده‌های زیست محیطی القا می‌شوند. سیتوکروم P4501A1 مهمترین ایزوآنزیم این سیستم در ماهی می‌باشد که انواعی از مشتقats نفتی مانند متیل کلانترن، بتا-نفتوفلاون و بنزوآپايرن می‌توانند آنرا القا نمایند. بدین لحاظ این آنزیم نشانگر زیستی مهمی برای اطلاع از وضعیت محیط آب از نظر حضور این نوع آلاینده‌ها محسوب می‌گردد (Stegeman *et al.*, 1988) ;

(Goksoyr & Forlin, 1992 ; Siroska & Drastichova, 2004

در پژوهش حاضر القای آنزیم سیتوکروم P4501A1 فیل ماهی توسط ترکیب بتانفتوفلاون مورد مطالعه قرار گرفته است و فعالیت، میزان نسبی و بعضی خصوصیات کینتیکی آنزیم القا شده با روش‌های مربوطه بررسی گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تزریق یک غلظت بتانفتوفلاون به ماهی فعالیت دی‌اتیلاسیون سوبسترای ۷ - اتوکسی رزروفین (7-EROD) را بیش از ۱۵ بار و تزریق دو یا سه غلظت این فعالیت را ۲۴ و ۲۶ بار افزایش می‌دهد. تحقیقات انجام شده بر روی سایر ماهیان، القاپذیری فعالیت آنزیم را نشان می‌دهد. چنانچه Stegeman و همکاران (1997). درکشک ماهی تیمار شده (گونه *Platichthys flesus*) با ماده بتانفتوفلاون با غلظتهاي ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، افزایش حدود ۲۵ تا ۵۵ بار در فعالیت EROD در ماهیان منطقه برخوردار مشاهده نمودند. فاکتور القاپذیری فعالیت دی‌اتیلاسیون سوبسترای ۷ - اتوکسی رزروفین برای مواد القا کننده ۳ - متیل کلانترن در ماهی کپور *Cyprinus carpio* و بنزوآپايرن در گونه *Sparus aurata* بترتیب با مقادیر ۲۵ و ۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن برابر با $\frac{1}{10}$ و ۵ بار گزارش شده است (.. Arinc & Sen, 1994 ; 1997)

سیتوکروم P4501A1 فیل ماهی پروتئینی با وزن 58 ± 1 کیلو Dalton می باشد که مقدار این پروتئین در فراکسیون میکروزومی کبد گروههای آزمون بارها بیش از مقدار آن در گروه شاهد بود که در الگوی SDS-PAGE در شکل ۱ مشاهده می‌شود. در مطالعات انجام گرفته بر روی سایر گونه‌های ماهیان القای این آنزیم محدوده وزنی مشابه‌ای را تایید می‌کند. برای مثال، القای پروتئینی با وزن حدود ۵۸ کیلو Dalton بترتیب در ماهیان اسکاپ (scup) (گونه *Stenotomus crysops*) و قزل‌آلای رنگین کمان (Rainbow trout) با بتانفتوفلاون و در ماهی (gilthead seabream) با بنزوآپايرن گزارش شده است. نتایج سنجش EROD در گروههای آزمون با الگوی SDS-PAGE آنها در این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش فعالیت سیتوکروم P4501A1 در ماهیان القا شده ناشی از افزایش بیان زن و بیوسنتز این آیزوآنزیم است، در ضمن نتایج SDS-PAGE فراکسیون میکروزومی ماهیان القا شده حاکی از افزایش بیوسنتز مقدار بروتئین سیتوکروم P4501A1 سلولهای کبدی می‌باشد (Arinc & Sen, 1994 ; Klotz et al., 1987 ; Tate, 1988 ; Williams & Buhler, 1983).

بررسی برخی جنبه‌های کینتیکی آنزیم سیتوکروم P4501A1 فراکسیون میکروزومی کبد فیل ماهی در این مطالعه نشان داد که میزان فعالیت آنزیم در محدوده دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد نسبت به سایر دماها بالاتر است. در ضمن، فعالیت آنزیم در شرایط ذکر شده در غلظت $1/5^3$ میکرومولار سوبسترای ۷ - اتوکسی رزروفین و غلظت ۱۸۰ میکروگرم پروتئین میکروزومی به حداقل خود رسیده و از سوبسترا اشباع می‌گردد. مقادیر بالاتر از $1/5^3$ میکرومولار از سوبسترا تاثیری در افزایش نرخ فعالیت واکنش EROD نمی‌گذارد. Arinc & Sen (1993, 1994) در مطالعه بر روی گونه *Sparus aurata* مقدار $1/5^1$ میکرومولار از سوبسترا را جهت انجام واکنش EROD پیشنهاد کردند.

نرخ فعالیت آنزیم در غلظتهاهی بالاتر از ۱/۵۳ میکرو مولار از سوبسترا کاهش می‌یابد. این موضوع حاکی از اثر مهاری سوبسترات اتوکسی رزروفین بر فعالیت آنزیم است که در سایر مطالعات نیز گزارش شده است (Burke *et al.*, 1977, 1985). در این مطالعه که ظاهراً اولین مطالعه در زمینه القای سیتوکروم P4501A1 فیل ماهی و بررسی برخی جنبه‌های کیتیکی این ایزوآنزیم است، تیمار ماهیان با ماده بتانفتوفلانون منجر به القاپذیری این آنزیم شد. بنابراین از درجه القاپذیری آنزیم سیتوکروم P4501A1 که در نرخ فعالیت واکنش EROD بخوبی منعکس گردید، می‌توان بعنوان یک بیومارکر جهت سنجش اثرات ترکیبات چند حلقه‌ای و دی‌فنیل‌های چند کلره استفاده نمود.

منابع

- Addison, R. F. , 1996.** The use of biological effects monitoring in studies of marine pollution. Environ. Rev. Vol.4, pp.225-237.
- Arinc , E. and Sen , A. , 1993.** Characterization of cytochrome P450 dependent mixed-function oxidase system of gilt head seabream (*Sparus aurata*, Sparidae) liver. Comp. Biochem. Physiol. Vol. 104B, pp.133-139.
- Arinc, E. and Sen, A. , 1994.** Effects of in vivo benzo(a) pyrene treatment on liver microsomal. mixed function oxidase activities of gilthead seabream (*Sparus aurata*).Comp. Biochem. Physiol.Vol. 107C, pp.405-414.
- Burke, M.D. and Mayer, R.T. , 1974.** Ethoxyresorufin: Direct flurrimetric assay of a microsomal O-dealkylation which is preferentially inducible by 3-methylcholanthrene. Drug Metabolism and Disposition. Vol.2, No. 6, pp.583-588.
- Burke, M.D. ; Prough, R.A. and Mayer, R.T. , 1977.** Characteristic of a microsomal cytochrome P448 mediated reaction ethoxyresorufin o-deethylation. Drug. Metabolism and Disposition. Vol.5, No. 1, pp.1-8.
- Burke, M.D. ; Thompson, S. ; Elcombe, C. R. ; Halpert, J. ; Haaparanta, T. and Mayer, R.T. , 1985.** Ethoxy, penthoxy and benzyl oxyphenones and homologues: a series of substrates to distinguish between different induced cytochrome P-450. Biochem. Pharmacol. Vol.34. pp.3337-3345.
- Goksoyr, A., and L. Forlin., 1992.** The cytochrome P450 system in fish ,aqutic toxicology and environmental monitoring.Aquat.ToxicolVol. 22., pp. 680-685.

- Goksoyr, A. , 1985.** Purification of hepatic microsomal cytochrome P450 from β -naphtoflavone-treated Atlantic cod (*Gadus morhua*), a marine teleost fish. *Biochem. biophys. Acta.* Vol. 840, pp.409-417.
- Ioannidis , C. and Park, D.V. , 1990.** The cytochrome P450 gene family of microsomal hemoproteins and role in the metabolic activation of chemicals. *Drug Metab. Rev.* Vol. 22, pp.1-85.
- James, M.O. ; Kahn, M.A. Q. and Bend, J.R. , 1979.** Hepatic microsomal mixed-function oxidase activities in several marine species common to coastal Florida. *Comp. Biochem. Physiol.* Vol. 62C, pp.155-164.
- Kajiwara, N. ; Ueno, D. ; Monirith, I. ; Tanabe, S. ; Pourkazemi, M. and Aubrey, D. G. , 2003.** Contamination by organochlorine compounds in sturgeons from Caspian sea during 2001-2002. *Marine Pollution Bulletein.* Vol. 46, pp.741-747.
- Koltz, A.V. ; Stegeman J.J. and Walsh, C. ; 1987.** An aryl hydrocarbon hydroxylating hepatic cytochrome P450 from the marine fish *Stenotomus chrysops*. *Archs. Biochem. Biophys.* Vol.226, pp.578-592.
- Laemmli, U. K. , 1970.** Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bactriophage T4. *Nature* Vol. 22, pp.680-685.
- Lowry, O.H. ; Rosebrough, N.J. ; Farr, A.J. and Randall, R.j. , 1951.** Protein measurment with the folin phenol reagent. *Journal of Biol. Chem.*Vol. 193, pp.265-275.
- Monod, G. , Devaux, A. and Riviere, J.L. , 1987.** Characterization of some monooxygenase activities soluilization of hepatic cytochrome P-450 in two species of freshwater fish, the nase (*Chonrostoma nasus*) and roach (*Rutilus rutilus*).*Comp. Biochem. Physiol.* Vol. 88C, pp.83-89.
- Marionnet, D. ; Taysse, B. and Deschaux, P. , 1997.** 3-Methylcholantheren-induced EROD activity in carp (*Cyprinus carpio*).*Comp. Biochem. Biophysiol.* Vol. 124, No. 2, pp.165-170.
- Nebrt, D.W. and Gonzalez, F.J. , 1987.** P450 genes: Structure, evolution and regulation. *A. Rev. Biochem.* Vol. 56, pp.945-993.

- Payne, J.F. ; Fancey, A. ; Rahimtula, D. and Porter, E.D. , 1987.** Review and perspective on the use of mixed function oxygenase enzyme in biological monitoring. Comp. Biochem. Physiol. Vol. 86C, pp.233-245.
- Sarasquete, C. and Senger, H. , 2001.** Cytochrome P4501A in teleostean Fishes. The science of the total environment. Vol. 247, pp.313-332.
- Sen, A. and Arinc, E. , 1998.** Preparation of highly purified cytochrome P4501A1 from leaping mullet (*Liza saliens*) liver microsomes and its biocatalytic, molecular and immunological properties. Comp. Biochem. Physiol. Vol. 121 (C), pp.249-265.
- Sirosoka, Z. and Drastichova, J. , 2004.** Biochemical markers of aquatic environment contamination, cytochrome P450 in Fish. A review. Acta.Vet. Brno.73, pp.123-132.
- Stegeman, J.J. ; Binder, R.L. and Orren, A. , 1979.** Hepatic and extrahepatic microsomal electron transport components and mixed function oxygenase in the marine fish. *Stenotomus versicolor*. Biochem. Pharmacol. Vol. 28, pp.3431-3439.
- Stegeman, J.J. ; Woodin, B.R. and Goksoyr, A. , 1988.** Apparent cytochrome P450 induction as an induction of exposure to environmental chemicals in the flounder *Platichthys flesus*. Mar. Ecol. Prog. Ser. Vol. 46, pp.55-60.
- Stegeman, J.J. ; Woodin, B.R. ; Singh, H. ; Oleksiak, M.F. and Celander, M. , 1997.** Cytochrome P450 (CYP) in tropical fishes: Catalytic Activities, Expression of multiple CYP Proteins and high levels microsomal P450 in liver of fishes from Bermuda. Comp. Biochem. Physiol. Vol. 116C, pp.61-75.
- Tate, L.G. , 1988.** Characterization of phase I and phase II drug metabolism and the effect of β -naphthoflavone in the liver and posterior kidney of the channel catfish, *Ictalurus punctatus*. Arch. Environ. Contam. Toxicol. Vol. 17, pp.325-332.
- Williams, D.E. and Buhler, D.R. , 1983.** Comparative properties of purified cytochrome P-448 from β -naphthoflavone treated rats and rainbow trout. Comp. Biochem. Physiol. Vol.75C, pp.25-32.

Induction of Cytochrome P4501A1 by beta-naphtho flavone and determination of enzyme properties in *Huso huso*

Karimzadeh K.⁽¹⁾; Mostafaie A.⁽²⁾; Esmaeli A.⁽³⁾;
Poorkazemi M.⁽⁴⁾ and Zahmatkesh A.⁽⁵⁾

karimzadehkathy@yahoo.com

1,2- Mirza Kochak Khan Higher Education Centre, P.O.Box: 41635-3836
Rasht, Iran

2-Research Center of Medical Biology, Kermanshah University of Medical
Science

3- Faculty of Natural Research and Marine science,Tarbiat Modarres University,
P.O.Box: 46414-356 Tehran, Iran

4- International Sturgeon Research Institute, P.O.Box: 41635-3463 Rasht, Iran
Received: March 2004 Accepted: May 2005

Keywords: Cytochrome P4501A1, Beta-naphtho flavone, *Huso huso*, Iran

Abstract

Cytochrome P4501A1 is a major isoenzyme in fish monooxygenase system which is induced by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) compounds. In this research, the inducing effect of p-naphthoflavone and its catalytic properties was studied in *Huso huso* liver. Fish were given ip injection of p-naphthoflavone at three different doses. The enzyme activity was measured with de-ethylation of ethoxyresorufin reaction (EROD) by fluorometry method and relative amount of induced proteins were determined using polyacrylamid gel electrophoresis (SDS-PAGE).

The results showed that EROD activity in the microsomal fraction of the treated fish was 15-26 folds that of the control group. Optimum activity of this enzyme was observed at 20-25 degrees centigrade. The maximum enzyme activity was seen in the precence of 180 micrograms of microsomal protein and 1.53 μ M of 7-ethoxyresorufin. SDS-PAGE of microsomal protein pattern in the treated fish revealed a protein with molecular mass 58 \pm 1 KDa translating to cytochrome P4501A. We conclude that the p-naphthoflavone in fish liver can induce cytochrome P4501A gene and increase its biosynthesis leading to raised enzyme activity in EROD reaction.