

ارزیابی اثرات خشکسالی بر تنوع، تراکم، فراوانی و پراکنش موجودات کفزی تالاب امیرکلایه لاهیجان

شعبانعلی نظامی^(۱) و حسین خارا^(۲)

Sha_Nezami 2004 @ yahoo.Com

۱- موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، صندوق پستی ۶۱۱۶ - ۱۴۱۵۵

۲- دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، گروه شیلات، لاهیجان صندوق پستی ۱۶۱۶

تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۸۲ تاریخ ورود: دی ۱۳۸۲

چکیده

اثرات خشکسالی در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۷ بر روی موجودات کفزی تالاب امیرکلایه لاهیجان در سال ۱۳۸۰ مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، بصورت فصلی از ۶ ایستگاه، بو سیله نمونه بردار گراب نمونه برداری شد و پس از شناسایی موجودات کفزی و ثبت اطلاعات، داده های بدست آمده با اطلاعات سالهای قبل از خشکسالی (۱۳۷۶ - ۱۳۷۵) مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. طبق نتایج این بررسی، ۹ گروه از کفزیان شامل یک رده Chironomidae، دو راسته Ephemeroptera و Odonata و ۶ خانواده Hirudina Xanthidae، Culicidae، Tubificidae، Gammaridae، Chaoborinidae که Culicidae Xanthidae قبلاً گزارش نشده بودند. ضمن اینکه دو راسته Coleoptera و Mysidae ایگر چه در سالهای Trichoptera و سه خانواده Planorbidae، Limnaeidae و Limnaeidae قبلاً وجود داشتند ولی در مطالعه جدید دیده نشدند. همچنین براساس مطالعات انجام گرفته تراکم موجودات کفزی به میزان زیادی کاهش نشان می دهد، که در کل سال از ۱۳۷۲ عدد در مترمربع در سال ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ به ۱۶۵ عدد در مترمربع در سال ۱۳۸۰ رسیده بود. در ضمن از لحاظ تنوع گونه ای، غنای گونه ای، شاخص پراکنش و نوع پراکنش اختلافهای قابل توجهی در کل سال و در بین فصول و ایستگاه های مختلف ثبت گردید. در مجموع این مطالعه اثرات جنبه های مختلف خشکسالی از جمله کاهش عمق آب، کاهش اکسیژن محلول آب، افزایش دمای آب، کاهش میزان غذا و افزایش میزان تغذیه توسط ماهیان را بر روی موجودات کفزی تالاب امیرکلایه نشان می دهد.

لغات کلیدی: موجودات کفزی، تالاب امیرکلایه، لاهیجان، ایران

مقدمه

از جمله اجزاء زنده اکوسیستمهای آبی موجودات کفرزی هستند که با ایفای نقشهای مختلف سهم مهمی در ایجاد تعادل اکوسیستم مربوطه دارند. این موجودات جزئی از زنجیره غذایی زیستگاههای آبی می باشند که نیاز غذایی بسیاری از گونه های آبزی بویژه ماهیان (Paine, 1966 ; Pandian, 1987 ; Pinder, 1989) را برآورده می نمایند و بدین ترتیب در چرخه انرژی و مواد غذایی (Owen, 1974) اثر می گذارند. موجودات کفرزی باعث معدنی شدن مواد آلی شده و همچنین بعنوان دومین یا سومین سطح غذایی مورد استفاده سایر آبزیان قرار گرفته و می توانند بعنوان نمایه ای از میزان کل تولیدات و شاخصی برای کیفیت آب محسوب می شوند (Owen, 1974).

بطور کلی در فراوانی و تنوع موجودات کفرزی عوامل مختلفی دخیل هستند، بطوریکه می توان به مقدار غذا (Row, 1971 ; باقری، ۱۳۷۸؛ عبدالملکی و باقری، ۱۳۸۱)، نوع بستر (Welcomm, 1985 ; Jegadeesan & Ayyakkannu, 1992 ; Lindesaard, 1972 باقری، ۱۳۷۸؛ عبدالملکی و باقری، ۱۳۸۱)، شرایط فیزیکی و شیمیایی حاکم بر زیستگاه (Jonasson, 1972) (Ansari *et al.*, 1994)، مقدار مواد آلی (Nezami, 1993) (حسین پور، ۱۳۷۸ و عبدالملکی و باقری، ۱۳۸۱)، آلودگی محیط زیست (Grzybkowska, 1989) (اولا، ۱۳۶۹؛ عبدالملکی، ۱۳۷۲)، اندازه ذرات رسوب (Brundin, 1951) (باقری، ۱۳۷۸)، تغییرات فصول (Seather, 1962) (باقری، ۱۳۷۸)، نوع ماهی و تعداد ماهیان کفرزی خوار (کریمپور و حقیقی، ۱۳۷۳؛ رومانووا، ۱۹۸۳؛ عبدالملکی و باقری، ۱۳۸۱؛ باقری، ۱۳۷۸) (Paine, 1966) اشاره کرد.

در بین انواع اکوسیستمهای آبی، تالابها بعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای آبی مطرح می باشند، که از جمله آنها می توان به تالاب امیرکلایه اشاره نمود. تالاب امیرکلایه محل زیست موجودات آبزی مختلفی مانند گیاهان آبزی، ماهیان، پرندگان آبزی، فیتوپلانکتونها، زئوپلانکتونها، موجودات کفرزی و غیره می باشد. به دلیل همین تنوع زیستی دارای اهمیت اکولوژیک و زیستی بالایی است. ولی بدليل خشکسالی های پیاپی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۷۷ سطح آب این تالاب هر ساله در دو فصل بهار و تابستان بشدت کاهش می یافتد که در نتیجه اثرات سوئی بر روی جانوران و گیاهان از جمله موجودات کفرزی گذاشت. به همین دلیل جهت مشخص نمودن ابعاد مختلف پدیده خشکسالی طرح جامع تحقیقاتی ارزیابی اثرات خشکسالی بر تالاب امیرکلایه لاهیجان با همکاری مشترک دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان و اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در سال ۱۳۸۰ به اجرا در آمد. در این تحقیق مباحث مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها بررسی و ارزیابی اثرات خشکسالی بر موجودات کفرزی تالاب امیرکلایه لاهیجان بود که موضوع مقاله حاضر می باشد. برای این

منظور اطلاعات بدست آمده از نمونه برداری و بررسی در سال ۱۳۸۰ با اطلاعات سالهای ع. ۱۳۷۵ (فوق. ۱۳۷۶) مو. د مقاسه و تحیه و تحلیا، قرار گرفته است.

مواد و روش کار

تالاب امیرکلایه از جمله تالابهای مهم استان گیلان است که در ۳۶ کیلومتری شمال شهرستان لاهیجان واقع شده است. مساحت این تالاب حدود ۱۲۳۰ هکتار می‌باشد که در مختصات جغرافیایی $5^{\circ} ۱۲'$ شرقی و $۳۷^{\circ} ۰7'$ شمالی قرار گرفته است. تالاب امیرکلایه بصورت شمالی و جنوبی کشیده شده است که حداقل طول آن ۵ کیلومتر و حداقل عرض آن $1/8$ کیلومتر می‌باشد. میانگین عمق تالاب نیز حدود ۲ متر است (نحوات صنعتی، ۱۳۷۳).

نمونه برداری در طی سال ۱۳۸۰ و بصورت فصلی توسط دستگاه بنتوز گیرگراب (Grab) با سطح برداشت ۲۲۵ سانتیمترمربع و عمق برداشت ۵ تا ۱۰ سانتیمتر از ایستگاههای شش گانه صورت گرفت. نمونه برداری بصورت سه تکرار از هر ایستگاه انجام گردید. آنگاه نمونه‌ها با الک چشممه ۵۰۰ میکرومتر شستشو داده شد و سپس مواد باقیمانده به داخل دبه‌های یک لیتری منتقل گردید و جهت تثبیت آنها نیز از فرمالین ۴ درصد استفاده شد.

آنگاه نمونه‌ها به آزمایشگاه انتقال داده شده و در آنجا بکمک کلیدهای شناسایی مختلف مورد شناسایی قرار گرفتند (Usinger, 1963; Pennak, 1953; Mellanby, 1963). بعد از ثبت اطلاعات، داده‌های حاصله با اطلاعات سالهای قبل (فوقی، ۱۳۷۶) بکمک نرم‌افزار Excell و آزمون واریانس یکطرفه (در سطح اعتماد ۹۵ درصد) و فرمولهای شاخص تنوع گونه‌ای شانون - وینر، یکنواختی گونه‌ای شانون - وینر، شاخص غنای مارگالف، شاخص غنائی گونه‌ای منهینیک، شاخص تنوع گونه‌ای سیمپسون، یکنواختی گونه‌ای سیمپسون و شاخص پراکنش به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند (Elliott, 1983; Southwood & Henderson, 2000; Fox & Bell, 1994; بیضاپور، ۱۳۷۶).

۱) شاخص تنوع گونه‌ای شانون - وینر

$$H' = - \sum_{i=1}^s \left[\left(\frac{ni}{N} \right) \ln \left(\frac{ni}{N} \right) \right]$$

۲) یکنواختی شانون - وینر ، بین ۱ -

$$J = \frac{H}{H_{\max}}$$

۳) شاخص غنائی گونه‌ای مارگالف

$$D_{Ma} = \frac{S - 1}{Ln(N)}$$

۴) شاخص تنوع گونه‌ای منهینک

$$D_{Me} = \frac{S}{\sqrt{N}}$$

۵) شاخص تنوع گونه‌ای سیمپسون

$$D = 1 - \sum_{i=1}^s \left[\frac{ni(ni-1)}{N(N-1)} \right]$$

۶) یکنواختی سیمپسون ، بین ۱ - ۰

$$V' = \frac{D}{D_{max}}$$

S = تعداد کل گروههای موجودات کفزی شناسایی شده

Ni = تعداد افراد متعلق به گروه ۱ ام

N = تعداد کل افراد شمارش شده

Ln = لگاریتم پایه نپرین

D_{Ma} = غنای گونه‌ای مارگالف

H' = شاخص تنوع گونه‌ای شانون - وینر

H' _{max} = حداکثر میزان شاخص تنوع گونه‌ای شانون - وینر

V = یکنواختی سیمپسون

J = یکنواختی شانون - وینر

D_{Me} = شاخص تنوع گونه‌ای منهینک

D = شاخص تنوع گونه‌ای سیمپسون

D_{max} = حداکثر شاخص تنوع گونه‌ای سیمپسون

۷) شاخص پراکنش که از تقسیم واریانس بر میانگین بدست می‌آید. در صورتیکه واریانس بیش از میانگین باشد، پراکنش لکه‌ای، وقتیکه واریانس کوچکتر از میانگین باشد پراکنش یکنواخت و در حالی که واریانس برابر میانگین باشد، پراکنش تصادفی است.

نتایج

براساس نتایج بدست آمده از این بررسی تعداد ۹ گروه موجود کفزی در سال ۱۳۸۰ شناسایی شدند، در حالیکه در مطالعه سال ۶-۱۳۷۵، تعداد ۱۳ گروه موجود کفزی در این تالاب زیست می‌کردند. از لحاظ نوع موجود کفزی نیز گروههای Naididae, Mysidae, Coleoptera, Trichopthera, Planorabidae, Limnaeidae شدند و در همین حال Xanthidae و Culicidae در سال ۱۳۸۰ برخلاف سالهای گذشته

مورد شناسایی قرار گرفتند. بیشترین میانگین تراکم ($1161 \pm 2444/84$ عدد در متربع)، فراوانی ($84/5$ درصد) و دامنه فراوانی ($1817 - 18$ عدد در متربع) در سال $1376 - 1375$ مربوط به Chironomidae بود، که در سال 1380 بیشترین میانگین تراکم ($54 \pm 49/99$ عدد در متربع) و فراوانی (3277 درصد) مربوط به Chironomidae و دامنه تعداد (25 تا 45 عدد در متربع) مربوط به Tubificidae بود. شاخص و نوع پراکنش کفیزیان نیز تغییراتی داشت، بطوریکه پراکنش Chironomidae از پراکنش لکه‌ای به پراکنش یکنواخت، پراکنش Gammaridae از پراکنش یکنواخت به پراکنش لکه‌ای تغییر پیدا کرده بود، ولی در مجموع اکثر پراکنش‌ها بصورت لکه‌ای بودند (جدول ۱).

چنانچه در جدول ۲ دیده می‌شود با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه بین میانگین تراکم کل موجودات کفیزی طی این دو سال و همین طور میانگین تراکم Chironomidae تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

با توجه به نمودار ۱ میانگین تراکم موجودات کفیزی طی این دو سال اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد، بطوریکه از میانگین تراکم 1372 عدد در متربع در سال $1375 - 76$ به میانگین تراکم 165 عدد در متربع در سال 1380 رسیده است. همچنین در بین تمام ایستگاهها میانگین فراوانی روند نزولی قابل توجهی نشان می‌دهد. ضمن اینکه در بین فصول مختلف هم اختلافها بسیار مشهود بوده و سیر نزولی بسیار شدید است (نمودار ۲).

تنوع گونه‌ای موجودات کفیزی تالاب امیرکلایه طی دوره $1376 - 1375$ و 1380 بكمک شاخصهای تنوع گونه‌ای مختلف، تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. بطوریکه براساس شاخص تنوع گونه‌ای شانون- وینر طی دو سال، بالاترین شاخص مربوط به سال 1380 معادل $1/845$ است. اما در بین فصول مختلف، بغیر از فصل پاییز و زمستان (بترتیب $1/392$ و $1/765$ در $1375 - 6$ و فصل دیگر (بهار $1/967$ و تابستان $1/916$) بیشترین شاخص مربوط به سال 1375 می‌باشد. در بین ایستگاههای مختلف نیز نوساناتی از میزان تنوع این شاخص مشاهده می‌شود. ضمن اینکه از دیدگاه یکنواختی گونه‌ای شانون- وینر اختلافها مشهود است. طبق فرمول شاخص غنای گونه‌ای مارگالف اثرات خشکسالی بر موجودات کفیزی مشهودتر بوده، بنحویکه میزان این شاخص بغیر از فصل زمستان، در سایر فصول و ایستگاهها و حتی در مجموع در سال $1375 - 6$ بیش از سال 1380 می‌باشد. در همین حال شاخص غنای گونه‌ای مهینک، شاخص غنای گونه‌ای سیمپسون و یکنواختی گونه‌ای سیمپسون نتایج مشابهی با شاخصهای دیگر ارائه می‌دهند، که هر یک از این فرمولها به نوعی تأثیر خشکسالی بر موجودات کفیزی تالاب امیرکلایه را بیان می‌نمایند (جدول ۳).


مودل ۱: پایگین زاکم (بعداد در متر مربع + اسراف میلار) درصد فراوانی، دامنه تعداد، شاخص برآش و نوع برآش مختلف

(۱۳۸۰ - ۱۳۷۵)


Xanthidae	Gammariidae	Culicidae	Chaoboridae	Chironomidae	موجود گهزی
۱۳۸۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۰	۱۳۷۰ - ۷۶	سال
۱۳۷۷	-	۲۱±۰/۱۰	۹±۱۹/۰۳	۵±۱۰/۰۱	پیگین زاکم + انحراف میلار
۱/۳	-	۱۲/۷	۰/۰	۰/۰	درصد فراوانی
۱۰-۷۵	-	۱۷-۱۰	۰-۷۰	۰-۱۰	دامنه فراوانی
۰-۰۳۰	-	۴۰-۰۳۸	۶۰-۰۱۶	۴۰-۰۷۸	شاخص برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Limnaeidae					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	۱۳۷۰	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	۱۳۷۰	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱۳/۶	۱/۷	۰/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۱۰	۰-۱۰	۰-۱۰	شاخص برآش
-	-	۴۰-۰۳۸	۶۰-۰۱۶	۴۰-۰۷۸	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Hirudina					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۰۵	۰-۰۵	۰-۰۵	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۳۰	۳۰-۰۳۰	۳۰-۰۳۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Odonata					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۰۵	۰-۰۵	۰-۰۵	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Ephemeroptera					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۰۵	۰-۰۵	۰-۰۵	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Tubificidae					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۰۵	۰-۰۵	۰-۰۵	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Coleoptera					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۰۵	۰-۰۵	۰-۰۵	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Niidae					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۰۵	۰-۰۵	۰-۰۵	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Mysidae					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۰۵	۰-۰۵	۰-۰۵	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Trichopelta					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۰۵	۰-۰۵	۰-۰۵	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش
Planorbidae					
۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۷۵ - ۷۶	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	موجود گهزی
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	سال
-	-	۱۳۷۰	۱۳۸۰	۱۳۷۵ - ۷۶	پیگین زاکم + انحراف میلار
-	-	۱/۷	۱/۷	۱/۷	درصد فراوانی
-	-	۰/۰	۰/۰	۰/۰	دامنه فراوانی
-	-	۰-۱۷	۰-۱۷	۰-۱۷	شاخص برآش
-	-	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	۳۰-۰۴۰	نوع برآش
لکه‌ای	-	بکر است	لکه‌ای	لکه‌ای	نوع برآش

جدول ۲: آزمون واریانس یک طرفه (در سطح ۹۵ درصد) برای موجودات کنفری مشاهده شده در سالهای ۱۳۷۵/۶ و ۱۳۸۰/۱

نتیجه آزمون	Sig. level	ratio-F	نوع آزمون
+	۰/۰۰۵۸	۷/۲۵۳	بررسی تغییرات Chironomidae طی دو سال
-	۰/۰۴۳۱	۱/۸۳۵	بررسی تغییرات Chaoboridae طی دو سال
+	۰/۰۹۰۸	۲/۰۹۷	بررسی تغییرات Gammaridae طی دو سال
-	۰/۰۳۰۷	۱/۳۱۱	بررسی تغییرات Tubificidae طی دو سال
-	۰/۱۱۷۰	۱/۹۳۶	بررسی تغییرات Ephemeroptera طی دو سال
+	۰/۰۰۷۷۲	۲/۹۶۰	بررسی تغییرات Odonata طی دو سال
+	۰/۱۱۷۰	۲/۱۴۱	بررسی تغییرات Hirudina طی دو سال
+	۰/۰۰۰۲۵	۷/۷۷۶	بررسی تغییرات فراوانی کل موجودات کنفری طی دو سال



نمودار ۱: میانگین فراوانی موجودات کفرزی تالاب امیرکلایه در دو سال مختلف (۱۳۷۵-۷۶ و ۱۳۸۰) بر حسب ایستگاه‌های مختلف (تعداد در مترمربع)



نمودار ۲: میانگین فراوانی موجودات کفرزی تالاب امیرکلایه در دو سال مختلف (۱۳۷۵-۷۶ و ۱۳۸۰) بر حسب فصول مختلف (تعداد در مترمربع)

جدول ۳: نتیجه موجات کنفری تالاب امیرکلاه در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۱ و ۱۳۸۶-۱۳۹۰ بر حسب شاخصهای نتیجه زیستی

نوع شاخص	زمان باکستان	میانگین سالانه	بهار	تابستان	پاییز	زمیان	ایستگاه ۱	ایستگاه ۲	ایستگاه ۳	ایستگاه ۴	ایستگاه ۵	ایستگاه ۶
نوع گونه‌ای	۱۳۸۰/۱/۱۸۶۰	۱۳۸۰/۱/۱۴۱۲	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۰	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۲	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۳	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۴	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۵	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۶	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۷	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۸	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۹	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۰
شانون - وبر	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵
بکموختی گونه‌ای	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۲	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۳	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۴	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۵	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۶	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۷	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۸	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۹	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۰	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۲
شانون - وبر	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵
غناچی گونه‌ای	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۲	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۳	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۴	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۵	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۶	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۷	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۸	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۹	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۰	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۲
مارکال	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵
غندی گونه‌ای	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۰	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۲	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۳	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۴	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۵	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۶	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۷	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۸	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۹	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۰	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۱
مهینیک	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵
نوع گونه‌ای	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۲	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۳	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۴	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۵	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۶	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۷	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۸	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۹	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۰	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۲
سبزپرون	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵
بکموختی گونه‌ای	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۲	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۳	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۴	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۵	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۶	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۷	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۸	۱۳۸۰/۱/۱۷۶۹	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۰	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۱	۱۳۸۰/۱/۱۷۷۲
سبزپرون	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵	۱۳۷۶-۱۳۷۵

بحث

بررسی مقایسه‌ای موجودات کفزی تالاب امیرکلایه طی دو سال ۱۳۷۵—۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ تفاوت قابل توجهی را از لحاظ فراوانی و تنوع نشان می‌دهد و همانطور که گفته شد، این وضعیت‌ها روندی کاهشی داشتند. اگرچه در سال ۱۳۸۰ دو خانواده Culicidae و Xanthidae برای اولین بار در سال ۱۳۸۰ گزارش شدند ولی باز هم میزان تنوع در سال ۱۳۷۵—۱۳۷۶ بیشتر بود. البته گزارش دو کفزی جدید در سال ۱۳۸۰ در تالاب امیرکلایه می‌تواند احتمالاً ناشی از بالا بودن دقت نمونه‌برداری باشد، که البته برغم افزایش دقت نمونه‌برداری باز هم تنوع و فراوانی موجودات کفزی کاهش یافته است. آنچه مسلم است این که در پی برخورد پدیده خشکسالی در سالهای ۱۳۷۸—۱۳۷۹، سطح آب تالاب امیرکلایه به نصف کاهش یافت و این پدیده باعث کاهش میزان اکسیژن محلول، افزایش دمای آب و در مجموع تغییر در کمیت و کیفیت سایر خصوصیات گشت. با توجه به اینکه تالاب امیرکلایه از لحاظ منبع آب ورودی در اصل وابسته به نزولات جوی و چشمه‌های زیرزمینی موجود در نواحی مختلف داخل تالاب است و رودخانه دائمی وجود ندارد (در فصلهای پاییز و زمستان، زهکشی‌های فصلی آب مزارع برنج اطراف را وارد این تالاب می‌کنند) (نجات صنعتی، ۱۳۷۳)، این اثرات شدیدتر بود. ضمن اینکه برداشت سیار زیاد آب توسط کشاورزان حاشیه تالاب جهت آبیاری مزارع برنج در دو فصل کم باران آن سالها (بهار و تابستان) مزید برعلت کاهش سطح آب تالاب بود. بنابراین همانگونه که ذکر شد این کاهش باعث گردید تا تغییراتی در ویژگیهای آب تالاب امیرکلایه ایجاد گردد، که نتیجه آن ایجاد تغییر در تنوع و فراوانی موجودات کفزی این تالاب بود. برای تأیید این اثرات می‌توان به نتایج تحقیقات محققان مختلف اشاره کرد، بطوریکه قبل‌آنیز قاسم اف، Nezami et al., 1993؛ Nezami, 1987؛ ۱۹۹۴؛ باقی، ۱۳۷۸؛ عبدالملکی و باقری، ۱۳۸۱ بر نقش تعیین‌کننده شرایط فیزیکی و شیمیایی آب بر موجودات کفزی تأکید کرده بودند، که در تالاب امیرکلایه کاهش عمق آب، کاهش اکسیژن محلول و افزایش دمای آب بیش از سایر عوامل تأثیرگذار بودند. بعنوان مثال، در تالاب انزلی با تغییر کمیت و کیفیت آب این تالاب، علاوه بر کاهش تنوع موجودات کفزی، اکوسیستم به سمت غالبیت گونه‌های با شاخص محیط‌های آلوده پیش رفت و این خانواده Tubificidae فراوانتر از بقیه موجودات شده است (Nezami, 1993؛ حسین‌پور، ۱۳۶۹؛ اولاء، ۱۳۶۹؛ عبدالملکی، ۱۳۷۲). این وضعیت در تالاب امیرکلایه به وضوح مشهود است، بطوریکه فراوانی این خانواده از ۰/۶ درصد در سال ۱۳۷۵—۱۳۷۶ به ۱۸/۱ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده است.

از عوامل دیگری که باعث تغییر در تنوع و فراوانی موجودات کفزی تالاب امیرکلایه طی این سالها شده‌اند، می‌توان به وجود و فراوانی ماهیان بنتوخ خوار اشاره کرد. در تالاب

امیرکلایه ۱۵ گونه ماهی زیست می‌کنند (نظمی و خارا، ۱۳۸۲) که از این تعداد، ۸ گونه متعلق به راسته کپور ماهی شکلان (لای ماهی، ماهی کلمه، ماهی سیم پرک، ماهی کپور، ماهی حوض وحشی، ماهی سرخ باله، ماهی ریز نقره‌ای و رفتگر ماهی خاردار) به همراه ماهی نه خاره، سوزن ماهی، گاو ماهی مرمری و سوف حاجی طرخان به میزان زیادی از موجودات کفزی تغذیه می‌کنند. بطوریکه براساس مطالعات انجام گرفته نه تنها این ماهیان بیش از ۸۰ درصد ترکیب ماهیان این تالاب را تشکیل می‌دهند، بلکه براساس تحقیقات انجام گرفته در همین سال در مورد رژیم غذایی این ماهیان مثل لای ماهی (نظمی و همکاران، ۱۳۸۲) و سوف حاجی طرخان (نظمی و همکاران، ۱۳۸۳) بالاترین فراوانی غذاهای خورده شده متعلق به موجودات کفزی است. این دلایل، قبل‌آنیز توسط محققین دیگر مورد تأیید قرار گرفته است، بطوریکه Paine، 1966؛ عبدالملکی و باقری، ۱۳۸۱ و باقری، ۱۳۷۸ بیان نمودند که تراکم موجودات کفزی با تعداد ماهیان کفزی خوار رابطه عکس دارد. از طرفی همزمانی بروز و تکرار پدیده خشکسالی در فصول بهار و تابستان با فصل تکثیر ماهیان امیرکلایه، بر میزان اثرات منفی این پدیده افزوده است. چنانکه کریمپور (۱۳۷۵) در تالاب انزلی، رومانووا (۱۳۸۳) در خزر شمالی، باقری (۱۳۷۸) در تالاب چفاخور و عبدالملکی و باقری (۱۳۸۱) در دریاچه پشت سد ارس به این روابط اشاره می‌نمایند.

در بحث تنوع گونه‌ای موجودات کفزی می‌توان به این نکته اشاره کرد که این شاخصها نیز به نوعی تحت تأثیر پدیده خشکسالی نوسان داشته است، بطوریکه میزان شاخصهای تنوع گونه‌ای شانون - وینر، غنای گونه‌ای منهینک و تنوع گونه‌ای سیمپسون در کل سال ۱۳۸۰ بیش از سالهای ۱۳۷۵-۷۶ بوده است. ولی همانگونه که بیان شد طی فصول و در ایستگاههای مختلف برتری با سال ۱۳۷۵-۷۶ می‌باشد. ضمن اینکه براساس شاخص غنای گونه‌ای مارگالف، میزان غنای گونه‌ای در سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۷۵-۷۶ کمتر و تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته بود، و فقط در فصل زمستان این مقادیر در سال ۱۳۸۰ بیش از سال ۱۳۷۵-۷۶ مشاهده شد. این وضعیت ناشی از افزایش سطح آب تالاب امیرکلایه در زمستان هر سال بدلیل نزولات جوی است. ضمن اینکه در این فصل علاوه بر افزایش تولید مثل موجودات کفزی، فعالیت تغذیه‌ای کپور ماهیان بدلیل افت درجه حرارت آب، کاهش می‌یابد. چنین حالتی را قبل‌آنیز باقری (۱۳۷۸) در تالاب چفاخور، عبدالملکی و باقری (۱۳۸۱) در دریاچه پشت سد ارس و رومانووا (۱۹۸۳) در خزر شمالی گزارش کرده‌اند.

تشکر و قدردانی

از جناب آقای دکتر رشیدی ریاست محترم، جناب آقای دکتر بیدرینغ معاونت محترم پژوهشی وقت، جناب آقای دکتر فخرایی معاونت محترم پژوهشی و اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و کارشناسان بخش اکولوژی مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی دریای خزر و سایر افرادی که مارا در اجرای این تحقیق یاری نمودند، نهایت تشکر و سپاس خود را اعلام می نمائیم.

منابع

- اوایع، ی. ۱۳۶۹. اجرای کار مؤثر در بررسیهای تعیین بار رودخانه‌های مرتبط با تالاب انزلی. مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان، بندر انزلی. صفحه ۱۷.
- باقری، س. ۱۳۷۸. شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک تالاب چاخور (استان چهارمحال و بختیاری). مجله علمی شیلات ایران، سال هشتم، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۵ صفحات ۳۷ تا ۵۳.
- بیضاپور، د. ۱۳۷۶. بررسی روند تغییرات اکوسیستمهای با استفاده از شاخصهای تنوع زیستی. فصلنامه محیط زیست، صفحات ۱۲ تا ۱۷.
- حسین پور، ن. ۱۳۶۹. تالاب انزلی و بارهای واردۀ بر آن. مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان، بندر انزلی. صفحه ۹.
- داودی، ف. ۱۳۷۳. بررسی بنتوزهای خورهای غزاله و احمدی در منطقه ماهشهر (استان خوزستان). مجله علمی شیلات ایران، سال سوم، شماره ۴، زمستان ۱۳۷۳. صفحات ۳۳ تا ۴۴.
- رومأنووا، ن. ۱۹۸۳. دستورالعمل آموزشی جهت بررسی و مطالعه بنتوزهای جنوبی اتحاد شوروی (سابق). مسکو، شوروی (سابق). ترجمه: عادلی، ی. ۱۳۷۴. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان، بندر انزلی، صفحات ۹ تا ۱۲.
- عبدالملکی، ش. ۱۳۷۲. نگاهی به چگونگی موجودات کفرزی ماقروفون در تالاب انزلی. مجله علمی شیلات ایران. سال دوم، شماره ۵، زمستان ۱۳۷۲. صفحات ۲۷ تا ۳۹.
- عبدالملکی، ش. و باقری، س. ۱۳۸۱. بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی مهرگان کفرزی دریاچه ارس. مجله علمی شیلات ایران، سال یازدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۱. صفحات ۱ تا ۱۱.

فوقی، م.، ۱۳۷۶. شناسایی و تعیین زیستوده موجودات کفرزی تالاب امیرکلایه. پایان نامه کارشناسی ارشد بیولوژی ماهیان دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۹۷ صفحه.

قاسم اف، ع.ح.، ۱۹۸۷. دنیای جانوران دریای خزر. ترجمه: دارایی، ن. ۱۳۷۱. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان، بندر انزلی. صفحه ۴۸.

کریمپور، م.، ۱۳۷۵. ماهیان تالاب انزلی. مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان، بندر انزلی. صفحات ۵ تا ۱۱.

نجات صنعتی، ع. ر.، ۱۳۷۳. بررسی مقدماتی اکولوژیک تالاب امیرکلایه لاهیجان. پایان نامه کارشناسی شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ۶۳ صفحه.

نظامی، ش. ع. و خارا، ح.، ۱۳۸۲. بررسی ترکیب گونه‌ای و فراوانی ماهیان تالاب امیرکلایه لاهیجان. مجله علمی شیلات ایران. سال دوازدهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۲. صفحات ۱۹۳ تا ۲۰۶.

نظامی، ش. ع.؛ خارا، ح.؛ سبک آرا، ج.؛ سلطانزاده، م. و دمشناس، ز.، ۱۳۸۲. بررسی رژیم غذایی لای ماہی (*Tinca tinca*) تالاب امیرکلایه لاهیجان. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره ۶۱، زمستان ۱۳۸۲، صفحات ۸۱ تا ۹۱.

نظامی، ش. ع.؛ خارا، ح. پاوند، پ.، ۱۳۸۳. بررسی رژیم غذایی سوف حاجی طرخان تالاب امیرکلایه لاهیجان. مجله علمی شیلات ایران، سال سیزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۳. صفحات ۲۰۱ تا ۲۲۰.

Ansari, Z.A. ; Sreepada, R.A. and Kanti, A. , 1994. Macrofaunal assemblage in the soft sediment of Marmugao Harbour, Goa (Central West of India). Indian Journal of Marine Sciences. Vol. 23, pp.231-235.

Brundin, I. , 1951. The relation of O₂ microstratification of mud surface to the ecology of profundal bottom fauna. Rep. Inst. Fresh water Res. Vol. 32, pp.8-12.

Elliott, J.M. , 1983. Some methods for the statistical analysis of samples of benthic invertebrates. Third Edition.?. 159P.

Fox, A.D. and Bell, M.C. , 1994. Breeding bird communities and environmental variable correlations of Scottish peatland wetlands-in Aquatic-Birds in the Trophic web of lakes.(ed. J.J. Kerekes). pp.207-307.

- Grzybkowska, M. , 1989.** Production estimates of the dominant of taxa Chironomidae (Diptera) in the modified, River Widawka and the natural, River Grabia, center Poland. *Hydrobiologia*. Vol. 179, pp.245-249.
- Jegadeesan, P. and Ayyakkannu, K. , 1992.** Seasonal variation of benthic fauna in marine zone of Cleroon estuary and in shore waters, southeast coast of India. *India Journal of Marine Science*. Vol. 21, pp.67-69.
- Jonasson, P.M. , 1972.** Ecology and production of profundal benthos in relation to phytoplankton in lake Esrom. *Oikos (Suppl)*. Vol. 14, pp.1-148.
- Lindesaard, P.C. , 1972.** An ecological investigation of the Chironomidae from a Danish lowland stream (linding A). *Arch. Hydrobiol.* Vol. 69, pp.465-507.
- Mellanby, H. , 1963.** Animal life in freshwater. Methuen & co ltd. London, UK. pp.55-69.
- Nezami, Sh.A. , 1993.** Nutrient load community structure and metabolism in the eutrophying Anzali lagoon Iran. PH.D Thesis I.Kusseuth University and Fish Culture Research Institute. Debrecen-Szarvas Hungary. 197P.
- Owen, T.L. , 1974.** Handbook of common methods in limnology. Institute of environmental studies and department of biology, Baylor University,Waco, texas, U.S.A. pp.120-130.
- Paine, R.T. , 1966.** Food web complexity and species diversity. *Am. Nat.* Vol.100, pp.65-75.
- Pandian, T.J. , 1987.** Sustainable clean water and aquaculture *Arch. Hydrobial.* Vol. 28. pp.333-343.
- Pennak, R.L. , 1953.** Freshwater invertebrate of the United States. The Ronald Press Company, New York, U.S.A. pp. 293-285.
- Pinder, L.C.V. , 1989.** Biology of freshwater chironomidae. *Ann.Rev. Ent.* Vol. 31, pp.1-23.
- Row, G.T. , 1971.** Fertility of the sea (ed. J.D. Costlow) Gordon 7 breach. *Sci. publ .New York*, U.S.A. 12P.

- Seather, O.A.** 1962. Larval overwintering in *Endochironomus tendens* Fabricius.
Hydrobiologia. Vol. 20, pp.377-381.
- Southwood, T.R.E and Henderson, P.A.** , 2000. Ecological Methods. third Edition.
Blackwell Science. 575P..
- Usinger, R.L.** , 1963. Aquatic Insects of California. London, Uk. pp.52-54.
- Welcome, R.L.** 1985. River Fisheries. FAO Fisheries Technical Report. Rome, Italy.
pp.87-91.

Investigation on drought effects on diversity, frequency and distribution of benthic fauna in Amirkelayeh Wetland

Nezami Sh.A. ⁽¹⁾ and Khara H. ⁽²⁾

sha_nezami2004@yahoo.com

1- Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 14155-6116 Tehran, Iran

2- Dept. of Fishery, Islamic Azad University, Lahijan Branch, P.O.Box: 1616
Lahijan, Iran

Received: January 2004

Accepted: November 2004

Keywords: Benthic, Amirkelayeh wetland, Lahijan, Iran

Abstract

The Possible effects of dry years 1998-2000 on benthic organisms of Amirkalayeh Wetland was studied in the year 2001. Six sampling stations were defined where we seasonally collected benthics organisms using a grab sampler. We identified nine benthic organisms belonging to class Hirudina and orders Odonata and Ephemeroptera and also six families Chironomidae, Chaoboridae, Ammaridae, Tubificidae, Xanthidae and Culicidae. Families Xanthidae and Culicidae had not been reported before for the wetland while orders Coleoptera and Trichoptera and families Planorabidae, Limnaeidae, Coleoptera which were present before the drought, were not detected in the samples. We observed a significant decrease in frequency of benthic organisms changing from 1372 organisms per square meter in 1997 to 165 in 2001.

Also, tests showed considerable change in benthic diversity, species richness and distribution in different sampling seasons and stations over the year 2001. These changes may be attributed to the decrease in water depth, dissolved oxygen, available food and increase in water temperature and predation.