

انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف

شهروز برادران نویری^(۱)، محمد پور کاظمی^(۲)، پریتا کوچینین^(۲) و
وحید یاوری^(۳)

sbn170@yahoo.com

۱- انسستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۴۶۴

۲- دانشکده علوم دریایی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

تاریخ پذیرش: شهریور ۱۳۸۴ تاریخ ورود: آبان ۱۳۸۴

چکیده

امروزه سعی بر این است که با کاربرد فنون مختلف تا حد امکان از لقادیر بدون برنامه جمعیت های مولدین در مراکز تکثیر مصنوعی آبیان جلوگیری بعمل آمده و با کاربرد روش های صحیح، نژادهای مناسب پرورش داده شوند.

آزمایشات انجماد اسپرم ماهی کپور بر روی مولدین در دو مرکز تکثیر و پرورش کپور ماهیان شهرستان رشت صورت گرفت. طی این آزمایشات کیفیت اسپرم مولدین، از نظر نوع حرکت، مدت حرکت، تراکم و لقادیر برسی شد. نمونه های مناسب از نظر کیفی انتخاب شده و سپس تیمارها با ۴ نوع محلول رقیق کننده مختلف تهیه گردیدند. پس از طی ۷ روز اسپرم های منجمد، مجدد از انجماد خارج شده و از آنها برای لقادیر تخمکهای تازه مولدین ماده استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که از بین چهار رقیق کننده منتخب و روش های بکار رفته، محلول Alsever با نسبت ۱:۱ و روش سرمادهی چند مرحله ای برتری با ۴۵ درصد لقادیر، ۴۷/۸۱ تخم چشم زده و ۲۲/۶۳ درصد تبدیل تخم به لارو، بهترین نتیجه را داد.

لغات کلیدی: ماهی کپور، انجماد، اسپرم

مقدمه

از ابداع روش‌های اولیه تکثیر و پرورش ماهی کپور (*Cyprinus carpio*) به روایت تاریخ حدود ۲۷۰۰ سال می‌گذرد.

براساس آمار رسمی منتشر شده FAO، میزان تولید پرورشی ماهی کپور در سطح جهان در سال ۱۹۹۵ معادل ۱۷۸۳۴۲۰ تن بوده است که از میان ۷۹ کشوری که در این زمینه فعالیت دارند، کشور چین با ۱۳۹۸۶۱۸ تن، بیشترین میزان تولید را بخود اختصاص داده است. از این میان جمهوری اسلامی ایران، با تولید ۶۵۶۱ تن مقام سیزدهم را کسب کرده است (امینی، ۱۳۷۷).

با پیشرفت فناوری و ساخت ادوات تکنیکی پیشرفته، سعی بر این است که حتی الامکان از لفاح بدون برنامه در جمیعت‌های مولدین در مراکز تکثیر مصنوعی آبزیان جلوگیری بعمل آمده و با کاربرد روش‌های گوناگون، نزادهای مناسب و مفرون به صرفه پرورش داده شوند (Moczarski, 1977).

Blaxter در سال ۱۹۵۳ اولین کسی بود که توانست اسپرم ماهی (*Clupea harengus*) را بد مدت ۶ ماه زنده نگهدارد (Kerby, 1983). از آن زمان به بعد بدجهت سهولت در کسب نتایج بهتر، بر روی نگهداری اسپرم بسیاری از گونه‌های سرد آبی از جمله فزل آلای رنگین‌کمان (*Oncorhynchus mykiss*)، فزل آلای قهوه‌ای (*Salmo trutta*), ماهی آزاد اقیانوس اطلس (*S. salar*) و سایر آزاد ماهیان از جمله *O. tshawyscha*, *O. gorbuscha*, *O. kisutch*, *O. nerka*, *Oncorhynchus keta* تحقیقات بی در بی، موفقیت‌های بیشتری حاصل گردیده است (Kerby, 1983).

کار بر روی انجماد اسپرم ماهیان گرمابی نیز از دهه ۶۰ میلادی با کار Sneed & Clemens بر روی ماهی کپور آغاز گردید (Koldas & Bieniarz, 1987). همچنین تحقیقاتی در مورد لای ماهی توسط Moczarski & Koldras (*Tinca tinca*) در سال ۱۹۸۲ انجام شده است. این دو محقق در سال ۱۹۸۳ بر روی اسپرم اردک ماهی (*Esox lucius*) نیز کار کرده و ۷۵ درصد لفاح بدست آورده‌اند (Koldas & Moczarski, 1983). یک گروه چینی به سرپرستی Chen در سال ۱۹۹۲ بر روی کپور ماهیان چینی (آمور *Ctenopharyngodon idella* و فیتوفاگ *Hypophthalmichthys molitrix*) کار

کرده و ۶۰ درصد موفقیت گزارش نموده‌اند. همچنین Linhart و همکاران در سال ۱۹۹۳ با استفاده از اسپرم منجمد ماهی اسپلید (*Silurus glanis*) توانستند ۴۵ درصد لقاح بدست آورند. در این تحقیق به منظور ارائه بهترین دستورالعمل احرانی، انجام اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق‌کننده‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله با نتایج سایر محققین مقایسه و بحث شده است.

مواد و روش کار

ماهیان کپور نر مولد در این تحقیق از مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید انصاری، واقع در ۲۰ کیلومتری جاده رشت - تهران و همچنین از کارگاه تکثیر و پرورش گلباف، واقع در ۵ کیلومتری جاده رشت - لakan تهیه شدند. عمل انجاماد اسپرم و نگهداری نمونه‌ها در انتستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری سد سنگر شهرستان رشت انجام شد.

مولдин ۲۴ ساعت قبل از اسپرم‌گیری و تخم‌کشی در آب ۲۰ درجه سانتی‌گراد تحت تزریق عصاره هیپوفیز ماهی کپور، به میزان ۲/۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای ماده‌ها و ۱ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای نرها قرار گرفتند (Moczarski & Koldras, 1982).

محدوده منفذ ادراری تناسلی مولдин هنگام اسپرم‌گیری با حوله کاملاً خشک شده (Christ et al., 1996) و به آرامی با ماساژ شکمی از آنها اسپرم تهیه شد (Kurokura et al., 1984). نمونه‌های خونی یا نمونه‌های حاوی ادرار یا مدفعه جهت انجاماد مورد استفاده قرار نگرفتند (Baynes & Scott, 1987). برای شمارش اسپرماتوزوئیدها و تعیین تراکم آنها از لام هموسیوتومتر (Thoma haemocytometer) (West Germany) با دقیقه 0.025 ± 0.000 میلی‌مترمربع استفاده شد (Koldras et al., 1990). از آنجایی که تراکم اسپرماتوزوئیدها در نمونه‌ها بسیار زیاد بود، هر نمونه جهت تعیین تراکم 400 بار رقيق شد. جهت رقيق کردن نمونه‌های اسپرم، ابتدا اسپرم و محلولهای رقیق‌کننده بطور جداگانه در مخلوط آب ویخ (۱ تا ۲ درجه سانتی‌گراد) بد مدت ۵ دقیقه هم دما شده و سپس مخلوط می‌شدند (Babiak et al., 1990).

انجمناد اسپرم ماهی کیبور با استفاده از ...

نگهداری اسیر متنقل شدند. مدت چند بار هم زده شدند (Moczarski & Koldras, 1982). سپس در همان دما، به محفظه‌های مدت چند بار هم زده شدند (1982). پس از اختلاط، محلول‌های بدست آمده در آب و یخ به مدت یک ساعت قرار گرفته و طی این

پس از تهیه مخلوط اسپرم و رقیق‌کننده و پر کردن محفظدها، مرحله سرماده‌ی به دو روش به شرح زیر انجام گرفت:

نوع اول، فرو بردن مستقیم در ازت مایع (۱۹۶- درجه سانتی گراد) و نوع دوم، روش سرمادهی چهار مرحله‌ای که شامل نگهداری در ۱۰ سانتیمتری بالای سطح ازت مایع به مدت ۵ دقیقه، سپس ۳ سانتیمتری بالای سطح ازت مایع به مدت ۳ دقیقه دیگر، پس از آن مماس با سطح ازت مایع به مدت ۲ دقیقه و سرانجام فرو بردن در ازت مایع بود (Moczarski, 1977).

انجماد زدایی پایوتها در آب ۴۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ ثانیه (Linhrat *et al.*, 1983) صورت گرفت.

آزمایش لقاح اسپرمهای انجماد زدایی شده به نسبت ۵٪ میلی لیتر اسپرم خالص با ۵۰ میلی لیتر تخمک تازه مولدین ماده (Koldras & Bieniarz, 1987) در تشک های پلاستیکی انجام گرفت. محلولهای رقیق کننده مورد استفاده در این تحقیق شامل محلولهای (Moczarski, 1977). Alsoever محلول (Linhart et al., 1983) Linhart (Kurokura et al., 1984) Kurokura و محلول (Koldras & Bieniarz, 1987) Modified Cortland آورده شده است.

به هر کدام از محلولها مقدار 5 IU/cc آستی بیوتیک پنی سیلین G پتاسیم (داروسازی جابرین حیان، آبران) و 15 درصد DMSO (Merck, Germany) افزوده شد (Billard *et al.*, 1995).

برای رفع جسبندگی تخمها از محلول لقاح واینارویچ (Woynarovich) استفاده گردید. این محلول شامل ۳۰ گرم اوره (Urea) و ۴۰ گرم نمک (NaCl) در ۱۰ لیتر آب است (Billrad *et al.*, 1995). این محلول طی ۴۵ دقیقه با تخم لقاح یافته هم زده شده و طی این مدت چندین بار در تشیک‌های لقاح

تعویض گردید. پس از این مدت تمام تخمها تا ۴۵ دقیقه دیگر با آب کارگاه به آرامی هم زده شدند. طریقه

لکاح اسپرم شاهد نیز در روز اسپرم‌گیری به روش مشابه بود.

بررسی‌های آماری به کمک نرم‌افزار Statgraphics ver.5 از طریق آنالیز واریانس و آزمون توکی انجام

گرفت.

جدول ۱: ترکیب شیمیایی محلول‌های رتیق کننده اسپرم ماهی کپور مورد استفاده

نام محلول	Al.	Ku.	M.C.	Li.
نوع ترکیب				
NaCl	./۴	./۲۴	./۱۸۸	./۷۵
CaCl ₂		./۰۲۲	./۰۲۳	
KCl		./۶۲	./۷۲	./۰۳۸
NaH ₂ PO ₄ ,H ₂ O			./۰۴۱	
MgSO ₄ ,7H ₂ O			./۰۲۳	
MgSO ₄ ,7H ₂ O				
NaHCO ₃		./۰۲	./۱	./۲
Glucose	۲/۰۵		./۱	./۱
C ₆ H ₅ O ₇ Na ₃ , 2H ₂ O	./۸			
Sucrose				
MgCl ₂		./۰۰۸		

موارد فوق بر حسب گرم در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر می‌باشد.

* محلول Al

* محلول Ku

* محلول M.C.

* محلول Li

نتایج


ظریف اجرای این پژوهش، از ۲۱ عدد ماهی کپور نر مولد اسپرم‌گیری بعمل آمد که میانگین تراکم اسپرماتوزوئید در نمونهای $ml/10^9 = 27.086 \pm 2.991$ و محدوده این تراکم $ml/10^3 = 16.09 \times 21.2 - 36.09$ بود.

شمارش اسپرماتوزوئیدها به کمک لام هموسیتوومتر و در رفت‌های مختلف آزمایش گردید. چندین نمونه با رفت‌های ۱:۱۰، ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰ و ۱:۴۰۰ شمارش گردید و مشخص شد که اسپرماتوزوئید ماهی کپور بد خوبی با بزرگنمایی ۴۰ برابر قابل تشخیص می‌باشد. لیکن بهترین رقت برای شمارش اسپرم کپور، نسبت ۱:۴۰۰ است. زیرا با توجه به تراکم بالای اسپرماتوزوئید کپور، تفکیک آنها در این رقت در زیر میکروسکوپ بخوبی انجام شده و هر اسپرماتوزوئید از اسپرماتوزوئیدهای مجاور بخوبی قابل تشخیص است (شکلهای ۱ و ۲).


با اندازه‌گیری اسپرماتوزوئیدها با بزرگنمایی ۴۰۰ برابر آشکار شد که میانگین قطر سر آنها ($N=67$) 17.61 ± 0.212 میکرومتر و میانگین طول تازک آنها معادل ($N=67$) 16.35 ± 0.755 میکرومتر است. در آزمایش حاضر از نمونهای اسپرم با تراکم بیش از $ml/10^5 = 25$ اسپرماتوزوئید در هر میلی لیتر و تحرک بیش از ۸۰ درصد جهت انجماد استفاده شد.

فروبردن مستقیم نمونه‌های حاوی اسپرماتوزوئید و محیط رقیق‌کننده در ازت مایع و بدون رعایت مراحل تدریجی سرمادهی، سبب لخته شدن نمونه‌ها شده و از آنجایی که در این اسپرمها هیچگونه تحرکی دیده نشد، درصد لفاح‌های بدست آمده نیز صفر بود. در حالی که انجماد با رعایت سرمادهی تدریجی (چند مرحله‌ای)، بقاء و تحرک اسپرماتوزوئیدها را حداقل پس از دو ماه نگهداری در ازت مایع تضمین می‌کند.

پس از بررسی میزان تحرک اسپرماتوزوئیدها در محلول‌های رقیق‌کننده و پس از انجماد زدایی نمونه‌های نگهداری شده، هر یک از تیمارها با تخمک تازه، لفاح داده شد که نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که محلول Alsever بالاترین درصد لفاح را داشته است ($p < 0.001$ ، $df = 3$ ، $F = 6.809$) (جدول ۱).



شکل ۱: نمونه اسپرم ماهی کپور پس از رنگ آمیزی با بزرگنمایی ۱۰۰ برابر



شکل ۲: نمونه اسپرم ماهی کپور پس از رنگ آمیزی با بزرگنمایی ۴۰۰ برابر

جدول ۲: مقایسه درصدهای لقاح، تخم چشم زده و درصد تبدیل تخم به لارو از اسپرم منجمد ماهی کپور در رقیق‌کننده‌های مختلف

نام محلول	مدت نگهداری در ازت مایع	نسبت اسپرم به تخم	درصد لقاح شاهد نمونه	درصد تخم چشم زده شاهد	درصد تبدیل تخم به لارو
Al.	۷ روز	$317/12 \times 10^{-3}$	۴۰	۱۸	۴۷/۸۱
Ku.	۷ روز	$317/12 \times 10^{-3}$	۴۰	۸/۲	۱۸/۴۵
Li.	۷ روز	$317/12 \times 10^{-3}$	۴۰	۹/۳۳	۱۹/۱۱
M.C.	۷ روز	$317/12 \times 10^{-3}$	۴۰	<۱	۶/۳۶

بحث

کاربرد روش‌های موفقیت‌آمیز انجماد اسپرم در مقیاس آزمایشگاهی برای مدیریت ذخایر طبیعی و مراکز تکثیر اهمیت بسزایی دارد که با توجه به امکانات موجود و هدف کار، تنوع گسترهای پیدا کرده است.

تراکم اسپرماتوزوئید ماهی کپور در مولдин مختلف، طیف وسیعی را شامل می‌شود. بطوریکه Lubzens و همکاران در سال ۱۹۹۷، میانگین تراکم اسپرماتوزوئید را برای آزمایشات خود 15×10^9 اسپرماتوزوئید در هر میلی‌لیتر عنوان کرده و مذکور گردیدند که با افزایش اختلاط اسپرم مولдин بیشتر، می‌توان اثر اختلاف تراکم اسپرم مولдин را برای هر آزمایش کاهش داد. Babiak و همکاران در سال ۱۹۹۷ نیز برای آزمایشات انجماد اسپرم ماهی کپور به روش پلت، از نمونه‌های با تراکم $24/5 \times 10^9$ اسپرماتوزوئید در هر میلی‌لیتر استفاده کردند. در آزمایش حاضر از نمونه‌های اسپرم با تراکم بیش از 25×10^9 اسپرماتوزوئید در هر میلی‌لیتر و تحرک بیش از 80 درصد جهت انجماد استفاده شد.

برای نخستین بار Moczarski در سال ۱۹۷۷ پس از انجماد اسپرم ماهی کپور با محلول رقیق‌کننده Alsever $16/2$ درصد لارو بدست آورد. البته در کار وی به نسبت اسپرم به تخمک بکار رفت، اشاره‌ای نشده است. Linhart و همکاران در سال ۱۹۸۳ نیز توانستند با استفاده از اسپرم منجمد شده کپور به

نسبت ۱:۱، با محلول رقیق کننده Linhart و نسبت اسپرم به تخمک $10 \times 599-258$ تا 79 درصد لارو بدست آورند. Cognie و همکاران در سال ۱۹۸۹ در آزمایش خود درصد تحرک اسپرماتوزوئید را 70 تا 80 درصد گزارش کردند (بدون ذکر مدت زمان انجماد) و پس از لقاح نیز با توجه به این که نسبت اسپرم به تخمک بکار رفته را تا 100 برابر شاهد افزایش داده بودند، اما حداکثر 40 درصد لقاح بدست آوردن (Billard *et al.*, 1995) Kurokura و همکاران در سال ۱۹۸۴ با استفاده از محلول Kurokura از 1 میلی لیتر اسپرم کپور جهت لقاح 50 گرم تخمک استفاده کردند و 11 درصد لقاح بدست آوردن. در آزمایش حاضر با استفاده از این محلول و استفاده $5/0$ میلی لیتر اسپرم جهت لقاح 50 گرم تخمک (نصف مقدار اسپرم مصرفی در آزمایش گروه Kurokura)، درصد لقاح $8/2$ درصد بوده است. همچنین ایشان با افزایش نسبت اسپرم منجمد شده به تخمک تا حد 1 میلی لیتر اسپرم برای لقاح یک گرم تخمک، حداکثر $43/4$ درصد لقاح بدست آورند.

Chen و همکاران در سال ۱۹۹۲ با استفاده از 1 میلی لیتر اسپرم منجمد برای لقاح 5 میلی لیتر تخمک کپور ماده، حداکثر 80 درصد لقاح با درصد هج شدن 75 درصد بدست آورند، اما ذکری از میزان ترکیبات شیمیایی در محلولهای بکار رفته نکردند. در سال ۱۹۹۷، Babiak و همکارانش با استفاده از تکنیک انجماد به روش پلت با نسبت $1/5-2/4 \times 10^6$ اسپرم برای هر تخمک، به 52 درصد لارو دست یافتند. در آزمایش این گروه، عملیات انجماد زدایی بلافاصله پس از انجام مراحل سرمادهی صورت گرفت.

البته همانگونه که ذکر شد، چنانچه هدف از انجماد اسپرم، استفاده های کاربردی آن باشد مسلماً تنها ذکر درصد تحرک اسپرماتوزوئیدها (که توسط بسیاری از محققین به کار برده شده است) کافی نیست. زیرا تخمین تحرک و محاسبه زمانی آن عاری از خطای نمی باشد. بنابراین بهتر است که نمونه های اسپرم منجمد شده با لقاح نیز آزمایش شوند (آذری تاکامی و کهنه شهری، ۱۳۵۳). بسیاری از محققین معتقدند که اگرچه بین تحرک اسپرماتوزوئید و میزان لقاح آن رابطه مستقیم وجود دارد، اما این دو قابلیت را باید بعنوان دو پدیده متفاوت در نظر گرفت (Moczarski, 1977 ; Gwo, 1993).

بدیهی است که به دلیل اثرات سرمایی شدید بر اسپرماتوزوئیدها، تعداد زیادی از آنها قادر تحرک و باروری خود را از دست می‌دهند و این امر را می‌توان با افزایش نسبت اسپرم به تخمک در لقاح بهبود بخشید. این مسئله یکی از مهم‌ترین نکاتی است که بسیاری از محققین پس از انجمادزدایی و لقاح مقایسایی به آن اشاره نکرده‌اند (Koldras & Mejza, 1983). نکته مذبور حاکی از آن است که برای معرفی یک روش استاندارد برای ارزیابی کیفیت و قدرت باروری اسپرماتوزوئیدها، ازاند نسبت اسپرماتوزوئید مورد استفاده به تخمک در هر آزمایش امری ضروری است. همچنین باید یادآور شد که روش سرمادهی و طول مدت نگهداری در ازت مایع نیز می‌تواند در کیفیت لقاح پس از انجمادزدایی اثرات مختلفی داشته باشد و ذکر روش کار و مدت نگهداری بیز از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد (Stoss, 1983).

تشکر و قدردانی

از همکاری صمیمانه جناب آقای مهندس طلوعی، سریرست محترم وقت مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهید انصاری رشت و کارشناسان بخش تکثیر آن مجتمع و همچنین از زحمات آقای دکتر سعید رحمت سمیعی، مدیریت محترم مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی گلباف رشت در طول اجرای این پژوهش تشکر می‌گردد. همچنین از همکاری آقای مهندس وفا آق‌نومان در تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، قدردانی بعمل می‌آید.

منابع

- آذری تاکامی، ق. و کهن‌شهری، م.، ۱۳۵۳. تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری. انتشارات دانشگاه تهران، صفحات ۵۶ تا ۷۲.
- امینی، ع.، ۱۳۷۷. وضعیت تولید جهانی پنج گونه ماهی پرورشی در سال ۱۹۹۵. آبزی پرور، شماره ۲۱.

سال ششم، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران. صفحات ۴۰ تا ۴۲.

Babiak, I. ; Glogowski, J. ; Brzuska, E. ; Suemiec, J. and Adamek, J. , 1997.

Cryoprotection of sperm of common carp, *Cyprinus carpio* L. Aquacul. Res., Vol. 28, pp.567-571.

Baynes, S.M. and Scott, A.P. , 1987. Cryopreservation of rainbow trout spermatozoa: the influence of sperm quality, egg quality and extender composition on post-thaw fertility. Aquaculture. Vol. 66, pp.53-67.

Billard, R. ; Cosson, J. ; Perche, G. and Linhart, O. , 1995. Biology of sperm and artificial reproduction in carp. Aquaculture. Vol. 129, pp.95-112.

Chen, S.L. ; Lio, X.T. ; Lu, D.C. ; Zhang, L.Z. ; Fu, C.J. and Fang, J.P. , 1992. Cryopreservation of spermatozoa of silver carp, common carp, blunt snout bream and grass carp. Acta Zoologica Sinca. Vol. 38, No. 4, pp.413-424.

Christ, S.A. ; Toth, G.P. ; McCarthy, H.W. ; Torsella, J.A. and Smith, M.K. , 1996. Monthly variation and sperm motility in common carp assessed using computer-assisted sperm analysis (CASA). Journal of Fish Biol. Vol. 48, pp.1210-1222.

Gwo, J.C. , 1993. Cryopreservation of black grouper (*Epinephelus malabaricus*) spermatozoa. Theriogenology. Vol. 39, pp.1331-1342.

Kerby, J.H. , 1983. Cryogenic preservation of sperm from striped bass. Trans. Am. Fish. Soc. Vol. 112, No. 1, pp.86-94.

Koldras, M. and Bieniarz, K. , 1987. Cryopreservation of carp sperm. Pol. Arch.

Hydrobiol. Vol. 34, No. 1, pp.125-134.

Koldras, M. ; Bieniarz, K. and Kime , D.E. , 1990. Sperm production and steroidogenesis in testes of the common carp, *Cyprinus carpio* L. at different stages of maturation. Journal of Fish Biol. Vol. 37, pp.635-645.

Koldras, M. and Mejza, T. , 1983. Effects of quantity and quality of carp sperm on egg fertilization success. Acta Ichthyologica et Piscatoria. Vol. 13, No. 2, pp.83-92.

Koldras, M. and Moczarski, M. , 1983. Properties of Pike, *Esox lucius* L. milt and its cryopreservation. Pol. Arch. Hydrobiol. Vol. 30, No. 1, pp.69-78.

Kurokura, H. ; Hirano, R. ; Tomita, M. and Iwahashi, M. , 1984. Cryopreservation of carp sperm. Aquaculture. Vol. 37, pp.267-273.

Lihart, O. ; Billard, R. and Proteau, J.P. , 1993. Cryopreservation of European catfish (*Silurus glanis* L.) spermatozoa. Aquaculture. Vol. 115, pp.347-359.

Linhart, O. ; Liehman, P. and Rab, P. , 1983. The first results in cryopreservation of carp sperm. Buletin VURH Vodnany. Vol. 2, pp.3-13.

Lubzens, E. ; Daube, N. ; Pekarsky, I. ; Magnus, Y. ; Cohen, A. ; Yusefovich, F. and Feigin, P. , 1997. Carp (*Cyprinus carpio* L.) spermatozoa cryobanks, strategies and research and application. Aquaculture. Vol. 155, pp.13-30.

Moczarski, M. , 1977. Deep freezing of carp, *Cyprinus carpio* L. sperm. Bull. Lacad. Polo. Scie. Vol. 25, No. 3, pp.187-190.

Moczarski, M. and Koldras, M. , 1982. Properties of tench-*Tinca tinca* L.-sperm and

experiments with freezing it at -196°C. *Acta Ichthyol. Piscatoria.* Vol. 12, No. 2, pp.41-49.

Stoss, J. , 1983. Fish gamete preservation and spermatozoan physiology. *In: Fish physiology.* Vol. IX. Reproduction, Part B., Behaviour and fertility control (eds. W.S. Hoar ; P.J. Randall and E.M. Donaldson) Academic Press. pp.305-341.

Cryopreservation of carp spermatozoa by different extenders

Baradaran Noveiri SH.⁽¹⁾; Pourkazemi M.⁽²⁾; Kouchinian P.⁽³⁾ and Yavari V.⁽⁴⁾

sbn170@yahoo.com

1,2 - International Sturgeon Research Institute, P.O.Box: 41635-4364
Rasht, Iran

3,4- Marine Science Faculty, Shahid Chamran University, Ahwaz

Recieved: September 2004 Accepted: November 2005

Keywords: Carp, Cryopreservation, Sperm

Abstract

Production and storage of the best gametes are practices undertaken by fishery managers and researchers to improve fish reproduction technology and obtain the best spawners. The male spawners of carp (*Cyprinus carpio*) were chosen from two warm-water fish hatcheries near Rasht, Guilan Province. For the study, duration of motility of sperms, sperm density and fertilization rate were considered.

The best samples were chosen for cryopreservation with four different extenders and were checked by fertilization tests after seven days of preservation in liquid nitrogen. Results showed that by 1:1 dilution rate, the Alsever solution had the best results. The fertilization rate, production of eyed eggs and larvae by this extender in a multistage cooling experiment were 45%, 47.81% and 22.63% respectively.