

بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی (*Penaeus merguiensis*) در استان هرمزگان

علی اکبر صالحی^(۱) و غلامعباس زرشناس^(۲)

Salehi20022002@yahoo.ie

- ۱- مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی، گرگان صندوق پستی: ۱۳۹
 ۲- مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۱۶
 تاریخ پذیرش: فروردین ۱۳۸۴

چکیده

این طرح بمنظور بررسی امکان تکثیر میگوی موزی *Penaeus merguiensis* در کارگاه تکثیر کلاهی اجرا شد. در تاریخ ۷/۳/۸۱ عدد مولد میگوی موزی از صیدگاههای منطقه سیریک صید و به کارگاه تکثیر مذکور حمل گردید. میگوهای مولد در دو حوضجه ۶ تنی به تعداد مساوی ذخیره سازی شدند. برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب شامل اکسیژن برابر با ۶ میلیگرم در لیتر، دمای آب ۳۰ درجه سانتیگراد، شوری ۳۲ گرم در لیتر و pH=۸/۲ در هر روز در دو نوبت اندازه گیری و تا آخر مرحله تکثیر ثابت نگه داشته شدند.

از هر عدد مولد میگوی موزی بطور میانگین در حوضجه اول، ۱۳۸۶۰۰ عدد و در حوضجه دوم ۱۶۰۰۰۰ تولید گردید، که پس از ۲۱ روز در حوضجه اول، ۴۳۷۶۶ عدد و از حوضجه دوم، ۳۳۶۰۰ عدد پست لارو ۱۵ روزه بدست آمد. درصد بازماندگی از مرحله ناپلی تا پست لارو ۱۵ روزه بترتیب ۳۱ و ۲۱ درصد محاسبه گردید. تقدیم از مرحله N₆ بوسیله زی شناور گیاهی کیتوسوروس شروع و در مراحل مایسیس و پست لارو بوسیله آرتیما ادامه یافت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تکثیر این گونه میگو براحتی امکانپذیر میباشد.

لغات کلیدی: میگوی موزی، *Penaeus merguiensis*، تکثیر، استان هرمزگان

مقدمه

در کشور فیلیپین ۶ گونه با اهمیت از جنس پنشوس وجود دارد که از میان آنها میگوی مونودون، ایندیکوس و موزی به دلیل رشد سریع برای پرورش در استخر انتخاب شده‌اند (Bagarinao, 1986).

میگوی موزی در ایران معمولاً به همراه میگوی سفید هندی در آبهای ساحلی و دریایی صید می‌گردد. این گونه در حوضه استان هرمزگان بعنوان گونه غالب در صید منطقه محسوب شده که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کل صید

پراکنش میگوی موزی در جهان بیشتر در جنوب شرقی آسیا (تایلند، سنگاپور، اندونزی، مالزی و ایران) و در قسمتهای مرکزی اقیانوس هند و آرام می‌باشد (شکیبازاده، ۱۳۷۹ و دندانی، ۱۳۷۵). این گونه بعنوان یک گونه مهم پرورشی و اقتصادی در استرالیا و کوئینزلند محسوب می‌گردد (Lobegeiyer & Hoany, 2001).

حاضر گونه میگوی سفید هندی تنها گونه پرورشی در آبهای جنوبی ایران میباشد، محدود بودن ذخایر گونه فوق از یک سو و توسعه روز افزون صنعت پرورش میگو از سوی دیگر، آینده این صنعت را با مشکل مواجه میسازد. زیرا در صورت بروز هر گونه مشکلی (بیماری، کمبود مولد و ...) برای میگوی سفید هندی موجب به خطر افتادن پرورش میگو و سرمایه‌گذاری های انجام شده در جنوب کشور میشود. بنابراین لازم است گونه‌های دیگر بخصوص گونه‌های بومی مورد تکثیر و پرورش قرار گیرند و عوامل مهم در این امر مورد شناسایی قرار گیرند.

مواد و روش کار

وجود ذخایر میگوی موزی در آبهای هرمزگان سبب شده است تا مولдин این گونه را بتوان به راحتی به میزان زیاد بدست آورد.

در تاریخ ۱۳/۷/۸۱ تهیه مولдин میگوی موزی برای تکثیر با هماهنگی اداره کل شیلات هرمزگان، ۱۲ عدد میگوی مولد توسط شناورهایی که میگوی مولد سفید هندی در خور آذینی در منطقه سیریک صید می نمودند، تحویل مجری طرح گردید.

مولдин صید شده بوسیله تانک حاوی آب دریا که توسط بخ دمای آن به ۲۷ درجه سانتیگراد کاهش یافته و با کپسول هواده می شد، به مرکز تکثیر کلاهی منتقل شدند.

قبل از اینکه مولдин در حوضچه‌های تکثیر رهاسازی شوند به هر کدام از حوضچه‌های آبگیری شده که دارای دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و شوری ۳۲ قسمت در هزار (۳۲ppt) بودند، میزان ۱۰ ppm ماده EDTA (۲۷ گرم در ۲/۷۰۰ مترمکعب آب) درون حوضچه اضافه گردید.

میگوهای مولد پس از ورود به کارگاه تکثیر کلاهی حدود ۱۵ دقیقه از نظر دما و شوری سازگار شده و سپس بوسیله محلول فرمالین ۱۰۰ ppm (۲۰ سی در ۲۰ لیتر آب) به مدت حداقل ۳ تا ۵ دقیقه ضد عفونی گردیدند. بعد از آن، بطور جداگانه و به تعداد ۶ عدد در هر حوضچه رهاسازی شدند، بر روی حوضچه‌ها جهت ایجاد محیط آرام و ساكت روپوش سیاه رنگ قرار داده شد.

استان را تشکیل می‌دهد (زرشناس، ۱۳۷۰). محدوده گسترش آن از جزیره قشم در استان هرمزگان تا منطقه خلیج گواتر (در استان سیستان و بلوچستان) می‌باشد. زیستگاه عمده بچه میگوهای این گونه در خوریات پوشیده از درختان حراست که ادامه آنها در نوار ساحلی می‌باشد (Lim et al., 1987). پراکنش این گونه در آبهای استان هرمزگان از جزیره هرمز تا بندر سیریک گسترش داشته و با نزدیک شدن به سمت آبهای استان سیستان و بلوچستان از تراکم آن کاهش می‌یابد، بطوریکه در خلیج گواتر کمتر از ۶ درصد کل صید منطقه را تشکیل می‌دهد. میگوهای بالغ گونه مذکور در آبهای استان هرمزگان طی ماههای دی تا اسفند در اعماق ۵ تا ۶ متری و در اردیبهشت ماه در اعماق ۲ تا ۳ متری یافت می‌شود و اوج تخم‌ریزی آن در این استان در اردیبهشت و خرداد ماه رخ می‌دهد (زرشناس، ۱۳۷۰ و شکیبازاده، ۱۳۷۹). تخم‌ریزی معمولاً در شب (بین ساعت ۲۲ تا ۲ با مداد) صورت گرفته و با رهاسدن همزمان تخمها و ترکیب با اسپرم درون کیسه اسپرم میگوی ماده انجام می‌شود. هر میگوی مولد موزی در هر بار تخم‌ریزی از ۳۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ عدد تخم رها می‌کند (Lim et al., 1987).

غذای اصلی میگوهای بالغ را لارو ماهی، بی‌مهرگان کوچک، نوزادان سخت پوست، پرتاران، دیاتومه و انواع جلبکها تشکیل می‌دهد (Lim et al., 1987). طول میگوی موزی در هنگام بلوغ در مناطق مختلف از ۱۲۵ تا ۱۵۲ میلیمتر متغیر است و همانند اکثر میگوها ماده‌ها معمولاً در سن یکسان از نرها بزرگتر می‌باشند و حد اکثر اندازه میگوهای نر به ۱۷۵ و میگوهای ماده به ۲۴۳ میلیمتر می‌رسد (Seed production team, 1984).

تکثیر و پرورش میگوی موزی در ایران با سایر کشورها قابل مقایسه نیست و بر روی آن تحقیقات و مطالعات اصولی صورت نگرفته است. با توجه به کیفیت، بازارپسندی و پراکنش گونه‌های مهم تجاری در ایران گونه موزی در استان هرمزگان، گونه ببری سبز در استان بوشهر و گونه سفید سرتیز در استان خوزستان، مقرر گردید تا اولین مرکز تکثیر و پرورش میگو در منطقه بندر کلاهی در استان هرمزگان احداث شود. در اوایل سال ۱۳۷۱ کار بر روی این گونه آغاز گردید که نتایج تکثیر آن زیاد امیدوارکننده نبود و بسیار ناچیز بود. نظر به اینکه در حال

نتایج

نتایج حاصل از تکثیر میگوی موزی نشان داد در حوضچه های شماره ۱ از تعداد ۶ عدد میگوی مولد نگهداری شده، فقط ۳ عدد از آنها تخریزی نمودند (جدول ۱)، که جمعاً تعداد ۴۱۵۸۰۰ ناپلی حاصل گردید. از این مقدار ناپلی، تعداد ۱۳۱۳۰۰ عدد پست لارو ۱۵ (PL₁₅) بدست آمد (شکل ۱). در مراحل مختلف لاروی تغذیه بترتیب بازی شناور گیاهی (کیتوسروس) و سپس با آرتمیا، غذای مکمل و تخم مرغ انجام شد (جدول ۳). درصد بازماندگی از مرحله ناپلیوس تا PL₁₅ برابر ۲۱ درصد بود (جدول ۵). عبارت دیگر از هر عدد مولد میگوی موزی در حوضچه شماره ۱ تکثیر بطور میانگین تعداد مراحل مختلف لاروی در جداول ۷ و ۸ آورده شده است. در حوضچه شماره ۲، از تعداد ۶ عدد میگوی مولد نگهداری شده، همه تخریزی نمودند (جدول ۲)، که جمعاً تعداد ۹۶۰۰۰۰ عدد ناپلی حاصل گردید (شکل ۱). از این مقدار ناپلی تعداد ۲۰۱۶۰۰ عدد پست لارو ۱۵ (PL₁₅) بدست آمد که درصد بازماندگی از مرحله ناپلیوس تا PL₁₅ برابر ۲۱ درصد بوده است (جدول ۶). عبارت دیگر از هر عدد مولد میگوی موزی در حوضچه شماره ۲ تکثیر بطور میانگین تعداد PL₁₅ ۳۳۶۰۰ عدد حاصل گردید. در مراحل مختلف لاروی تغذیه بترتیب با زی شناور گیاهی (کیتوسروس) و سپس با آرتمیا، غذای مکمل و تخم مرغ انجام شد. در مرحله زوا میزان دفعات غذاده ۶ بار و هر ۴ ساعت ۱ بار انجام می شد که با کیتوسروس و غذای مکمل نیز همراه بود. در زیر مرحله مایسیس ۱، آرتمیای کشته نیز بعنوان غذا اضافه گردید و در زیر مرحله مایسیس ۲، کیتوسروس از برنامه غذایی حذف گردید.

در ساعت ۸ صبح روز بعد پس از اطمینان از تخریزی، مولдин از حوضچه خارج و مورد زیستستجی قرار گرفتند در ساعت یک بعد از ظهر اولین گروه از تخمکها باز شده و ناپلی ها مشاهده گردیدند. دمای آب حوضچه ها ۳۰ درجه سانتیگراد و شوری ۳۲ قسمت در هزار اندازه گیری شد. اولین غذاده ای در مرحله ناپلی ۶ بوسیله زی شناور گیاهی (کیتوسروس) به مقدار ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ سلول در میلی لیتر انجام شد.

جهت شمارش ناپلی ها در هر حوضچه، توسط بشر کوچک ۱۰۰ میلی لیتری ۵۰ بار از قسمتهای مختلف حوضچه نمونه گیری بعمل آمد و تعداد ناپلی ها شمارش شدند. این تعداد ناپلی ها در حجم ۵۰۰ سی سی بود که این تعداد را به حجم آب حوضچه تعیین داده و بدین ترتیب تراکم ناپلی ها در حوضچه محاسبه شد (Hoang et al., 2002). این روش در روزهای بعدی برای مرحله زوا، مایسیس و پست لارو نیز انجام گردید.

در مراحل مختلف لاروی تغذیه به ترتیب بازی شناور گیاهی (کیتوسروس) و سپس با آرتمیا، غذای مکمل و تخم مرغ انجام شد. در مرحله زوا میزان دفعات غذاده ۶ بار و هر ۴ ساعت ۱ بار انجام می شد که با کیتوسروس و غذای مکمل نیز همراه بود. در زیر مرحله مایسیس ۱، آرتمیای کشته نیز بعنوان غذا اضافه گردید و در زیر مرحله مایسیس ۲، کیتوسروس از برنامه غذایی حذف گردید.

در مرحله پست لارو ۲ (PL₂)، آرتمیای زنده نیز به جیره غذایی اضافه و از مرحله ۵ PL آرتمیای کشته از برنامه غذایی حذف گردید.

جدول ۱: زیست‌سنجه مولدین موجود در حوضچه شماره ۱

شماره ردیف	وزن (گرم)	طول کل (سانتیمتر)	طول کاراپاس (سانتیمتر)	درصد تغیریزی
۱	۳۳	۱۵	۵/۷	۱۰۰
۲	۴۳	۱۶۷	۷/۲	۰
۳	۲۳	۱۳/۸	۵/۴	۱۰۰
۴	۵۳	۱۷/۳	۷/۳	۵۰
۵	۳۹	۱۶	۵/۹	۰
۶	۲۹	۱۴/۰	۵/۰	۰

جدول ۲: زیست‌سنجه مولدین موجود در حوضچه شماره ۲

شماره ردیف	وزن (گرم)	طول کل (سانتیمتر)	طول کاراپاس (سانتیمتر)	درصد تغیریزی
۱	۳۰	۱۴/۰	۵/۰	۱۰۰
۲	۳۴	۱۵/۴	۶	۷۰
۳	۲۱	۱۴/۷	۵/۵	۱۰۰
۴	۵۳	۱۷/۸	۷/۴	۱۰۰
۵	۲۹	۱۴/۳	۵/۴	۱۰۰
۶	۳۶	۱۶۵	۵/۷	۸۰

جدول ۵: درصد بازماندگی مراحل مختلف لارو نسبت به مرحله ناپلیوس به درصد

نسبت ناپلی به زوا	نسبت ناپلی به مایسیس	نسبت ناپلی به یست لارو ۱	نسبت ناپلی به یست لارو ۵	نسبت ناپلی به یست لارو ۲۱	نسبت ناپلی به یست لارو ۲۱	نوبت ناپلی به یست لارو ۲۸	نوبت ناپلی به یست لارو ۲۸	نوبت ناپلی به یست لارو ۲۸
۸۱	۷۷	۵۹	۴۶	۳۶	۳۴	۲۱	۲۱	۲۱
حوضجه ۱	حوضجه ۲							

جدول ۶: درصد بازماندگی مراحل مختلف لارو نسبت به مرحله زوا به درصد


نوبت زوا به مایسیس	نوبت زوا به یست لارو ۱	نوبت زوا به یست لارو ۵	نوبت زوا به یست لارو ۲۱	نوبت زوا به یست لارو ۲۸				
۷۲	۷۰	۵۸	۴۴	۴۲	۳۸	۲۷	۲۷	۲۸
حوضجه ۱	حوضجه ۲							

جدول ۷: درصد بازماندگی مراحل مختلف لارو نسبت به مرحله مایسیس به درصد

نوبت مایسیس به یست لارو ۱۵	نوبت مایسیس به یست لارو ۵	نوبت مایسیس به یست لارو ۲۱	نوبت مایسیس به یست لارو ۲۸	نوبت مایسیس به یست لارو ۳۸	نوبت مایسیس به یست لارو ۵۳	نوبت مایسیس به یست لارو ۹۱	نوبت مایسیس به یست لارو ۹۵	نوبت مایسیس به یست لارو ۹۵
۶۱	۸۳	۵۱	۵۸	۳۸	۵۳	۹۱	۹۵	۹۵
حوضجه ۱	حوضجه ۲							

جدول ۸: درصد بازماندگی مراحل مختلف لارو نسبت به مرحله پست لارو به درصد

پست لارو ۱۵ به ۵	پست لارو ۱۵ به ۱	پست لارو ۵ به ۱	پست لارو ۵ به ۵	پست لارو ۱۵ به ۹۱	پست لارو ۱۵ به ۷۰	پست لارو ۵ به ۹۵	پست لارو ۵ به ۶۲	پست لارو ۱۵ به ۹۵
۹۱	۸۷	۹۵	۹۵	۴۶	۷۰	۶۲	۶۲	۶۲
حوضجه ۱	حوضجه ۲							



نمودار ۱: تراکم مراحل مختلف پلاتکتونی و لاروی میگوی موزی در حوضجه های تکثیر

بحث

(Othman, 1991) همچنین مطالعات دیگر بیان می‌کند که در شرایط یکسان مولдин میگوی موزی ۴۵ تا ۲۵ گرمی حدود ۳۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ عدد ناپلی، در حالی که مولдин ۴۵ تا ۶۶ گرمی، ۱۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ عدد ناپلی تولید نموده و تفريخ معمولاً بیشتر از ۷۰ درصد بوده است (Lim et al., 1987).

گزارشات موجود نیز بیان کننده آن است که شوری و دما در هنگام تکثیر این گونه میگو برتریب حدود ۲۷ تا ۳۱ قسمت در هزار و ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد می‌باشد (Lim et al., 1987) و در آزمایشی دیگر، تخمها خوب و ناپلی‌های سالم را وقتی که تخمریزی و انکوباسیون تخم در آب با شوری‌های بالاتر از ۲۰ قسمت در هزار (ppt) (Choo, 1987) انجام می‌گرفت تولید شد (Choo, 1987). در بررسی حاضر در تمام مدت تکثیر دمای و شوری آب حوضچه‌های تکثیر ثابت بود و بطور میانگین میزان دما تقریباً ۳۰ درجه سانتیگراد و شوری ۳۲ گرم در لیتر (ppt) بود.

در ساعت یک بعد از ظهر روز بعد از ذخیره سازی مولдин، اولین گروه از تخمها تفریخ شد و ناپلی‌ها مشاهده شدند، به عبارتی دیگر بعد از ۱۳ ساعت از زمان تخمریزی، ناپلی‌ها مشاهده شده اند. تعدادی از گزارشات موجود نیز زمان شکفته شدن تخمها را ۱۳ تا ۱۴ ساعت بعد از تخمریزی (Lim et al., 1987) و تعدادی نیز حدود ۱۷ ساعت بعد از تخمریزی بیان می‌کنند (Hoang et al., 2002).

نتایج بدست آمده نشان داد که میزان بقاء از ناپلیوس به مرحله زوآ در حوضچه شماره ۱ تکثیر به ۸۱ درصد و در حوضچه شماره ۲ تکثیر به ۷۷ درصد رسید که به نظر می‌رسد مطلوب بوده است. در سایر مراحل میزان بقاء کاهش پیدا کرده است بطوریکه در حوضچه شماره ۲ در مرحله انتقال ناپلی به پست لارو ۵ درصد بقاء خیلی کاهش یافته که ممکن است ناشی از اولین تعویض آب در حوضچه تکثیر باشد. لذا نسبت بازماندگی ناپلی به مراحل زوآ- مایسیس و پست لارو ۱ تا ۵ در حوضچه‌های تکثیر برتریب ۸۱ تا ۷۷ درصد، ۵۹ تا ۵۴ درصد، ۴۵ تا ۳۶ درصد، ۳۴ تا ۲۸ درصد و ۳۱ تا ۲۱ درصد بوده است. همچنین در آزمایشی که در زاین انجام شد نیز درصد بقاء ناپلیوس- زوآ- مایسیس و مراحل پست لاروی میگوی

میگوی موزی در آبهای ساحلی و دریاهای باز با بستر شنی یا گلی و در اعماق بین ۱۰ تا ۴۵ متری زندگی می‌کند و قادر است در طول سال تخمریزی نماید (Lim et al., 1987). این میگو در آبهای دور از ساحل و در اعماق ۲۰ تا ۳۰ متری در شوریهای ۳۰ تا ۳۵ قسمت در هزار تخمریزی می‌کند. تخمها بارور شده نیمه شناور بوده و در مدت ۲۴ ساعت تفریخ می‌گردند و لارو با جریانهای آب به این سو و آن سو حرکت می‌کند. در زمان بلوغ جنسی، طول کاراپاس میگوی موزی ۳۰ تا ۴۰ میلی‌متر می‌باشد (Bagarinao, 1986).

اوج تخمریزی میگوی موزی در استان هرمزگان در اردیبهشت ماه و خرداد ماه می‌باشد (زرشناس، ۱۳۷۰ و شکیبا زاده، ۱۳۷۹)، که براحتی می‌توان مولдин آن را در مناطق جاسک و سیریک صید نمود.

مطالعات انجام شده بر روی میگوی موزی در خلیج نشان داده که میگوی موزی دو اوج تخمریزی در سال دارد، یکی در بهار و دیگری در پاییز (Rothlisberg et al., 1985). مولдин مورد بررسی با وزنهای ۲۳ تا ۵۳ گرم در نیمه شب تخمریزی نمودند. گزارشات موجود نیز نشاندهنده تخمریزی مولдин میگوی Lim et al., (1987) یا در بین ساعات ۱۸/۳۰ تا ۲۳ تخمریزی می‌کند (Hoang et al., 2002).

در حوضچه شماره ۱، فقط ۳ عدد از مولдин تخمریزی نمودند که تعداد ۴۱۵۸۰۰ عدد ناپلی حاصل گردید و در حوضچه شماره ۲ تمام ۶ عدد مولد تخمریزی نموده و تعداد ۹۶۰۰۰ ناپلی حاصل گردید. عبارت دیگر در حوضچه شماره ۱ تکثیر ۵۰ درصد مولдин به تخمریزی پاسخ دادند و هر عدد مولد میگوی موزی بطور میانگین ۱۳۸۶۰۰ عدد ناپلی و در حوضچه شماره ۲ تکثیر، ۱۰۰ درصد مولдин به تخمریزی پاسخ دادند و از هر عدد مولد میگوی موزی بطور میانگین ۱۶۰۰۰۰ عدد ناپلی تولید گردید.

گزارشات موجود نشان می‌دهد که تقریباً ۷۹ درصد مولдин میگوی موزی به تخمریزی پاسخ داده‌اند و میگوهای با اندازه (۳۵ تا ۵۰ گرم) می‌توانند بطور متوسط در هر بار تخمریزی ۱۵۴۰۰۰ عدد ناپلی تولید کنند

- Bagarinao, T. , 1986.** Important fish and shrimp fry in Philippine coastal waters. Identification, collection and handling. Aquaculture Extension Manual. No. 10, pp.34-42.
- Choo, P.S. , 1987.** Effects of salinity on the spawning, egg incubation and larviculture of *Penaeus merguiensis* fish. Bull. Dep. Fish. Malays. Buletin, Perikanan, Jabatan, Petikananand, Malays. No. 52, 9P.
- Hoang, T.S. ; Lee, Y. ; Keenan, C.P. and Mardsen, E. , 2002.** Spawning behaviour of *Penaeus fenneriopenaeus merguiensis* demand the effect of light intensity on spawning. Aquaculture Research. Vol. 33, pp.351-337.
- Lim, L.C. and Choeony, L.S. , 1987.** Manual on breeding of Banana, Prawn primary production department, Republic of Singapore. pp.12-18.
- Lobegeiyer, R. and Hoang, T. , 2001.** Banana prawn survey Issue 19-Previous editions of aquaculture news. pp.6-8.
- Othman, M.F. , 1991.** Some Observation on the ecology and larval culture aspects of the Banana Prawn (*Penaeus merguiensis* / *P. indicus*) fish Bull. Dep., Fish, Malays, Bulletin, Perikanan, jabatan, Perikanan, Malays, KualaLumpur, Malaysia. No.72, 19P.
- Rothlisberg, P.C. ; Staples, D.J. and Crocos, P.J. , 1985.** A review of the life history of the Banana Prawn. *Penaeus merguiensis* in the Gulf of Carpentaria. Second-Australian. National Prawn Seminar. (eds. P.C. Rothlisberg ; B.J. Hill and Staples, D.J.). pp.125-136.
- Seed Production Team , 1984.** The study on the larval rearing of *Penaeus merguiensis*. Deman Technical Paper. No. 5, pp.17-29 .
- Terazaki, .M. , 1981.** Mass production on the young Banana prawn, *Penaeus merguiensis*. Deman.Umi-Mer. Vol. 19, No. I. pp.23-29.

موزی بترتیب ۹۶/۱ تا ۱۹/۹ درصد، ۸۹ تا ۶۴ درصد، ۱۰۰ تا ۵۵/۹ درصد و ۸۵/۷ تا ۱۶/۱ درصد بدست آمده است، رشد پست لاروها تا مرحله PL19-23 بررسی شد و میزان بقاء از مرحله ناپلیوس تا میگوی بالغ ۲۸/۵ گرمی برابر با ۹/۴ درصد محاسبه گردید (Terazaki, 1981).

نتایج بدست آمده از تکثیر میگوی موزی در استان هرمزگان نشان داد که تکثیر آن آسان بوده و مشکل خاصی جهت انجام تکثیر و تولید انبوه وجود ندارد و شرایط کیفی آب جهت تکثیر و تولید انبوه پست لارو عبارت از : دمای آب ۲۹ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، شوری ۳۲ قسمت در هزار، اکسیژن بیشتر از ۵ میلیگرم در لیتر و pH آب ۸/۲ تا ۸/۳ می باشد.

همچنین نتایج بدست آمده بیانگر آن است که از هر عدد میگوی مولد با توجه به وزن و اندازه آن ۱۶۰۰۰ تا ۱۳۸۶۰ عدد ناپلی بدست می آید. عبارت دیگر از هر عدد میگوی مولد موزی با توجه به وزن و اندازه آن تعداد ۳۳۶۰۰ تا ۴۳۷۶۶ عدد پست لارو ۱۵ حاصل می گردد. میزان تولید ناپلی در این طرح در مقایسه با سایر کشورهایی که بر روی میگوی موزی فعالیت می کنند تقریباً مشابه بوده است.

با توجه به طرح انجام شده و تکثیر آسان میگوی موزی، براحتی می توان از گونه فوق جهت تکثیر در بخش خصوصی و پرورش در مزارع پرورش میگو بعنوان گونه دوم پرورشی و همچنین تکثیر آن برای رهاسازی در محیط طبیعی اقدام نمود.

منابع

- دندانی، ع. ، ۱۳۷۵. تاریخچه و زیست شناسی میگوی موزی یا صورتی. مجله آبزی پرور، شماره ۱۳، بهار ۱۳۷۵. صفحات ۱۲ تا ۱۸.
- زرشناش، غ. ، ۱۳۷۰. بررسی منابع میگوی استان هرمزگان. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. ۴۵ صفحه.
- شکیبازاده، ش. ، ۱۳۷۹. پرورش میگوی آب شور. معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. اداره کل آموزش و ترویج. ۶۴ صفحه.

Propagation biotechniques of *Penaeus merguiensis* in Hormozgan Province, South Iran

Salehi A.⁽¹⁾ and Zarshenas Gh.⁽²⁾

Salehi20022002@yahoo.ie

1- Golestan Fisheries Research Center, P.O.Box: 139 Gorgan, Iran

2- Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box:15155-6116 Tehran, Iran

Received: March 2004

Accepted: January 2005

Keywords: *Penaeus merguiensis*, Propagation, Hormozgan Province, Iran

Abstract

Twelve *P. merguiensis* specimens were collected from fishing grounds of Sirik area in the north of strait of Hormoz. The sampling was carried out from April to November 2003 and the brood-stocks with a mean weight 36.3 grams were transported to Kolahi hatchery center. The samples were kept in two separate 6 ton fiber glass tanks, filled with sea water with a salinity of 32ppt and temperature of 30 degrees centigrade. After spawning, the total collected nauplii from the first and the second tanks were 41800 and 960000, respectively. The survival rate from nauplii stage to PL₁₅ stage was 31% and 21.2%, for the two tanks respectively. We fed the larva up to N₆ stage with Chaetoceros and from mysis to post larvae stages with *Artemia*. We conclude that Hormozgan province is a suitable area for collection of Banana shrimp brood-stocks and that propagation of the species can be successfully carried out.