

بررسی اثر غلظت‌های مختلف عنصر آهن

بر میزان رشد جلبک سبز

Ankistrodesmus falcatus

سیدمصطفی حسینی^(۱); سید جعفر سیف آبادی^(۲) و مریم فلاحتی^(۳)

smhosseini206@yahoo.com

۱- دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: ۴۶۴۱۴

۲- پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندر انزلی، صندوق پستی: ۶۶

تاریخ دریافت: تیر ۱۳۸۳ تاریخ پذیرش: بهمن ۱۳۸۴

لغات کلیدی: آهن، جلبک سبز، *Ankistrodesmus falcatus*، محیط کشت زایندر

و تأثیرات آن از نظر زیستی و فیزیکی قابل توجه است (اسماعیلی ساری، ۱۳۸۳).

جهت انجام آزمایشات تأثیر آهن روی رشد این جلبک از روش استاندارد *Selenastrum bottle test* (Miller et al., 1987) و محیط کشت زایندر استفاده گردید. در این بررسی ۶ تیمار با غلظت‌های مختلف آهن در ۲۵۰ سی سی محیط کشت و یک نمونه شاهد در نظر گرفته شد.

پس از آماده‌سازی محیط‌های کشت در تیمارها و شاهد از نمونه خالص جلبک *Ankistrodesmus falcatus* به میزان یک میلی‌گرم در لیتر در تیمارها و شاهد ریخته شد (Piri & Ordog, 1997). پس از همگن نمودن، پنج سی سی از این محلول جهت شمارش اولیه جلبکی برداشت گردید. در مرحله بعدی جهت هواهدی با پی‌پت‌های هوا همراه با فیلتر، سر ارلن‌ها بسته شد و به میزهای کشت با شرایط دمای ۲۳ الی ۲۵ درجه سانتیگراد و میزان نور 300 ± 300 لوکس بمدت ۹۶ ساعت منتقل شدند. پس از این مرحله، ویال پنج سی سی از هر تیمار جهت شمارش ثانویه جلبکی برداشت و میزان جذب در طول موج ۷۵۰ نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر یادداشت گردید.


جلبک *Ankistrodesmus falcatus* از شاخه جلبکهای سبز (Chlorophyta) و یکی از جنسهای شناخته شده جلبکهای تکسلولی است که از ضریب رشد بالایی برخوردار می‌باشد (Peters, 1987). جلبک‌های تکسلولی، غذای زنده مهمی برای مراحل لاروی میگوهای خانواده پنائیده هستند. بعلاوه این جلبک برای تولید تعداد زیادی از فیتوپلانکتونها (روتیفرها، پاروپایان و آرتیمیا) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعلاوه بسیاری از فیتوپلانکتونها مصارف صنعتی، دارویی، کشاورزی (عنوان کود) و خوارکی دارند (بحری، ۱۳۷۵). اهمیت این جلبک بیشتر در تهیه انواع ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه، آنتی‌بیوتیک و تصفیه فاضلاب می‌باشد (Kilhum et al., 1998).

آهن اولین عنصر کمیاب است که برای گیاهان و جانوران ضروری تشخیص داده شده است. آهن برای جلبکها یک نیاز ضروری است و عنصر کلیدی در متابولیسم می‌باشد که در ساختار مولکول سیتوکروم دخالت دارد. هنگامی که کمبود آهن پیش می‌آید، نرخ فتوسنتر پایین می‌رود (Komarck, 1973). آهن در فرآیند اکسایش و کاهش آنزیمی گیاهان شرکت دارد. بعلاوه در فرآیند تنفس، تبادل مواد و سنتر کلروفیل دخالت دارد (Round, 1994). فراوانی آهن در آب


خوانده شد. بیشترین میزان جذب در غلظت 0.0005 گرم در لیتر برای عنصر آهن بود (نمودار ۱).

پس از شمارش جلبکها با لام توما، میانگین شمارش اولیه و ثانویه نمونه‌ها در یک گرم در لیتر و میانگین درصد تغییرات تراکم سلولی نسبت به شاهد برای عنصر آهن طبق نمودار ۲ بدست آمد که بیشترین میانگین درصد تغییرات تراکم سلولی در غلظت 0.0005 گرم در لیتر بوده است.

غلظت مؤثر عنصر آهن بر جلبک سبز *Ankistrodesmus falcatus* پس از انجام آزمایشات بین $0.0001\text{ تا }0.0018\text{ گرم}$ در لیتر تعیین گردید و شاهد 0.00019 گرم در لیتر بوده است. با توجه به غلظت‌های مختلف عنصر آهن، میزان جذب پس از ۹۶ ساعت رشد در نهایت توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر (طیفسنچ) با طول موج 750 نانومتر



نمودار ۱: اثرات مختلف عنصر آهن بر میزان جذب جلبک *A. falcatus*



نمودار ۲: تأثیر عنصر آهن بر میانگین درصد تغییرات تراکم سلولی جلبک *A. falcatus*

تشکر و قدردانی

از همکاریهای ارزشمند پرسنل محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندر انزلی بخصوص پرسنل زحمتکش بخش بیوتکنولوژی به جهت فراهم نمودن زمینه لازم در انجام هر چه بهتر تحقیق و جناب آفای مهندس صلوانیان به جهت راهنمائیهای لازم در کلیه مراحل پروژه کمال تشکر و قدردانی را داریم.

منابع

- اسماعیلی ساری، ع. ، ۱۳۸۳. هیدروشیمی بنیان آبزی پروری، دانشگاه تربیت مدرس، ۲۴۹ صفحه.
- بحری، ا. ، ۱۳۷۵. راهنمای تولید و کشت جلبکها برای استفاده در مراکز تکثیر میگو معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات، ۳۲ صفحه.
- Komarek, J. , 1973.** Culuture collections. In: Carr N.G. and Whitton, B.A. the biology of blue green algae. Blackwell Scientific PU61, pp.519-524.
- Kilhum, S.S. ; Kreeger, D.A. and Goulden, C.E. , 1998.** Effects of nutrient limitation on biochemical constituent of *Ankistrodesmus falcatus* fresh water. Biol. Vol. 38, No. 3, pp.591-595.
- Miller, D.E. ; Green, J.C. and Shiroyama, T. , 1987.** The selenstrum capricornatum print 2, algal assay bottle test: experimental design, application and interperation protocol. US. EPA 600/90. 126P.
- Peters, R.H. , 1987.** Feeding and nutrition in Daphnia. Yale University Press. pp.467-469.
- Piri, Z. and Ordog, V. , 1997.** Effect of some herbicides commonly used in Iranian agriculture on aquatic food chain. Ph.D. Thesis to the Hungarian Academy of Sciences. pp.46-48.
- Round, 1994.** The biology of the algae. Reader in physiology, University of Bristol. pp.45-49.
- Sunda, W.G. and Huntsman, S.A. , 1997.** Inter-related influence of iron, light and cell size on marine phytoplankton growth. Nature. Vol. 390, No. 6658, pp.389-392.

با کسر شمارش اولیه از ثانویه و نیز مقایسه میزان جذب در طول موج ۷۵۰ نانومتر در تیمارهای مختلف و نمونه شاهد می‌توان درصد افزایش رشد را محاسبه و بهترین غلظت آهن که بالاترین رشد جلبک در آن صورت می‌گیرد را ارائه نمود.

در این بررسی مقادیر بیوماس جلبک *A. falcatus* در غلظتها مختلف نیز تعیین گردید. براین اساس بالاترین عدد میانگین درصد تغییرات بیوماس در غلظت مصرفی ۰/۰۰۰۵ گرم در لیتر آهن بود.

نتایج تأثیر عنصر آهن بر روی رشد جلبک *A. falcatus* نشان داد که میانگین جذب از غلظت ۰/۰۰۰۱۸ تا ۰/۰۰۰۵ گرم در لیتر افزایش یافته ولی در غلظتها میزان جذب کاهش یافته است. بعبارت دیگر محیط کشت شاهد غلظت آهن کمترین مقدار جذب را داشته است و غلظتها مصرفی ۰/۰۰۰۱۸ و ۰/۰۰۰۲۵ نیز تفاوت معنی‌داری را در مقدار جذب بوجود نیاورده‌اند. اما با افزایش غلظت مصرفی آهن افزایش معنی‌داری در میزان جذب بوجود آمد. بطوريکه میزان جذب در تیمار غلظت ۰/۰۰۰۳۶ از ۳ تیمار شاهد و غلظتها ۰/۰۰۰۱۸ و ۰/۰۰۰۲۵ بیشتر بوده است و پس از این تیمار باز هم افزایش غلظت آهن با افزایش جذب همراه بود و دو تیمار غلظت مصرفی ۰/۰۰۰۵ و ۰/۰۰۰۷ بیشترین میزان جذب را بوجود آورده‌اند. البته افزایش غلظت مصرفی آهن بعد از تیمار ۰/۰۰۰۵ در حال کاهش یافتن در میزان جذب گردیده است. بدین معنی که غلظتها بالاتر از ۰/۰۰۰۵ آهن اثر بازدارنده در رشد داشته‌اند.

این مسئله در میزان تراکم سلولی و بیوماس نیز مشخص می‌باشد. لذا غلظتها بسیار کم یا زیاد این عنصر می‌تواند نقش بازدارنده برای رشد جلبک *A. falcatus* داشته باشد. اثر آهن و نور بر روی رشد فیتوپلانکتون‌های دریایی توسط Sunda & Huntsman, 1997 مطالعه گردید. براساس نتایج آنها رشد فیتوپلانکتون می‌تواند بطور هم‌مان بوسیله آهن و نور کنترل شود. همچنین رشد سلولهای کوچکتر وابستگی بیشتری به آهن دارد.

بطور کلی می‌توان نتیجه گیری نمود که تغییرات جزئی آهن در رشد جلبک آنکیسترودسموس تأثیر بسزایی دارد. نتایج آماری طبق آرمون مقایسه چند دامنه دانکن نشان داده که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌دار وجود دارد. بنابراین رشد جلبک در غلظتها مختلف آهن می‌تواند معنی‌دار می‌باشد ($P<0.01$).

Effects of iron concentration on the growth of Green Alga, *Ankistrodesmus falcatus*

Hoseini S.M.⁽¹⁾ ; Seyfabadi S.J.⁽²⁾ and Fallahi M.⁽³⁾

smhosseini206@yahoo.com

1,2- Marine Biology Dept., Faculty of Natural Research and Marine Science,

Tarbiat Modares University, P.O.Box: 46414-356 Noor, Iran

3- Inland Waters Aquaculture Research Center, P.O.Box: 66 Bandar Anzali, Iran

Received: July 2004 Accepted: February 2005

Keyword: Iron, *Ankistrodesmus falcatus*, Zander, Iran

Abstract

Possible effects of various iron concentrations on the growth of green algae, *Ankistrodesmus falcatus*, were studied at Inland Waters Aquaculture Research Center, in Bandar Anzali, Guilan Province. The algae was grown under laboratory conditions with a water temperature of $25\pm2^{\circ}\text{C}$ and light intensity of $3500\pm350\text{lux}$ for 96 hours at 6 concentrations of Fe in triplicates, using standard Zander culture medium (Z-8±N) as control. The amount of Fe absorption was measured using spectrophotometry at 750nm, and the number of algal cells at the beginning and final stages were counted, using Toma slide. Maximum growth of *Ankistrodesmus falcatus* was observed at Fe concentrations of 0.0005 g/l, when the concentration of the element in the control group (Z-8:tN) was 0.00019g/l. It was shown that Fe concentrations higher or lower than 0.0005g/l had negative effects on the algal growth.