

بررسی پراکنش گروه‌های عمده فیتوپلانکتونی حوضه جنوبی دریای خزر با تأکید بر کریزوفیتا (دیاتومه‌ها) و پیروفیتا (دوتاژکداران) (۱۳۷۵)

علی گنجیان^(۱) و آسیه مخلوق^(۲)

aganjian2002@yahoo.com

موسسه تحقیقات شیلات ایران

بخش بوم‌شناسی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری صندوق پستی: ۹۶۱

تاریخ دریافت: آبان ۱۳۷۹ تاریخ پذیرش: بهمن ۱۳۸۱

خلاصه

طی این تحقیق، در چهار نمونه برداری فصلی در سال ۱۳۷۵ از حوضه جنوبی دریای خزر، از مجموع ۹۳ گونه شناسایی شده از دو شاخه غالب فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر شامل شاخه کریزوفیتا (عمدتاً دیاتومه‌ها) Chrysophyta و شاخه پیروفیتا Pyrrophyta بترتیب ۷۳ و ۲۰ گونه شناسایی گردید. دیاتومه‌ها ضمن آنکه جایگاه اصلی را از نظر تنوع گونه‌ای در دریا دارا می‌باشند در کل حوضه جنوبی دریای خزر و کلیه فصول سال، حداکثر تراکم (جمعیت) و زی توده را بخود اختصاص داده‌اند. گونه غالب شاخه کریزوفیتا *Rhizosolenia calcaravis* و گونه غالب شاخه پیروفیتا *Exuviaella cordata* بودند که از تراکم و زی توده بیشتری برخوردار بوده‌اند. حداکثر تراکم و زی توده فیتوپلانکتون بترتیب مربوط به شاخه کریزوفیتا (بیش از ۷۵ درصد) و شاخه پیروفیتا (نزدیک به ۱۷ درصد) و بقیه شاخه‌ها کمتر از ۱۰ درصد می‌باشد.

لغات کلیدی: پراکنش، فیتوپلانکتون، کریزوفیتا، پیروفیتا، دریای خزر

مقدمه

فیتوپلانکتونهای دریای خزر همانند سایر محیطهای آبی، اولین حلقه زنجیره غذایی را تشکیل می دهند، بنابراین از اهمیت فراوانی برخوردارند. تحقیقات اولیه‌ای که توسط پژوهشگران شوروی سابق انجام گرفته است نشان می دهد که دو شاخه کریزوفیتا (عمدتاً دیاتومه‌ها) Chrysophyta و پیروفیتا Pyrrhophyta بیشترین تراکم، زی توده و ترکیب گونه‌ای را در اغلب فصول سال دارا بوده و در بهره‌دهی دریا و تغذیه بی مهرگان آبزی نقش اساسی ایفاء می کنند (سلمانوف، ۱۹۸۷؛ قاسم‌اف و باقراف، ۱۹۸۳؛ گنجیان و همکاران، ۱۳۷۷)

مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران با همکاری مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان و انستیتو تحقیقات شیلات روسیه (کاسپرینخ)، در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ پروژه‌ای تحت عنوان «هیدرولوژی و هیدروبیولوژی حوضه جنوبی دریای خزر» اجرا نموده‌اند که مقاله حاضر به بررسی بخشی از نتایج این پروژه که به تراکم و زی توده شاخه‌های مذکور می پردازد اشاره می نماید.

دیاتومه‌ها در مقایسه با سایر گروهها اولاً از نظر ترکیب گونه‌ای و رشد و نمو جایگاه خاصی را دارا هستند و ثانیاً رشد و نمو آنها تقریباً در کلیه فصول سال ادامه دارد و همچنین تراکم قابل توجهی از آنها در طول سال مشاهده می گردد (سلمانوف، ۱۹۸۷؛ گنجیان و همکاران، ۱۳۷۷).

نقش و اهمیت فیتوپلانکتونها در زنجیره غذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستمها منجمله دریای خزر و نبود اطلاعات جامع و کافی از این اکوسیستم خصوصاً حوضه جنوبی دریای خزر ضرورت بررسی و شناسایی ترکیب گونه‌ای، تراکم و زی توده آنها و همچنین نوسانات فصلی این دو گروه عمده را بصورت مقایسه‌ای ایجاب می کند که یکی از اهداف این تحقیق می باشد.

مواد و روشها

برای بررسی فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر ۱۸ ترانسکت عمود بر ساحل انتخاب گردید که روی هر ترانسکت در اعماق ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ متری از لایه‌های سطح، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ متری نمونه برداری گردید (شکل ۱). برای جمع‌آوری فیتوپلانکتونها از روتنر (Rutner)


استفاده شد (Vollenweider, 1974). منطقه به چهار قسمت غرب از (خطوط ۷-۱)، میانی (خطوط ۱۳-۸)، شرق (۱۴-۱۸) و آبهای آزاد با عمق بیش از ۲۰۰ متر (ایستگاههای E, F, G, I, H) مطابق نقشه شکل ۱ تقسیم گردید^(۱).

در این روش ۵۰۰ سی سی آب از لایه‌های فوق جمع‌آوری و با فرمالین چهار درصد تثبیت شدند و در ظروف شیشه‌ای به آزمایشگاه منتقل گردیدند (سلمانوف، ۱۹۸۷ و Sorina, 1978). نمونه‌برداری بصورت فصلی در چهار فصل از سال ۱۳۷۵ انجام شد. پس از نمونه‌برداری، مطالعه کمی و کیفی نمونه‌ها در آزمایشگاه (مطابق روش کیسیلف، ۱۹۶۵ برگرفته از: سلمانوف، ۱۹۸۷) صورت گرفت. در این روش نمونه‌ها به مدت ۱۰ روز در تاریکی نگهداری گردیدند تا کاملاً ته‌نشین شوند. سپس با سیفون مخصوص، آب رویی را تخلیه و مابقی نمونه در چند مرحله به مدت ۵ دقیقه با ۳۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفوژ شد تا حجم آن به ۲۰ تا ۲۵ میلی‌لیتر رسید. نمونه‌ها در دو مرحله کیفی و یک مرحله کمی با لامهای خط‌کشی شده و لامل ۲۴×۲۴ میلی‌متر بوسیله میکروسکوپ با بزرگنمایی X_1 و X_4 و شمارش و بررسی شدند (Clesceri et al., 1989 ; Vollenweider, 1974 ; Newell, 1977)

برای شناسایی ترکیب گونه‌ای فیتوپلانکتونها از کلید شناسایی Prescott, 1962 ; Habit & Pankow, 1976 ; Ffany & Britton, 1971 ؛ پیروشکینا و همکاران، ۱۹۶۸ و زابلینا و همکاران، ۱۹۵۱ استفاده گردید.

تعداد فیتوپلانکتونهای شمارش شده در ضریب حجمی (نسبت به حجم آب بررسی شده) ضرب می‌گردد. بدین ترتیب جمعیت فیتوپلانکتون بدست می‌آید. سپس حجم تقریبی در پلانکتون با توجه به شکل هندسی که داراست از طریق اندازه‌گیری ابعاد حاصل می‌گردد. نهایتاً از حاصل ضرب جمعیت و جمعیت و حجمهای بدست آمده بیوماس محاسبه می‌گردد (مالوزوا و ادیانسیستا، ۱۹۵۴ برگرفته شده از: سلمانوف، ۱۹۸۷). از برنامه‌های Foxpro و Excel 97 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید.

۱- کانونیس گزارش منتشر شده هیدرولوژی و هیدروبیولوژی دریای حزر سال ۷۷-۷۳



شکل ۱: موقعیت ایستگاههای نمونه برداری

نتایج

بطور کلی فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر عمدتاً به دو شاخه کریزوفیتا (زرد طلایی و دیاتومه‌ها) *Chrysophyta* و پیروفیتا *Pyrrophyta* تعلق داشتند، لذا تنوع گونه‌ای، تراکم (جمعیت) و زی توده فصلی در این موجودات به صورتی بود که در اغلب فصول سال در نواحی مختلف نسبت به بقیه شاخه‌ها، این دو شاخه از تراکم و زی توده بیشتری برخوردار بودند (جداول ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵). مجموعاً ۹۳ گونه از این دو شاخه در حوضه جنوبی دریای خزر در بررسی سال ۱۳۷۵ مشاهده شد.

طبق نتایج بدست آمده در بررسی ترانسکتها (نمودارهای ۱، ۲، ۳ و ۴) حداکثر تراکم کل

فیتوپلانکتون در ترانسکت ۱ به میزان $23/6 \times 10^6$ نمونه در متر مکعب و حداکثر زی توده فیتوپلانکتون کل در ترانسکت ۵ به مقدار $306/6$ میلی گرم در مترمکعب مشاهده شد. حداکثر جمعیت شاخه کریزوفیتا در ترانسکت ۱ با تراکم 22×10^6 نمونه در مترمکعب و حداکثر زی توده این شاخه در ترانسکت ۵ به مقدار $298/2$ میلی گرم در مترمکعب بود و در نهایت شاخه پیروفیتا دارای حداکثر جمعیت به میزان 279×10^6 نمونه در متر مکعب در ترانسکت ۱۶ و حداکثر زی توده در ترانسکت ۸ به مقدار $12/2$ میلی گرم در مترمکعب بوده است.

چگونگی تغییرات فصلی شاخه کریزوفیتا و پیروفیتا (جدول ۱ و ۲) نشان می دهد که حداکثر کل جمعیت فیتوپلانکتون در فصل زمستان به میزان $12/2 \times 10^6$ نمونه در مترمکعب است در حالیکه حداکثر زی توده در فصل تابستان به مقدار $185/3$ میلی گرم در مترمکعب دیده شده که بیشترین میزان مربوط به شاخه کریزوفیتا بوده است. حداکثر جمعیت شاخه کریزوفیتا (دیاتومه ها) در فصل پائیز $10/3 \times 10^6$ نمونه در مترمکعب بود که بیش از ۹۰ درصد فیتوپلانکتون کل را بخود اختصاص داد. حداکثر زی توده در فصل تابستان به مقدار 178 میلی گرم در مترمکعب بود که بیش از ۹۶ درصد را دارا بوده است. حداکثر جمعیت و زی توده پیروفیتا در فصل بهار $3/8 \times 10^6$ نمونه در مترمکعب بیش از ۳۴ درصد از فیتوپلانکتون کل و $10/8$ میلی گرم در مترمکعب و بیش از ۷ درصد از زی توده کل فیتوپلانکتون را دارا بوده است.

نتایج مطالعه ناحیه ای (نمودارهای ۵ و ۶) بیانگر این است که حداکثر جمعیت و زی توده فیتوپلانکتون کل در ناحیه غربی بوده که مقادیر 13×10^6 نمونه در مترمکعب و $172/7$ میلی گرم در مترمکعب بوده و به همین ترتیب شاخه کریزوفیتا (دیاتومه ها) نیز حداکثر جمعیت و زی توده را در ناحیه غربی دارا بوده ($10/9 \times 10^6$ نمونه در مترمکعب و 165 میلی گرم در مترمکعب) ولی حداکثر جمعیت و زی توده شاخه پیروفیتا در منطقه میانی به میزان ($2/2 \times 10^6$ نمونه در مترمکعب و زی توده $7/4$ میلی گرم در مترمکعب) مشاهده شده است. در این بررسی حداکثر تراکم و زی توده شاخه کریزوفیتا (دیاتومه ها) در منطقه غرب در فصل زمستان بیش از ۹۳ درصد 19×10^6 نمونه در مترمکعب و بیشترین زی توده در منطقه شرق در فصل بهار ۹۶ درصد ($33/6$ میلی گرم در متر مکعب) بوده است. شاخه پیروفیتا بیشترین تراکم و زی توده در منطقه میانی در

فصل بهار با ۴۱ درصد (5×10^6 نمونه در مترمکعب) و ۱۸/۵ درصد ($12/9$ میلی‌گرم در مترمکعب) را دارا بوده است (جداول ۱، ۲، ۳ و ۴).

جدول ۱: مقایسه تغییرات فصلی فیتوبلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر سال ۱۳۷۵

| فصل | تراکم در مترمکعب میلی‌گرم در لیتر | شاخه کریزوفیتا | شاخه پیروفیتا | بقیه شاخه‌ها | فیتوبلانکتون کل |
|---------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| بهار | جمعیت | $6/6 \times 10^6$ | $3/8 \times 10^6$ | $0/52 \times 10^6$ | $10/98 \times 10^6$ |
| | درصد | ۶۰/۵ | ۳۴/۷ | ۴/۷ | |
| تابستان | جمعیت | $2/40 \times 10^6$ | $1/42 \times 10^6$ | $0/187 \times 10^6$ | $4/68 \times 10^6$ |
| | درصد | ۵۱/۲ | ۳۰/۲ | ۱۸/۵ | |
| پاییز | جمعیت | $10/3 \times 10^6$ | $0/85 \times 10^6$ | $0/28 \times 10^6$ | $11/4 \times 10^6$ |
| | درصد | ۹۰/۱ | ۷/۴ | ۲/۵ | |
| زمستان | جمعیت | $10/1 \times 10^6$ | $1/48 \times 10^6$ | $0/55 \times 10^6$ | $12/2 \times 10^6$ |
| | درصد | ۸۳/۲ | ۱۲/۲ | ۴/۶ | |

جدول ۲: تغییرات فصلی زی‌توده فیتوبلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر در فصول مختلف سال ۱۳۷۵

| فصل | میلی‌گرم در مترمکعب | شاخه کریزوفیتا | شاخه پیروفیتا | بقیه شاخه‌ها | فیتوبلانکتون کل |
|---------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|
| بهار | زی‌توده | ۱۳۴ | ۱۰/۸ | ۱/۱ | ۱۴۶ |
| | درصد | ۹۱/۸ | ۷/۴ | ۰/۸ | |
| تابستان | زی‌توده | ۱۷۸/۲ | ۵/۶ | ۱/۱ | ۱۸۵/۳ |
| | درصد | ۹۶/۲ | ۳/۲ | ۰/۶ | |
| پاییز | زی‌توده | ۱۷۶/۷ | ۴/۷ | ۱/۴ | ۱۸۲/۸ |
| | درصد | ۹۶/۷ | ۲/۶ | ۰/۷ | |
| زمستان | زی‌توده | ۳۰/۷ | ۶/۱ | ۲/۶ | ۳۹/۴ |
| | درصد | ۷۷/۹ | ۱۵/۵ | ۶/۶ | |

جدول ۳: مقایسه تغییرات فصلی فیتوپلانکتونها در نواحی مختلف حوضه جنوبی دریای خزر سال ۱۳۷۵


| فصل | ناحیه نمونه برداری | تعداد در متر مکعب | شاخه کریزوفیتا | شاخه پیروفتا | بقیه شاخه ها | کل فیتوپلانکتون |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | غربی | جمعیت | $7/186 \times 10^6$ | $2/581 \times 10^6$ | $0/52 \times 10^6$ | 11×10^6 |
| | | درصد | ۷۱/۷ | ۲۳/۵ | ۴/۸ | |
| بهار | میانی | جمعیت | 6×10^6 | 5×10^6 | $0/6 \times 10^6$ | 12×10^6 |
| | | درصد | ۵۳/۳ | ۴۱ | ۵/۵ | |
| | شرقی | جمعیت | 6×10^6 | 4×10^6 | $0/4 \times 10^6$ | 10×10^6 |
| | | درصد | ۵۳/۶ | ۴۲/۷ | ۳/۷ | |
| | غربی | جمعیت | 3×10^6 | 2×10^6 | $0/01 \times 10^6$ | 6×10^6 |
| | | درصد | ۶۰/۴ | ۳۹/۴ | ۰/۲ | |
| تابستان | میانی | جمعیت | 1×10^6 | 1×10^6 | $0/01 \times 10^6$ | 2×10^6 |
| | | درصد | ۴۵/۳ | ۵۴/۱ | ۰/۶ | |
| | شرقی | جمعیت | 3×10^6 | $0/5 \times 10^6$ | 1×10^6 | 4×10^6 |
| | | درصد | ۵۶/۹ | ۱۰/۲ | ۳۲/۹ | |
| | غربی | جمعیت | 12×10^6 | $0/4 \times 10^6$ | $0/2 \times 10^6$ | 13×10^6 |
| | | درصد | ۹۵/۶ | ۳/۵ | ۱/۳ | |
| پاییز | میانی | جمعیت | 10×10^6 | $0/7 \times 10^6$ | $0/005 \times 10^6$ | 10×10^6 |
| | | درصد | ۹۲/۷ | ۶/۸ | ۰/۵ | |
| | شرقی | جمعیت | 7×10^6 | 2×10^6 | $0/7 \times 10^6$ | 10×10^6 |
| | | درصد | ۷۵/۹ | ۱۶/۷ | ۷/۴ | |
| | غربی | جمعیت | 19×10^6 | $0/8 \times 10^6$ | $0/6 \times 10^6$ | 20×10^6 |
| | | درصد | ۹۳/۳ | ۳/۹ | ۲/۸ | |
| زمستان | میانی | جمعیت | 3×10^6 | 2×10^6 | $0/3 \times 10^6$ | 6×10^6 |
| | | درصد | ۵۶/۴ | ۳۷/۹ | ۵/۷ | |
| | شرقی | جمعیت | 6×10^6 | 2×10^6 | $0/8 \times 10^6$ | 8×10^6 |
| | | درصد | ۷۰ | ۲۰/۳ | ۹/۷ | |

جدول ۴: مقایسه تغییرات فصلی فیتوپلانکتونها در نواحی مختلف حوضه جنوبی دریای خزر سال ۱۳۷۵


| فصل | ناحیه نمونه برداری | تعداد در متر مکعب | شاخه کریزوفیتا | شاخه پیروفتا | بقیه شاخه‌ها | کل فیتوپلانکتون |
|---------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | غربی | زی توده | ۶۸/۵ | ۸/۵ | ۱/۳ | ۷۸/۳ |
| | | درصد | ۸۷/۵ | ۱۰/۸ | ۱/۷ | |
| بهار | میانی | زی توده | ۵۵/۸ | ۱۲/۹ | ۰/۹ | ۶۹/۶ |
| | | درصد | ۸۰/۲ | ۱۸/۵ | ۱/۳ | |
| | شرقی | زی توده | ۳۱۹/۷ | ۱۱/۶ | ۱/۲ | ۳۳۲/۶ |
| | | درصد | ۹۶ | ۳/۵ | ۰/۴ | |
| | غربی | زی توده | ۲۹۵/۲ | ۹/۵ | ۱/۹ | ۳۰۶/۶ |
| | | درصد | ۹۶/۳ | ۳/۱ | ۰/۶ | |
| تابستان | میانی | زی توده | ۶۱/۶ | ۵/۲ | ۰/۲ | ۶۷ |
| | | درصد | ۹۱/۹ | ۷/۸ | ۰/۳ | |
| | شرقی | زی توده | ۱۵۴/۴ | ۲ | ۱/۲ | ۱۵۷/۶ |
| | | درصد | ۹۸ | ۱/۲ | ۰/۷ | |
| | غربی | زی توده | ۲۵۳/۲ | ۳/۷ | ۱/۹ | ۲۵۸/۸ |
| | | درصد | ۹۷/۸ | ۱/۵ | ۰/۷ | |
| پاییز | میانی | زی توده | ۱۷۶/۲ | ۴/۲ | ۰/۳ | ۱۸۰/۷ |
| | | درصد | ۹۷/۵ | ۲/۳ | ۰/۲ | |
| | شرقی | زی توده | ۷۰/۲ | ۶/۸ | ۲/۱ | ۷۹/۱ |
| | | درصد | ۸۸/۷ | ۸/۶ | ۲/۷ | |
| | غربی | زی توده | ۴۳/۶ | ۳/۸ | ۰/۲ | ۴۷/۶ |
| | | درصد | ۹۱/۶ | ۸ | ۰/۴ | |
| زمستان | میانی | زی توده | ۲۰/۵ | ۷/۴ | ۰/۴ | ۲۸/۳ |
| | | درصد | ۷۲/۴ | ۲۶/۲ | ۱/۴ | |
| | شرقی | زی توده | ۲۵/۴ | ۷/۷ | ۸/۶ | ۴۱/۷ |
| | | درصد | ۶۰/۹ | ۱۸/۵ | ۲۰/۶ | |

جدول ۵: تعداد گونه‌های موجود فیتوپلانکتونها در فصول مختلف سال حوضه جنوبی دریای خزر سال ۱۳۷۵


| فصل | ناحیه نمونه برداری | شاخه کریزوفیتا | شاخه پیروفیتا | بقیه شاخه‌ها |
|---------|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| بهار | غربی | ۲۵ | ۱۱ | ۱۷ |
| | میانی | ۲۳ | ۱۵ | ۱۱ |
| | شرقی | ۱۹ | ۱۴ | ۷ |
| تابستان | غربی | ۲۳ | ۱۴ | ۱۴ |
| | میانی | ۱۶ | ۱۱ | ۱۱ |
| | شرقی | ۱۸ | ۱۱ | ۱۱ |
| پاییز | غربی | ۲۶ | ۹ | ۱۱ |
| | میانی | ۳۱ | ۱۱ | ۱۱ |
| | شرقی | ۲۰ | ۱۱ | ۱۱ |
| زمستان | غربی | ۲۰ | ۸ | ۱۱ |
| | میانی | ۲۴ | ۱۲ | ۱۱ |
| | شرقی | ۱۹ | ۱۳ | ۱۱ |




نمودار ۱: جمعیت شاخه‌های مختلف و فیتوپلانکتون کل حوضه جنوبی دریای خزر (سال ۱۳۷۵)



نمودار ۲: زی توده شاخه‌های مختلف و فیتوپلانکتون کل حوضه جنوبی دریای خزر (سال ۱۳۷۵)



نمودار ۳: مقایسه جمعیت فیتوپلانکتون کل و شاخه‌های عمده آن در حوضه جنوبی دریای خزر (سال ۱۳۷۵)



نمودار ۴: مقایسه زی توده فیتوپلانکتون کل و شاخه‌های عمده آن در حوضه جنوبی دریای خزر (سال ۱۳۷۵)

بحث

از مجموع ۹۳ گونه شناسایی شده از دو شاخه غالب فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر شاخه کریزوفیتا (عمدتاً گروه دیاتومه‌ها) *Chrysophyta* و شاخه پیروفیتا *Pyrrophyta* بترتیب ۷۳ و ۲۰ گونه را شامل شدند که این مطلب نشان دهنده برتری تنوع گونه‌ای در شاخه کریزوفیتا (دیاتومه‌ها) نسبت به شاخه پیروفیتا می‌باشد (سلمانوف، ۱۹۸۷، گنجیان و همکاران، ۱۳۷۷). دیاتومه‌ها ضمن آنکه جایگاه اصلی را از نظر تنوع گونه‌ای در دریا دارا می‌باشند، در کل سطح دریا در تمام طول سال حداکثر تراکم و زی توده را دارا بوده‌اند و از میان گونه‌های متنوع مشاهده شده فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر، گونه‌های متمایزی که انتشار وسیعی داشته و نیز زی توده و تراکم زیادی را دارا هستند باید به گونه شاخص *Rhizosolenia calcaravis* از شاخه کریزوفیتا

(دیاتومه‌ها) و گونه *Exuviealla cordata* از شاخه پیروفیتا اشاره نمود (سلمانوف، ۱۹۸۷؛ کنجیان و همکاران، ۱۳۷۷؛ مائی‌سیووویلا تووا، ۱۹۸۵).

دیاتومه‌ها در تمام طول سال مشاهده شده‌اند و ماکزیمم تراکم آنها در فصل پاییز و زمستان بوده است ولی بیشترین زی توده آنها در فصل تابستان مشاهده شده و این به دلیل حضور گونه‌های با اندازه بزرگتر از جمله گونه *Rhizosolenia calcoravis* در فصل تابستان بوده است که وزن و اندازه آن نسبت به گونه‌های دیگر بیشتر است. افزایش جمعیت و زی توده این شاخه در منطقه غربی بیش از مناطق میانی و شرقی بوده است و به نظر می‌رسد شرایط و فاکتورهای زیستی مناسبی جهت رشد و شکوفایی این شاخه در منطقه غربی ایجاد شده است.

شاخه پیروفیتا از نظر جمعیت و زی توده در فصل بهار به حداکثر رسیده که به دلیل رشد و شکوفایی گونه *Exuviealla cordata* می‌باشد. بیشترین جمعیت و زی توده پیروفیتا برخلاف شاخه کریزوفیتا (دیاتومه‌ها) در منطقه میانی بوده است و به نظر می‌رسد که منطقه فوق شرایط لازم برای رشد و نمو این شاخه را دارا بوده است. از مجموع اطلاعات بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت که حداکثر تراکم و زی توده فیتوپلانکتون کل چه از نظر پراکنش و چه در بررسی ترانسکتها، فصلی و ناحیه‌ای در درجه اول مربوط به حضور شاخه کریزوفیتا (دیاتومه‌ها) با بیش از ۷۵ درصد و در درجه دوم مربوط به شاخه پیروفیتا نزدیک به ۱۷ درصد می‌باشد.

تشکر و قدردانی

از مسئول محترم گروه پلانکتون آقای مهندس ابوالقاسم روحی و همکار محترم آقای مهندس ابوالفضل مهدوی و همچنین از همکاران بخش بوم‌شناسی مراکز مازندران و گیلان که در این امر سهم بسزایی داشته‌اند و از خانم احترام‌السادات علوی جهت نوشتار رایانه‌ای کمال سپاسگزاری و تشکر را داریم.

منابع

- پیروشکینا، آ.ای، لاورینکو، ای و ماکارووا، ۱۹۶۸. جلبکهای پلانکتونی لنینگراد. ۲۹۰ صفحه. زابلینا، ام. ام.؛ کیلف، ای. آ.؛ پیروشکینا، آ. ای؛ لاورینکو، و شیشوکوما، اس.، ۱۹۵۱. جلبکهای دیاتومه‌ای، مسکو انتشارات دولتی علوم شوروی. چاپ چهارم. ۶۵۰ صفحه.
- سلمانوف، ام. آ.، ۱۹۸۷. نقش میکروفلورها و فیتوپلانکتون‌ها در پروسه‌های تولیدی دریای خزر. ترجمه: ابوالقاسم شریعتی، مرکز علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان، رشت. ۳۴۹ صفحه.
- قاسم اف، ع. ح. و باقراف، ر. م.، ۱۹۸۳. بیولوژی کنونی دریای خزر. ترجمه: فتح‌الهی پور، مرکز تحقیقات شیلات استان گیلان. ۱۸۴ صفحه.
- گنجیان، ع.؛ حسینی، س. ع.؛ خسروی، م. و کیهان‌ثانی، ع.، ۱۳۷۷. بررسی تراکم و پراکنش گروه‌های عمده فیتوپلانکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر. مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران. مجله علمی شیلات ایران، شماره ۲، سال هفتم، تابستان ۱۳۷۷، صفحات: ۹۵ تا ۱۰۷.
- مائی سیوفیلاتووا، ۱۹۸۵. جانوران و تولیدات زیستی دریای خزر. ترجمه: ابوالقاسم شریعتی، مؤسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران. ۴۰۵ صفحه.
- Clesceri, L.S. ; Greenberg, A.E. and Trussell, R.R. , 1989.** Standard method. American Public Health Association, Washington, U.S.A. 1444 P.
- Ffany, H. and Britton, L.E. , 1971.** The Algae of Illinois, New York, USA. 150 P.
- Habit, R.N. and Pankow, H. , 1976.** Algeno Floraderostsee Vebgusta Fischers Verlagjena 493 P.
- Newell, G.E. , 1977.** Marine plankton. Hutchinson Co. London, 320 P.
- Prescott, G.W. , 1962.** Algae of the western Great Lakes area. Michigan, U.S.A. 333 P.

Sorina, A. , 1978. Phytoplankton Manual. Unesco, Paris, 140 P.

Vollenweider, A.R. , 1974. A manual on methods for measuring primary production in aquatic environmental. Blackwell Scientific Publication. Oxford, London, UK. 423 P.

Distribution Pattern of Phytoplanktons (Chrysophyta and Pyrrophyta) in the Southern Caspian Sea

Ganjian, A.⁽¹⁾ and Makhloogh, A.⁽²⁾

aganjian2002@yahoo.com

I.F.R.O.

Ecology Dept., Mazandaran Fisheries Research Center, P.O.Box: 961

Sari, Iran

Received : November 2001

Accepted : January 2002

Key words : Phytoplankton, Chrysophyta, Pyrrophyta, Caspian Sea, Iran

ABSTRACT

In regard to study the distribution pattern of phytoplanktons (with emphasize on chrysophyta and pyrrophyta), a series of 4 cruises were carried out seasonally in 1996. A total of 93 species belong to 2 main phyllums of chrysophyta (mainly diatoms) and pyrrophyta were identified consist of 73 and 20 species, respectively. The diatoms have an important role in the whole Caspian Sea from point of species diversity and on the other hand contain the most abundance and biomass in all seasons.

There are two main species of *Rhizosolenia calcaravis* (belong to chrysophyta) and *Exuviella cordata* (from Pyrrophyta) inhabit in the southern Caspian Sea.

Comparing the density and biomass of different phyllums of phytoplanktons showed that chrysophyta with 75% and pyrrophyta with 17% are the most abundant phytoplanktons in the said region.