

The effect of regular high-intensity interval exercise on some apoptotic factors in the brain tissue of old female rats

Hasani S¹, Habibian M^{2*}

1- Department of Physical Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, I. R. Iran.

2- Department of Physical Education, Qaemshahar Branch, Islamic Azad University, Qaemshahar, I. R. Iran.

Received: 2017/09/22 | Accepted: 2018/02/24

Abstract:

Background: The aging process is associated with a progressive deterioration of tissues and organs. Apoptotic cell death has been known as a possible causal factor in age-related pathologies. Therefore, this study was conducted to assess the effect of regular high-intensity interval exercise on some apoptotic factors in the brain tissue of aged female rats.

Materials and Methods: In this experimental study, 14 aged female Wistar rats were selected and randomly divided into two equal groups ($n=7$) of control and exercise. The animals performed 10 bouts of 1-min high-intensity treadmill running ($20\text{--}34 \text{ m}\cdot\text{min}^{-1}$), separated by 2 min of rest, for 3 days a week for 8 weeks. The rats were killed 48 h after the last treatment and their brain Bax and Bcl-2 levels were evaluated by the ELISA method.

Results: The results showed that an 8-week, high-intensity interval exercise decreased brain Bax levels in aged rats ($P<0.05$). However, a significant increase was observed in the levels of brain Bcl-2 in the exercise group ($P<0.05$).

Conclusion: It seems that a high-intensity exercise may mediate part of its protective effect against aging-induced apoptosis, by increasing brain Bcl-2 and suppressing Bax levels in brain.

Keywords: Apoptotic, Brain, High-intensity interval training

* Corresponding Author.

Email: Habibian_m@yahoo.com

Tel: 0098 911 128 5726

Fax: 0098 11 421 55221

Conflict of Interests: No

Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, June, 2018; Vol. 22, No 2, Pages 128-133

Please cite this article as: Hasani S, Habibian M. The effect of regular high-intensity interval exercise on some apoptotic factors in the brain tissue of old female rats. *Feyz* 2018; 22(2): 128-33.

اثر تمرین منظم تناوبی پرشدت بر برخی از شاخص‌های آپوپتویک در بافت مغز موش‌های صحرایی ماده پیر

*^۱ سپیده حسنی ، معصومه حبیبیان

خلاصه:

سابقه و هدف: فرایند پیری با زوال تدریجی بافت‌ها و اندام‌ها همراه است. مرگ سلولی آپوپتویک به عنوان یک عامل احتمالی در بروز آسیب‌های مرتبط با افزایش سن شناخته شده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تمرین منظم تناوبی پرشدت بر سطوح برخی از شاخص‌های آپوپتویک در بافت مغزی موش‌های صحرایی ماده پیر انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق تجربی ۱۴ سر موش صحرایی ماده پیر نژاد ویستار به صورت تصادفی به ۲ گروه (۷تایی) کنترل و تمرین تقسیم شدند. حیوانات ۱۰ دوره تمرین تناوبی پرشدت دویلن روی نوارگردان با سرعت ۳۴-۲۰ متر در دقیقه به مدت ۱ دقیقه و همراه با ۲ دقیقه استراحت بین دوره‌ها، ۳ روز در هفته و به مدت ۸ هفته اجرا نمودند. موش‌ها ۴۸ ساعت پس از آخرین مداخله کشته شدند و سطوح مغزی Bax و Bcl-2 به روش الایزا تعیین شد.

نتایج: نتایج نشان داد که ۸ هفته تمرین تناوبی پرشدت موجب کاهش سطوح مغزی Bax در موش‌های صحرایی ماده پیر شده ($P<0.05$)، و باعث افزایش معنی‌دار سطوح مغزی Bcl-2 در موش‌های گروه تمرین می‌شود ($P<0.05$).

نتیجه‌گیری: ممکن است تمرینات تناوبی پرشدت بخشی از اثرات حفاظتی خود در را در مقابل آپوپتوز ناشی از پیری به واسطه افزایش پروتئین ضد آپوپتویک Bcl-2 و سرکوب پروتئین پروآپوپتویک Bax در مغز میانجی‌گری نماید.

واژگان کلیدی: آپوپتوز، مغز، تمرین تناوبی پرشدت

دو ماهنامه علمی- پژوهشی فیض، دوره بیست و دوم، شماره ۲، خرداد و تیر ۹۷، صفحات ۱۳۳-۱۲۸

مقدمه

پیری یک فرایند پیچیده و طبیعی است که با بسیاری از تغییرات فیزیولوژیک و اختلالات عملکردی همراه است و پیر شدن مغز نیز یکی از ابعاد مهم این فرایند است [۱]. با افزایش سن، عملکردی‌های شناختی و فکری دچار اختلال می‌شوند، اما تا زمان مشاهده با بیماری‌های دیگر، در معابینات بالینی افراد مسن قابل تشخیص نیستند [۲]. با این وجود، بیش از ۵۰ درصد از افراد ۸۵ ساله دچار اختلالات غیرپاتولوژیک شناختی ساده در حافظه تا زوال عقل می‌شوند [۳]. نتایج حاصل از مطالعات انجام شده روحی مغز انسان و مدل‌های حیوانی نشان می‌دهند که از دست رفتن سلول‌های عصبی به واسطه آپوپتوز، ارتباط زیادی با اختلالات عملکردی مانند زوال عقل و ناقانعی‌های حرکتی دارد [۴]. همچنین، پیری مغزی با از دست دادن اتصالات سیناپسی و آپوپتوز نورونی همراه است [۵].

آپوپتوز یا مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی یک شکل فیزیولوژیکی از مرگ سلولی است که در دوران رشد و نمو جنبینی و پیری رخ می‌دهد. همچنین، آپوپتور نامناسب یا بیش از حد در بسیاری از شرایط پاتولوژیک منجر به ازبین‌رفتن نورومنها می‌شود [۶]. خانواده Bcl-2 نقش مهمی در تنظیم مرگ سلولی سیستم عصبی بالغ دارند و دست کاری فارمومکولوژیکی عمل خانواده Bcl-2 می‌تواند مزایای زیادی در سکته مغزی و بیماری‌های تحلیل‌برنده بافت عصبی ایفا نماید [۷]. پروتئین‌های خانواده Bcl-2 از جمله پروتئین‌های کلیدی هستند که نقش حیاتی در تنظیم آپوپتوز ایفا می‌کنند. خانواده Bcl-2 به پروتئین‌های ضد آپوپتوز (Bcl-2، Bax، BCL-XL و غیره) و پروتئین‌های پروآپوپتویک خانواده Bax طبقه‌بندی می‌شود؛ این پروتئین‌ها نقش حیاتی در تنظیم مسیر آپوپتوزی ذاتی و اصلی (میتوکندری) ایفا می‌کنند [۶]. نشان داد شده است که القاء پیری مغز [۱] و یا القای بیماری شیزوفرنی [۸] با کاهش بیان Bcl-2، افزایش بیان Bax به ترتیب در بافت‌های مغز و هیپوکامپ موش‌های صحرایی همراه بوده و متعاقب مداخله‌های دارویی و فعالیت ورزشی معکوس می‌شود. امروزه بیشتر افراد مبتلا به پیری مغزی- عصبی طبیعی می‌شوند و دانشمندان هشدار داده‌اند که دست‌یابی به روش‌های درمان اختلالات عصبی در آینده نزدیک بعید است [۹]. فعالیت ورزشی بسیاری از جنبه‌های عملکرد مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات گسترده‌ای بر سلامت کلی

۱ کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنه، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

۲ دانشیار، گروه تربیت بدنه، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

* لشان نویسنده مسئله؛

قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، گروه تربیت بدنه

تلفن: ۰۹۱۱۱۲۸۵۷۲۶ دوچرخه‌سواری: ۱۱۴۳۱۵۵۲۳۱

پست الکترونیک: Habibian_m@yahoo.com

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۶/۶/۱۲/۵ تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۶/۳۱

بین دوره‌ها اجرا می‌شد که با سرعت ۲۰ متر/دقیقه در هفته اول شروع شده و با افزایش تدریجی (۲ متر/دقیقه در هر هفته) به سرعت ۳۴ متر/دقیقه در هفته هشتم رسید [۱۵، ۱۶]. همچنین، ۵ دقیقه زمان قبل و بعد از تمرين برای گرم و سرد کردن حیوانات در نظر گرفته شد. پروتکل تمرينی در ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و با رعایت قوانین و دستورالعمل‌های بین‌المللی مبتنی بر مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی انجام شد. در ضمن تمام جنبه‌های اخلاقی و حقوقی این پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بررسی و تأیید شد. هشت هفته پس از اجرای تحقیق، تمام حیوانات با شرایط کاملاً مشابه و به دنبال ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتابی و ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرينی و تزریقات بی‌هوش و کشته شدند. بافت مغز پس از شکافتن جمجمه به دقت جدا شدو پس از شستشو با آب مقطمر، در دمای ۷۰–۷۵ فریز شد. پس از هموژنیزه کردن بافت مغز در بافر پروتاز (PBS، pH 7.4)، سطوح مغزی Bcl-2 و Bax با استفاده از روش الیزا و کیت‌های ویژه شرکت کازابایو کشور چین به ترتیب با حساسیت کمتر از ۰/۰۷۸ نانوگرم/میلی‌لیتر و ۰/۰۷۸ پیکوگرم/میلی‌لیتر تعیین شد. توزیع طبیعی داده‌ها و برابری واریانس‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و لون مشخص شد. از آزمون t مستقل برای تعیین اختلاف میزان ساخته‌های مورد نظر بین دو گروه کنترل و تمرين استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ در سطح معنی‌داری $P < 0/05$ انجام شد.

نتایج

یافته‌ها نشان داد که پس از ۸ هفته تمرين نتاوبی پرشدت سطوح مغزی Bcl-2 گروه تمرينی ($25/95 \pm 3/26$ نانوگرم/میلی‌گرم) در مقایسه با گروه کنترل ($20/36 \pm 2/09$ نانوگرم/میلی‌گرم) افزایش معنی‌دار یافت ($P = 0/002$ ، شکل شماره ۱). همچنین، سطوح مغزی Bax در گروه تمرين ($10/09 \pm 1/67$ نانوگرم/میلی‌گرم) در مقایسه با گروه کنترل ($7/72 \pm 0/92$ نانوگرم/میلی‌گرم) به طور معنی‌داری پایین‌تر بود ($P = 0/006$ ، شکل شماره ۲). در حالی که نسبت Bax به Bcl-2 ($Bax/Bcl-2$) متعاقب تمرين نتاوبی پرشدت در گروه تمرين ($0/30 \pm 0/01$) در مقایسه با گروه کنترل ($0/49 \pm 0/03$) کاهش معنی‌داری یافت ($P < 0/001$).

بحث

اگرچه امروزه استفاده از داروها و یا مواد حمایت کننده از اعصاب امری بسیار مهم شمرده می‌شود [۱۷]، اما تمرينات ورزشی نیز یک ابزار مفید برای تحریک عروقی در اندام‌های مختلف محسوب می‌شوند [۱۴].


مغز دارد؛ به طوری که مزایای فعالیت ورزشی بر یادگیری، حافظه و حفاظت در مقابل تخریب عصبی و کاهش افسردگی، بهویژه در جمعیت سالم‌نمذ به خوبی تایید شده است [۱۰]. مشخص شده است که ورزش‌های هوازی تناوبی در جلسات ۶ تا ۱۰ دقیقه‌ای می‌تواند در بهبود ظرفیت هوازی، به خصوص برای افرادی با ظرفیت هوازی محدود موثر باشد [۱۱]. اما نگرانی‌های زیادی در مورد بی‌خطر و مناسب بودن این تمرينات وجود دارد. از سوی دیگر، تمرينات تناوبی باشد زیاد ممکن است از نظر بالینی خطرات منحصر به‌فردی را برای مغز در دوره کوتاه‌مدت ایجاد کنند [۱۲]. در تحقیقات قبلی تاثیر فعالیت ورزشی تداومی بر افزایش Bcl-2 و کاهش Bax در بافت مغز مدل‌های حیوانی مبتلا به بیماری آنژایمر گزارش شده است [۱۳]. با این وجود، در خصوص تاثیر تمرينات تناوبی با استفاده از یک مدل حیوانی از موش‌های پیر ماده یائسه و در شرایط پیری طبیعی مطالعه‌ای مشاهده نشد. قبل از بازنویسی دستورالعمل‌های ورزشی با تمرينات کوتاه‌تر و با شدت بالا، گزینه‌ای که راحت‌تر و به طور مسلم موثرتر برای جمعیت‌های سالم و بیمار به نظر می‌رسد این می‌باشد که مقاهم عملکردی این تمرينات برای سلامت مغز چه می‌باشد [۱۲]. به علاوه، با توجه به افزایش جمعیت سالم‌نمذ و شیوع بیماری‌های مغزی مربوط به دوران پیری مانند بیماری آنژایمر و پارکینسون، شناسایی و انتخاب تمرينات ورزشی مطلوب‌تر استراتژی‌های مهمی به منظور حفظ سلامت مغز در پیری محسوب می‌شوند [۱۴]. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تمرين منظم تناوبی پرشدت بر سطوح مغزی برخی از شاخص‌های آپوپتویک در موش‌های صحرائی ماده پیر انجام شد.

مواد و روش‌ها

برای انجام پژوهش تجربی حاضر ۱۴ سر موش صحرائی ماده مسن نژاد ویستار (بیش از ۲۴ ماه که در مرحله یائسگی بودند) با میانگین وزنی $250-300$ گرم به صورت تصادفی به ۲ گروه کنترل و تمرين نتاوبی پرشدت (۷ سر موش در هر گروه) تقسیم شدند. یک هفته قبل از شروع پروتکل اصلی و به منظور آشنایی با برنامه تمرينی، موش‌های گروه تمرين ۵ روز و به مدت ۵ دقیقه تمرين داده شدند و سرعت رسیدن هر حیوان تا رسیدن به واماندگی از طریق افزایش تدریجی سرعت تمرين تعیین شد. برنامه تمرينی اصلی ورزشی شامل دویدن روی نوارگردان (بدون شب) ویژه جوندگان به مدت ۸ هفته و ۳ جلسه در هفته بود. هر جلسه تمرينی نیز در ۱۰ دوره فعالیت ۱ دقیقه‌ای با شدت ۷۰ درصد سرعت حداکثر (رسیدن به واماندگی) و ۲ دقیقه استراحت


اثر تمرین تنابی بر شاخص‌های آپوپتوزی مغز، ...

متابولیکی و سمی همراه است [۵]. قبل از دریافت یک محرك مرگ، پروتئین ضد آپوپتوزی Bcl-2 به صورت داخل سلولی با Bax هترومر می‌شود. در صورت بیان اضافی Bcl-2 این مولکول-ها تشکیل همودایمر می‌دهند و به طور همزمان آپوپتوز ناشی از تحريك را مهار می‌کنند. به طور معکوس بیان اضافی Bax منجر به همودایمر شدن خودش و در نتیجه افزایش حساسیت به محرك-های آپوپتویک می‌شود [۱۹]. آپوپتوز مغزی بیان گر شرایط پاتولوژیکی مختلف است که منجر به پیری مغز شده و به عنوان یک شاخص آسیب مغزی به کار می‌رود [۲۰]. بنابراین، بهم خوردن تعادل آپوپتوزی و شیفت آن به سمت افزایش Bcl-2 متعاقب مداخله تمرین تنابی تحقیق، ممکن است با اثرات حمایت مغزی همراه باشد. در این راستا Um و همکاران [۱۳] نشان داده‌اند که پس از ۱۶ هفته فعالیت ورزشی سطوح افزایش یافته Bax در بافت مغز موش‌های کوچک مبتلا به بیماری آزایمیر کاهش یافته و مقادیر Bcl-2 به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد. این در حالی است که مختاری زائر و همکاران [۶] افزایش بیان Bcl-2 و سرکوب Bax در بافت هیپوکامپ موش‌های صحرایی وابسته به مورفين را پس از ۱۰ روز فعالیت‌های ورزشی اختیاری (چرخ دوار) و یا اجباری با شدت کم مشاهده نمودند. Chung و همکاران [۸] نیز سرکوب شاخص‌های پروآپوپتویک عصی Bax کاهش در نسبت افزایش یافته Bax به Bcl-2 و همچنین تنظیم مثبت بیان Bcl-2 در موش‌های کوچک مبتلا به شیزوفرنی را متعاقب ۲ هفته فعالیت ورزشی شامل ۶۰ دقیقه دویدن روی نوار گردان بدون شب گزارش داده‌اند. اگرچه مطالعاتی درخصوص تاثیر تمرینات تنابی پرشدت بر بافت مغز موش‌های پیر مشاهده نشد که از محدودیت‌های این تحقیق نیز محسوب می‌شود، ولی با مقایسه مطالعات مورد بحث و نتایج تحقیق حاضر به نظر می‌رسد که فعالیت ورزشی دارای اثرات محافظت نورونی بوده و خطر ابتلاء به بیماری‌های مغزی را کاهش می‌دهد. مشابه با نتایج تحقیق حاضر، Fang و همکاران [۲۱] نشان داده‌اند که پس از ۱۲ هفته تمرین روی نوار گردان سطوح Bcl-2 در هیپوکامپ و قشر مغز موش‌های پیر افزایش می‌یابد. همچنین، فعالیت ورزشی از طریق فسفوریل‌اسیون پروتئین کیناز B منجر به کاهش سطوح فاکتورهای پروآپوپتویک Bax و سیتوکروم C در نتیجه مهار آپوپتوز در این مناطق مغزی می‌شود. ارتباط مثبت بین آمادگی هوایی، سلامت مغز و عملکرد شناختی، پایه‌ای برای هدف قرار دادن آمادگی قلبی-عروقی از طریق مداخلات ورزش‌های هوایی فراهم می‌کند [۲۲]. بر اساس مشاهدات قلبی تمرینات تنابی با شدت زیاد در مقایسه با تمرینات ورزشی تداومی با تاثیر بیشتری بر توسعه



شکل شماره ۱- اثر تمرین منظم تنابی پرشدت بر سطوح Bcl-2 بافت مغز موش‌های صحرایی ماده پیر

$P < 0.05$ در مقایسه با گروه کنترل (*): داده‌ها بر اساس میانگین و انحراف معیار است.



شکل شماره ۲- اثر تمرین منظم تنابی پرشدت بر سطوح Bax بافت مغز موش‌های صحرایی ماده پیر

$P < 0.05$ در مقایسه با گروه کنترل (*): داده‌ها بر اساس میانگین و انحراف معیار است.

بر اساس یافته‌های پژوهش ۸ هفته تمرین تنابی پرشدت منجر به کاهش معنی‌دار در سطوح مغزی Bax و نسبت Bax/Bcl-2 بافت مغزی در موش‌های صحرایی ماده پیر شد که بیان گر تاثیر حفاظتی تمرین تنابی پرشدت از بافت مغزی موش‌های پیر از طریق مسیرهای تنظیمی مطلوب شاخص‌های آپوپتویک است. در این راستا Keleshian و همکاران [۱۸] نشان داده‌اند افزایش سن، بیان mRNA شاخص پروآپوپتویک Bax همراه با شاخص‌های التهابی و اکسایشی در بخش قشری فرونتال مغز افزایش یافته و سطوح Bcl-2 کاهش می‌یابد. علاوه بر این، Wu و همکاران [۱] نیز گزارش نموده‌اند که القا پیری مغز منجر به افزایش استرس اکسایشی، کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، کاهش بیان Bcl-2 و افزایش بیان Bax در بافت مغز موش‌های صحرایی تیمار شده با D گالاکتوز می‌شود. پیری مغز با از دست رفتن اتصالات سیناپسی و آپوپتوز نورونی همراه است و منجر به تغییر در عملکرد شناختی می‌شود. روند پیری و اختلال مرتبط با آن با ترکیبی از استرس‌های اکسیداتیو،

نتیجه گیری

براساس یافته‌های پژوهش بخشی از اثرات حفاظتی تمرین تناوبی پرشدت در مقابل آپوپتوز بافت مغز پیر ممکن است به واسطه افزایش پروتئین ضدآپوپتیک Bcl-2 و سرکوب پروتئین پروآپوپتیک Bax میانجی‌گری شود. لذا، با توجه به نقش تمرین تناوبی پرشدت به عنوان یک مداخله غیردارویی در بهبود زندگی دوران سالم‌مندی و داشتن پیری مغز نرمال اجرای تحقیقات گستردۀ تر با تعداد نمونه‌های بیشتر به منظور درک دقیق‌تر مکانیسم‌های مداخله گر در فرآیند آپوپتوز مغز در دوران پیری ضرورت دارد.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با کد ۲۰۸۲۱۴۰۴۹۴۲۰۳۶ می‌باشد. بدین‌وسیله، از کلیه همکارانی که در اجرای این این تحقیق ما را یاری نمودند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

References:

- [1] Wu W, Wang X, Xiang Q, Meng X, Peng Y, Du N, et al. Astaxanthin alleviates brain aging in rats by attenuating oxidative stress and increasing BDNF levels. *Food Funct* 2014; 5(1): 158-66.
- [2] Park DC, Yeo SG. Aging. *Korean J Audiol* 2013; 17(2): 39-44.
- [3] Paillard T. Preventive effects of regular physical exercise against cognitive decline and the risk of dementia with age advancement. *Sports Med Open* 2015; 1(1): 20.
- [4] Chung HY, Sung B, Jung KJ, Zou Y, Yu BP. The molecular inflammatory process in aging. *Antioxid Redox Signal* 2006; 8(3-4): 572-81.
- [5] Esiri MM. Ageing and the brain. *J Pathol* 2007; 211(2): 181-7.
- [6] Mokhtari-Zaeer A, Ghodrati-Jaldbakhan S, Vafaei AA, Miladi-Gorji H, Akhavan MM, Bandegi AR, et al. Effects of voluntary and treadmill exercise on spontaneous withdrawal signs, cognitive deficits and alterations in apoptosis-associated proteins in morphine-dependent rats. *Behav Brain Res* 2014; 271: 160-70.
- [7] Akhtar RS, Ness JM, Roth KA. Bcl-2 family regulation of neuronal development and neurodegeneration. *Biochim Biophys Acta* 2004; 1644(2-3): 189-203.
- [8] Chung JW, Seo JH, Baek SB, Kim CJ, Kim TW. Treadmill exercise inhibits hippocampal apoptosis through enhancing N-methyl-D-aspartate receptor expression in the MK-801-induced schizophrenic mice. *J Exec Rehabil* 2014; 10(4): 218-24.
- [9] Mattson MP, Magnus T. Ageing and neuronal vulnerability. *Nature Reviews Neurosci* 2006; 7: 278-94.
- [10] Cotman CW, Berchtold NC, Christie LA. Exercise builds brain health: key roles of growth factor cascades and inflammation. *Trends Neurosci* 2007; 30(9): 464-72.
- [11] Macfarlane DJ, Taylor LH, Cuddihy TF. Very short intermittent vs continuous bouts of activity in sedentary adults. *Prev Med* 2006; 43(4): 332-6.
- [12] Lucas SJ, Cotter JD, Brassard P, Bailey DM. High-intensity interval exercise and cerebrovascular health: curiosity, cause, and consequence. *J Cereb Blood Flow Metab* 2015; 35(6): 902-11.
- [13] Um HS, Kang EB, Leem YH, Cho IH, Yang CH, Chae KR, et al. Exercise training acts as a therapeutic strategy for reduction of the pathogenic phenotypes for Alzheimer's disease in an NSE/APPsw-transgenic model. *Prev Med* 2008; 22(4): 529-39.
- [14] Ding Q, Vaynman S, Souda P, Whitelegge JP, Gomez-Pinilla F. Exercise affects energy metabolism and neural plasticity-related proteins in the hippocampus as revealed by proteomic analysis. *Eur J Neurosci* 2006; 24(5): 1265-76.
- [15] Hoshino D, Yoshida Y, Kitaoka Y, Hatta H, Bonen A. High-intensity interval training increases intrinsic rates of mitochondrial fatty acid oxidation in rat red and white skeletal muscle. *Appl Physiol Nutr Metab* 2013; 38(3): 326-33.
- [16] Songstad NT, Kaspersen KH, Hafstad AD, Basnet P, Ytrehus K, Acharya G. Effects of High Intensity Interval Training on Pregnant Rats, and the Placenta, Heart and Liver of Their Fetuses. *PLoS One* 2015; 10(11): e0143095.
- [17] Commenges D, Scotet V, Renaud S, Jacqmin-Gadda H, Barberger-Gateau P, Dartigues JF. Intake

عملکرد نورولوژیکی و حافظه موش‌های دچار ایسکمی عروق مغزی همراه بوده است [۲۳]. با این وجود، فعالیت ورزشی می‌تواند از طریق کاهش استرس اکسایشی، کاهش التهاب و تنظیم مثبت دفاع آنتی‌اکسیدانی [۱۳, ۲۴] و افزایش پروتئین ضدآپوپتیک Bcl-2 نیز می‌تواند منجر به کاهش شاخص‌های پروآپوپتیک Bax در بافت مغز موش‌های پیر شود. در تحقیق حاضر وضعیت استرس اکسایشی و آنتی‌اکسیدان‌ها تعیین نشد که از محدودیت‌های دیگر این تحقیق نیز محسوب می‌شود. با این وجود، محققین نشان داده‌اند که ۱۵ هفته تیمار با جنیستین (دارای خواص آنتی‌اکسیدانی بالا) منجر به کاهش آپوپتوز نورونی، تنظیم مثبت بیان Bcl-2 و تنظیم منفی بیان Bax در هیپوکامپ موش‌های صحرائی اورکتومی شده می‌شود [۲۵]. همچنین، تیمار مزمن با آستاگزان‌تین منجر به کاهش مالون-دی‌آلدید و کربنیل‌اسپون پروتئین، افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها و همچنین کاهش بیان Bax، افزایش بیان Bcl-2 و افزایش نسبت Bcl-2/Bax در مغز موش‌های صحرائی پیر شده [۱] که می‌تواند تاییدی بر این مکانیسم پیشنهادی باشد.

- of flavonoids and risk of dementia. *Eur J Epidemiol* 2000; 16(4): 357-63.
- [18] Keleshian VL, Modi HR, Rapoport SI, Rao JS. Retracted: Aging is associated with altered inflammatory, arachidonic acid cascade, and synaptic markers, influenced by epigenetic modifications, in the human frontal cortex. *J Neurochem* 2013; 125 (1): 63-73.
- [19] Shacka JJ, Roth KA. Bcl-2 family and the central nervous system: from rheostat to real complex. *Cell Death Differ* 2006; 13(8): 1299-304.
- [20] Zhang C, Bazan NG. Lipid-mediated cell signaling protects against injury and neurodegeneration. *J Nutr* 2010; 140(4): 858-63.
- [21] Fang G, Zhao J, Li P, Li L, Yu T, Yang X, et al. Long-term treadmill exercise inhibits neuronal cell apoptosis and reduces tau phosphorylation in the cerebral cortex and hippocampus of aged rats. *Sci Bulletin* 2017; 6 (11): 755-7.
- [22] Kirk-Sanchez NJ, McGough EL. Physical exercise and cognitive performance in the elderly: current perspectives. *Clin Interv Aging* 2014; 9: 51-62.
- [23] Rezaei R, Nourshahi M, Khodagholi F, Haghparast A, Nasoohi S, Bigdeli M, et al. Differential impact of treadmill training on stroke-induced neurological disorders. *Brain Inj* 2017; 31(13-14): 1910-7.
- [24] Cho JY, Um HS, Kang EB, Cho IH, Kim CH, Cho JS, et al. The combination of exercise training and alpha-lipoic acid treatment has therapeutic effects on the pathogenic phenotypes of Alzheimer's disease in NSE/APPsw-transgenic mice. *Int J Mol Med* 2010; 25(3): 337-46.
- [25] Peng Y, Jiang B, Wu H, Dai R, Tan L. Effects of genistein on neuronal apoptosis, and expression of Bcl-2 and Bax proteins in the hippocampus of ovariectomized rats. *Neural Regen Res* 2012; 7(36): 2874-81.