

دانشگاه علوم بزشکی کرمان *

دانشکده پرستاری و مامایی رازی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش روانپرستاری)

عنوان:

تاثیر تخلیه هیجانی با نوشتن بر میزان افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهر کرمان در سال ۱۳۹۴

توسط: فرشته خالقي

استاد راهنما اول: سكينه ميرى استاد راهنما دوم: دكتر بتول پورابولى استاد مشاور: دكتر مهلقا دهقان

سال تحصیلی : ۹۷–۹۶





Kerman University of Medical Sciences Faculty of Nursing & Midwifery Razi

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree M.Sc of Nursing (Neonatal intensive care nursing)

Title:

The Effect of Emotional Disclosure by Writing on Depression of Patients
Undergoing Hemodialysis in Kerman City in 2015

By:

Fereshteh Khaleghi

Supervisor/s:

1-Sakineh Miri

2-Dr Batool pouraboli

Advisor/s:

Dr Mahlagha Dehghan

Year:

2018

.(P<

هسودیالیز موثر ، متغیرها از قبیل ، کلید واژهها: تخل

تيج کيري:

مقدمه: افسردگی و اضطراب شایعترین مشکلات روانشناختی در بیماران تحت همودیالیز هستند؛ در صورت عدم درمان مناسب، افسردگی میتواند سبب ناتوانی جسمی و هیجانی، کساهش کساراًئی فسرد مبستلا و مشکلات خانوادگی برای وی گردد. بیان هیجانات منفی به عنوان یک مداخله روانشناسی یا پزشکی بنظر میرسد بتواند تاثیرات مطلوبی را بر سلامت جسم و روان داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تخلیه هیجانی با نوشتن بر میزان افسردگی بیماران تحت همودیالیز در شهر کرمان انجام شده است.

روش کار: مطالعه حاضر به صورت مداخلهای و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنتـرل ، در سـال ۱۳۹۴ بـر روی ۱۴۰ بیمار تحت درمان با همودیالیز در مراکز همودیالیز شهر کرمان انجام گردید. بیماران پس از قبول رضایت نامه کتبی و شفاهی و تکمیل پرسشنامه DASS-21 به دو صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شـدند و از گروه مداخله خواسته شد که در چهار روز متوالی روزانه ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در مورد عمیق ترین هیجانات و افکار منفی خود بدون توجه به نکات املایی و نگارشی بر روی کاغذ بنویسند در حالی که برای گروه شاهد کاری انجام نشـد. سـپس ۲ بدون توجه به نکات املایی و نگارشی بر روی کاغذ بنویسند در حالی که برای گروه شاهد کاری انجام نشـد. سـپس ۲ هفته بعد از اتمام مداخله مجددا پرسشنامه DASS-21 تکمیل گردید و در نهایت دادههای حاصل از پرسشنامه با SPSS نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: میانگین نمره افسردگی در این بیماران قبل و بعد از مداخله متوسط به بالا بود و با متغیرهای دموگرافیک ارتباط معناداری نداشت. نمره افسردگی پس از مداخله در گروه مداخله نسبت به قبل از مداخله کاهش و در در گروه کنترل افزایش یافت که این افزایش نمره در گروه کنترل می تواند ناشی از عدم همسان سازی برخی ویژگیهای دموگرافیک نمونه ها باشد. اختلاف نمره افسردگی در قبل و بعد از مداخله بین دو گروه از نظر آماری معنادار بود (۰٫۰۵

تیجه گیری: تخلیه هیجانی از طریق نوشتن هیجانات و افکار منفی می تواند بر میزان افسردگی بیماران تحت معودیالیز موثر باشد، اما با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر در عدم همسان بودن گروه ها در خصوص برخی معودیالیز موثر باشد، اما با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر در عدم همسان بودن گروه ها در خصوص برخی معودیالیز موثر باشد، اما با توجه به محدودیت های مطالعه حاضر در این زمینه پیشنهاد می گردد.

کلید واژهها: تخلیه هیجانی، نوشتن، همودیالیز، افسردگی

، عدم

ـتلا و

وسلا

نی با

۱۳ بـر

ت نامه

نند و از

في خود

سیس ۲

SPSS ا

وگرافيـک

در گــروه

گے ہای

یـود (۰٫۰۵

Abstract

Background and Objective: Dialysis is a stressful process and causes many psychological and social problems that could be the cause of mental illness in patients. The results of Previous studies show the high prevalence of psychosocial disorders in hemodialysis patients. Depression and anxiety are the most common psychological problems in these patients, which lead to Their death in severe cases. In the absence of Appropriate treatments, depression can lead to physical and emotional disabilities, early death, decreased efficacy and family problems. Emotional Disclosure as a psychological or medical intervention may have beneficial effects on physical and mental health. The aim of this study was to investigate the effect of Emotional Disclosure by writing on depression of hemodialysis patients in Kerman.

Methods: This interventional study, Pre-test and Post-test design was done on 140 patients undergoing hemodialysis in Related centers of Kerman in 1394. Patients were divided into intervention and control groups after accepting oral and written consent and completing DASS-21 questionnaire. Intervention group was asked to write 15 to 20 minutes per day in four consecutive days about their deepest emotions and negative thoughts, while control in group did not do this. After two Week They Filled it Again. Data were analyzed by SPSS v.16.

Results: The average of Depression score in these patients was moderate to high and did not have a significant relationship with demographic variables. In the intervention group, depression scores decreased after the intervention and This scores increased significantly after intervention in the control group. The difference in depression scores before and after intervention was statistically significant between the two groups (P < 0.05).

Conclusion: Emotional Disclosure by writing emotions and negative thoughts can be effective on Depression of patients undergoing hemodialysis, However, Considering the limitations of the present study due to unmatched variables, such as age in Two groups, ore studies are suggested in this area

Key words: Emotional Disclosure, writing, hemodialysis, depression



تاريخ ٩٠٠ ١٢.١٢. ٢٩٠
شماره ۱۱۱۱۰ کر ۱۲۰۰ مرکزی

بسمه تعالی صورتجلسه دفاع از پایان نامه

الشكاء علوم پزشكى كرمان

جلسه دفاعیه پایان نامه تحصیلی خانم فرشته خالقی تاج آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری ورودی ۹۳ تحت عنوان " بررسی تأثیر حلیه هیجانی با نوشتن بر افسردگی بیماران تحت همودیالیز شهر کرمان در سال ۱۳۹۶" به راهنمایی خانم سکینه میری و خانم دکتر بتول معترم هیات داوران متشکل از:

المضا	نام و نام خانوادگی	سمت
عد؟ هعذر رول	خانم سکینه میری خانم دکتر بتول پورابولی	الف : استاد راهنما
عدم حصرُردرهب ·	خانم دکتر مه لقاء دهقان	ب : استادمشاور
	خانم دکتر جمیله فرخزادیان	ج : عضو هيات داوران (داخلي)
	خانم دکتر عاطفه احمدی	د : عضو هیات داوران (خارجی)
	خانم دکتر بتول تیرگری	ه : نماینده تحصیلات تکمیلی

على گرديد و ضمن ارزيابي به شرح پيوست با درجهيالي و نمره ٨٨٨٨٨.....نيزيد فرار گرفت.

دكتر فيروزه ميرزايي رابر

مهر و ا مضاع معاون آموزشی دانشکده

9/1/10

