



دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشکده پزشکی

پایان نامه دوره پزشکی عمومی

عنوان:

بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و مصرف سیگار و قلیان در بین
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۵

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر نوذر نخعی

توسط:

مینا محمدی

سال تحصیلی:

۹۶-۹۷

مقدمه: هوش اخلاقی برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است. توجه به مقوله ی هوش اخلاقی و بررسی ارتباط آن با مصرف سیگار و قلیان می تواند گرایش جوانان را به مصرف سیگار و قلیان مورد بررسی قرار داده و بر مبنای آن سیاستگذاری های لازم بر کاهش مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان پزشکی از سوی مسئولان اتخاذ گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۵ انجام گردید.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، مقطعی بود که بر روی ۴۵۰ نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش اخلاقی دانشجویان استفاده گردید که روایی و پایایی نسخه ی فارسی آن مورد تایید است. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقدار P کمتر از ۰.۰۵ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه $25/83 \pm 2/35$ سال بود. نتایج پژوهش فوق نشان داد که ۱۶/۱ درصد افراد فقط از سیگار استفاده نموده، ۳۲/۲ درصد افراد فقط از قلیان استفاده نموده، ۱۱/۷ درصد افراد از سیگار و قلیان به صورت همزمان استفاده نموده و ۳۹/۳ درصد افراد از هیچکدام استفاده نمی کنند. نمره ی هوش اخلاقی بر حسب جنسیت ($P=0/44$)، سن ($P=0/18$) و وضعیت تاهل ($P=0/31$) اختلاف آماری معنادار وجود نداشت. میانگین نمره ی هوش اخلاقی افراد مصرف کننده ی سیگار (۷۴ نفر) $1/52 \pm 12/36$ ، افراد مصرف کننده ی قلیان (۱۴۶ نفر) $1/48 \pm 13/06$ ، افراد مصرف کننده ی سیگار و قلیان (۵۳ نفر) $1/39 \pm 11/19$ و افرادی که هیچ یک از دو ماده ی مخدر سیگار و قلیان را مصرف نمی کردند (۱۷۷ نفر) نمره ی بالا ی $1/95 \pm 16/45$ بود ($P=0/01$) - میان مصرف سیگار و قلیان به صورت همزمان ($P=0/03$) و عدم مصرف همزمان سیگار و قلیان

به صورت همزمان ($P = 0/004$) با نمره ی هوش اخلاقی شرکت کنندگان در پژوهش رابطه ی آماری معنادار وجود داشت.

نتیجه گیری: هوش اخلاقی ارتباط آماری با مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان دارد؛ بنابراین در برنامه‌های آموزشی برای پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر دانشجویان باید به هوش اخلاقی توجه ویژه داشت.

کلید واژه: هوش، اخلاق، مصرف سیگار، مصرف قلیان، دانشجویان پزشکی، ایران

Abstract

Introduction: The moral intelligence is essential for the continuous organizational and personal success. Considering the ethical intelligence and its relationship with smoking and hookahs, it can be used to study the tendency of young people to use cigarettes and hookahs. Based on this, policies are needed to reduce smoking and hookah among medical students by adopting authorities. The purpose of this study was to investigate the relationship between ethical intelligence and smoking and hookah among medical students of Kerman University of Medical Sciences in 2016.

Materials and methods: This research was a cross-sectional descriptive-analytic study conducted on 450 medical students of Kerman University of Medical Sciences. A questionnaire for students' ethical intelligence was used to collect data. The validity and reliability of its Persian version were confirmed. Data were analyzed by SPSS software version 22 and P value less than 0.05 was considered statistically significant.

Results: The mean age of the participants was 25.83 ± 2.35 years. The results of this study showed that 16.1% of people used cigarette only, 32.2% used only hookahs, 11.7% of smokers and hookahs used simultaneously and 39.3% of them did not use any of them they do not use. There was no significant difference in the score of moral intelligence based on gender ($P = 0.44$), age ($P = 0.18$) and marital status ($P = 0.31$). The mean score of ethical intelligence in smokers (74 people) was 12.36 ± 1.52 , the smokers (146 people), 13.66 ± 1.48 , smokers and hookahs (53) 11.19 ± 1.39 and those who did not consume any of the two cigarette and cigarette smoking drugs (177) had a higher score of 16.45 ± 1.95 ($P = 0.01$). There was a statistically significant relationship between smoking and hookah smoking ($P = 0.003$)

and the absence of simultaneous consumption of cigarettes and hookahs simultaneously ($P = 0.004$) with the score of moral intelligence of the participants in the research.

Conclusion: Moral intelligence has a statistically significant correlation with cigarette smoking and hookah in students; therefore, ethical intelligence should be given special attention in educational programs to prevent and reduce risky behaviors of students.

Keywords: Moral Intelligence, Smoking, Hookah, Medical Students, Iran



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
دانشکده پزشکی - آموزش بالینی

نمره نهایی دفاع از پایان نامه

پایان نامه تحصیلی دکتر مینا محمدی

تحت عنوان: بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و مصرف سیگار و قلیان در بین دانشجویان
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۵

جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲ با حضور اساتید راهنما و اعضای محترم هیئت داوری دفاع و با میانگین نمره ۲۰ مورد تایید
قرار گرفت.

سمت

استاد

استاد راهنما

دکتر نوذر نخعی



مهر و امضای دبیر کمیته بررسی پایان نامه