

Acta Botanica Hungarica 60(3–4), pp. 279–280, 2018

DOI: 10.1556/034.60.2018.3-4.2

NOMINA NONNULLA NOVA FAMILIAE RUBIACEARUM FLORAE MEXICANAЕ

A. L. BORHIDI

Instituto de Biología, Universidad de Pécs, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6, Hungría
E-mail: borhidi@gamma.ttk.pte.hu

(Received 11 June, 2018; Accepted 11 July, 2018)

Two species was described as new ones and published in the second edition of the monograph: Rubiáceas de México utilized illegitimate names, which turned to be invalid synonyms (Govaerts 2016). These are rectified in the following paper.

Kew words: *Bouvardia*, Mexico, new names, *Randia*, rectification

***Bouvardia candida* Borhidi, nomen novum**

Nombre reemplazado: *Bouvardia candidissima* Borhidi, E. Martínez et S. Salas-Morales, Acta Bot. Hung. 53: 68 (2011), Rubiáceas de México, p. 93 (2012), nomen illeg., non *Bouvardia candidissima* Hovey, Nursery Cat. (Hovey et co.) 1882: 3 (1882).

Tipo: México, Oaxaca, Mpio. Oaxaca de Juárez Jardin Etnobotánico de Oaxaca, 17° 03' 59" N, 96° 43' 20" W, 1,545 m s.n.m. Col.: C. Chávez 21 y E. Martinez, 2 Feb 2001. Holotipo: MEXU.

***Bouvardia diversiflora* Borhidi et Lozada-Pérez Acta Bot. Hung. 53: 44 (2011).**

Tipo: México, Guerrero. Mpio. Atoyac, Loc 16 km al NE de El Paraíso. Alt. 1,100 m s.n.m. Col.: J. C. Soto Núñez (10142) con S. Román G., 19 Aug. 1985. Holotipo: FCME; isotipo: MEXU.

Nombre legitimizado hoc loco. En la descripción original falta la localización de los ejemplares del tipo. Gracias al doctor R. Govaerts por haber llamado nuestra atención a la situación ilegítima anterior de la especie.

***Randia simillima* Borhidi, nomen novum**

Nombre reemplazado: *Randia similis* Borhidi et S. Salas-Morales, Acta Bot. Hung. 55: 23 (2013), nomen illeg. non *Randia similis* Craib., Bull. Misc. Inform. Kew, 1911: 391 (1911).

Tipo: México, Oaxaca, Distr. Tehuantepec, Mpio. Santa María Huamelula. La piedra barca, selva baja caducifolia sobre cerro, suelo pedregoso. Coord.: 16° 1' 11.6" N, 95° 42' 3.6" W, Alt.: 80 m s.n.m. Col.: Samuel Molina Bende (SAM) (930), 4 Jan 2011. Holotipo: MEXU; isotipo: SERO.

REFERENCIAS

- Borhidi, A. (2012): *Rubiáceas de México*. Segunda y ampliada edición. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 608 pp.
- Borhidi, A., Lozada-Pérez, L. y Salas-Morales, S. (2011): Estudios sobre Rubiáceas Mexicanas. XXXI. *Trichosiphon* y *Gymnosiphon* Borhidi, sect nov. Subgen. *Bouvardias-trum* (*Bouvardia* Salisb.) con seis especies nuevas. – *Acta Bot. Hung.* 53: 41–61. <https://doi.org/10.1556/abot.53.2011.1-2.4>
- Borhidi, A., Martínez-Salas, E. y Salas-Morales, S. (2013): Estudios sobre Rubiáceas Mexicanas XLI. Tres nuevas especies del género *Randia* L. – *Acta Bot. Hung.* 55: 17–25. <https://doi.org/10.1556/abot.55.2013.1-2.2>
- Govaerts, R. (2016): *World Checklist of Rubiaceae*. – Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <http://wcsp.science.kew.org/> [retrieved 1 June 2018]