

STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

CLINICAL ASPECTS OF MULTIPLE PREGNANCY

Rotterdam, 25 september 1996

Job Santema

1

Hypertensieve aandoeningen komen vaker voor in meerlingzwangerschappen dan in éénlingzwangerschappen.

2

Bij de geboorte van tweelingkinderen van gelijk geslacht moet onderzoek van het tussenschot als routine door de gynaecoloog worden verricht.

3

Bij tweelingzwangerschappen is geslachtsbepaling met echografie gewenst en gerechtvaardigd.

4

Landelijke Verloskundige Registratie gegevens moeten gemakkelijker toegankelijk zijn voor onderzoeksdoeleinden dan nu het geval is.

5

Tijdens de opleiding tot gynaecoloog dient de mogelijkheid te worden geboden om een stage Verloskunde in de Diergeneeskunde te volgen.

6

Selectie bij foetale reductie wordt uitsluitend bepaald door de ligging.

7

Het bloedverlies tijdens de sectio caesarea kan worden beperkt door de spontane loslating van de placenta af te wachten.

8

De hypothese dat het foeto-foetale transfusiesyndroom kan worden behandeld met laser-coagulatie van choriale vasculaire anastomosen is niet in overeenstemming met moderne inzichten in de vasculaire structuur van de monochoriale placenta.

9

In de opleiding tot medisch specialist dient wetenschappelijk onderzoek geen doel te zijn maar middel.

10

Ondanks de daarvoor bestaande theoretische argumenten is niet aangetoond dat hormonale substitutie een nadelige invloed heeft op de prognose bij vrouwen die borstkanker hebben gehad.

11

De toepassing van een nat verband op een oppervlakkige wond aan een extremiteit is niet gebaseerd op "evidence based medicine".

12

Verdriet over ongewilde kinderloosheid is invoelbaar voor ouders van een overleden kind.

13

Internationale congressen zijn nuttig voor het leggen van nationale intercollegiale contacten.

14

Als uilen het gat in het ũleboerd beheren, zal de zwaluw snel zijn vleugels keren.

