

Stellingen behorende bij het proefschrift

MULTIMODALITY TREATMENT FOR LOCALLY ADVANCED  
AND RECURRENT RECTAL CANCER

1. Registratie van patiënt en tumor gerelateerde factoren rondom de behandeling in een netwerk van participerende ziekenhuizen geeft de mogelijkheid de kwaliteit van de behandeling van patiënten in dit netwerk met een rectumcarcinoom te verbeteren. (dit proefschrift)
2. Intraoperatieve radiotherapie verbetert de lokale controle bij patiënten die een R1-2 resectie van een primair lokaal uitgebreid rectumcarcinoom ondergaan. (dit proefschrift)
3. De chirurgische behandeling van het recidief rectumcarcinoom dient vooraf te worden gedaan door radiotherapie om de lokale controle te verbeteren. (dit proefschrift)
4. Het verrichten van een totaal exenteratie na neoadjuvante radiotherapie bij patiënten met een primair lokaal voortgeschreden rectumcarcinoom lijkt gerechtvaardigd gezien de goede lokale controle en overleving. (dit proefschrift)
5. Behandeling met radiofrequente ablatie (RFA) kan worden overwogen bij patiënten met een recidief rectumcarcinoom. (dit proefschrift)
6. Colorectale chirurgen moeten reconstructieve technieken zoals de gracilisplastiek, verticale rectus abdominisplastiek of een omentumplastiek kunnen toepassen om defecten in het kleine bekken te reconstrueren. (dit proefschrift)
7. Rectum: woonplaats van aërobe en anaërobe bacteriën en 359 humane inwoners. (Rectum, gemeente Wierden, provincie Overijssel)
8. Geïsoleerde leverperfusie met retrograde outflow-techniek is een veilige en veelbelovende procedure voor patiënten met irresectabele levermetastasen.
9. Het maakt niet uit hoe traag je gaat, zolang je maar vooruitgang boekt. (Confucius, 551-479 v.C.)
10. Een voordeel van global warming is dat de stookkosten dalen en daarmee het energieverbruik.
11. De beste stellingen zijn van staal.

Maarten Vermaas,  
Rotterdam, 3 april 2008

Stellingen behorende bij het proefschrift

MULTIMODALITY TREATMENT FOR LOCALLY ADVANCED  
AND RECURRENT RECTAL CANCER

1. Registratie van patiënt en tumor gerelateerde factoren rondom de behandeling in een netwerk van participerende ziekenhuizen geeft de mogelijkheid de kwaliteit van de behandeling van patiënten in dit netwerk met een rectumcarcinoom te verbeteren. (dit proefschrift)
2. Intraoperatieve radiotherapie verbetert de lokale controle bij patiënten die een R1-2 resectie van een primair lokaal uitgebreid rectumcarcinoom ondergaan. (dit proefschrift)
3. De chirurgische behandeling van het recidief rectumcarcinoom dient vooraf te worden gedaan door radiotherapie om de lokale controle te verbeteren. (dit proefschrift)
4. Het verrichten van een totaal exenteratie na neoadjuvante radiotherapie bij patiënten met een primair lokaal voortgeschreden rectumcarcinoom lijkt gerechtvaardigd gezien de goede lokale controle en overleving. (dit proefschrift)
5. Behandeling met radiofrequente ablatie (RFA) kan worden overwogen bij patiënten met een recidief rectumcarcinoom. (dit proefschrift)
6. Colorectale chirurgen moeten reconstructieve technieken zoals de gracilisplastiek, verticale rectus abdominisplastiek of een omentumplastiek kunnen toepassen om defecten in het kleine bekken te reconstrueren. (dit proefschrift)
7. Rectum: woonplaats van aërobe en anaërobe bacteriën en 359 humane inwoners. (Rectum, gemeente Wierden, provincie Overijssel)
8. Geïsoleerde leverperfusie met retrograde outflow-techniek is een veilige en veelbelovende procedure voor patiënten met irresectabele levermetastasen.
9. Het maakt niet uit hoe traag je gaat, zolang je maar vooruitgang boekt. (Confucius, 551-479 v.C.)
10. Een voordeel van global warming is dat de stookkosten dalen en daarmee het energieverbruik.
11. De beste stellingen zijn van staal.

Maarten Vermaas,  
Rotterdam, 3 april 2008