

Stellingen
behorend bij het proefschrift

DOBUTAMINE-ATROPINE STRESS ECHOCARDIOGRAPHY

a method for preoperative cardiac risk stratification in
patients undergoing major vascular surgery

door Daniël Poldermans

1. Dobutamine-atropine stress echocardiografie is superieur aan klinische parameters en het electrocardiogram in rust voor het preoperatief bepalen van het perioperatieve cardiale risico bij patiënten die een uitgebreide vaat operatie ondergaan.
2. Door toevoeging van atropine aan de dobutamine stress test is het niet nodig beta blokker medicatie voor het onderzoek te staken.
3. Dobutamine-atropine stress echocardiografie heeft prognostische waarde voor het optreden van cardiale complicaties gedurende 2 jaar na een vaatoperatie.
4. Dobutamine-atropine stress echocardiografie heeft weinig bijwerkingen en is goed uit te voeren bij oudere patiënten.
5. De dobutamine-atropine stress test is veilig bij patienten die geopereerd gaan worden aan een aneurysma van de aorta abdominalis.
6. Het positief chronotrope effect van dobutamine op het hart is niet verminderd bij oudere patiënten die echografisch geen aanwijzingen hebben voor myocard ischemie.

7. Bij het uitvoeren van een dobutamine-atropine stress echocardiografie dient een arts aanwezig te zijn.
8. Bij het publiceren van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften dient meer rekening gehouden te worden met de keuze van het tijdschrift dan met de "science citation index".
9. In de opleiding tot internist dient een aparte stage "infectie ziekten" te worden opgenomen.
10. Lever enzym stoornissen optredend tijdens totale parenterale voeding zijn meer gerelateerd aan de onderliggende ziekte van de patiënt dan aan de samenstelling van de voeding.
11. "Er is een vaste wet in het leven: als de ene deur zich voor ons sluit, gaat een andere open"
(André Gide 1869-1951)
12. De ontwikkeling van de "kop van zuid" in Rotterdam is een teken van de verandering in het haven gebied, van kloppend economisch hart tot een "Feijn-oord" om te leven.