

## STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

### **Physical and psychosocial correlates of rehabilitation, survival and relapse in head and neck cancer patients**

1. Integrale zorg is méér dan het geïntegreerd werken van de medische disciplines. (*Pruyn JFA, De Boer MF, et al. Ned tijdschr Geneeskd, 1995; 139:342-6*)
2. Kankerpatiënten dienen bij het polikliniekbezoek systematisch gescreend te worden op medische en psychosociale problemen. (*Pruyn JFA, Mosterd FR, Van Hest MAG, De Boer MF, et al. Submitted for publication*)
3. Gespecialiseerde behandelcentra moeten initiatieven nemen voor samenwerking met de eerste lijn, ook op het gebied van onderzoek.
4. Een logboek moet als een vanzelfsprekend hulpmiddel worden toegepast in de zorg voor hoofd-halskankerpatiënten. (*Van Wersch A, De Boer MF, et al. Patient Education and Counseling, 1997; 31:223-36*)
5. Bij elke patiënt die behandeld wordt voor een hoofd-halstumor moeten als standaard naast medische ook psychosociale gegevens worden verzameld ten einde de overleving en de uitkomsten van rehabilitatie te verbeteren. (*dit proefschrift*)
6. Roken verkort de levensduur bij patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied. (*dit proefschrift*)
7. Bejaarde mensen moeten uitzicht kunnen hebben op een humane, zelf gekozen dood. (*naar H. Drion*)
8. Although death is dominant in palliative care setting, terminal care requires an affirmation of life and a recognition that dying is not an aberration of medical care but a natural and normal process. (*Mancini I, editorial, Topics on Supportive Care in Oncology, 1997;25:1*)

9. The dictum espoused by Hippocrates of “primum non nocere” (“first, do not harm”) is nowhere more appropriate than in the planning of individual therapies to achieve optimal quality of life.  
*(Bland KI, editorial, Ca Cancer J Clin, 1997;47:194-7)*
10. Hoofd-halsoncologie in perifere klinieken moet nog steeds als “maligne” worden beschouwd.
11. Door de gunstige resultaten van het huidige conservatieve behandelingsbeleid met behulp van chinolonen voor de necrotiserende otitis externa is de benaming “maligne” otitis externa nog meer misplaatst geworden.