

STELLINGEN

1. Radiologische staging van patiënten met een oesofagus- en cardiacarcinoom behoort te beginnen met echografisch onderzoek van de supraclaviculaire lymfklieren.
2. Echogeïde galblaasdrainage is een veilige en effectieve behandeling voor patiënten met acute cholecystitis en een verhoogd operatierisico.
3. Echografisch screenend onderzoek van de mammae bij patiënten zonder een palpabele afwijking of een focale laesie op het mammogram is niet geïndiceerd en leidt tot valse geruststelling.
4. Bij patiënten met portale hypertensie en een acute varicesbloeding is een TIPSS-procedure te verkiezen boven het aanleggen van een chirurgische shunt.
5. De voorkeur voor endoscopische galwegstentplaatsing boven percutane bij patiënten met een maligne distale galgangobstructie is alleen gegrond wanneer deze direct in aansluiting aan de diagnostische ERCP plaatsvindt.
6. Bij iedere vrouw met een zwelling achter de tepel moet ook in afwezigheid van ontstekingsverschijnselen, behalve aan een carcinoom, ook aan een non-puerperale mastitis worden gedacht.
7. Het ongedaan maken van een niet-geïndiceerd onderzoek kost de radiodiagnost vaak meer tijd en moeite dan het verrichten van het onderzoek zelf.
8. Bij een patiënt met de verdenking van een HNP is CT als eerste onderzoekstechniek te prefereren boven myelografie.
9. Voor de interpretatie van het resultaat van een echografisch onderzoek bij patiënten met een abdominaal trauma moeten klinische en laboratoriumgegevens betrokken worden.
10. Het uitbannen van die gevallen van zelfverwijzing die financieel voordeel bieden voor de specialist zou een effectieve methode kunnen zijn om de kosten in de gezondheidszorg te verlagen.
11. De politieke desintegratie van Oost-Europa is voor een belangrijk deel veroorzaakt door het streven naar politieke integratie in West-Europa.
12. 's Lands grootste kruidenier doet de doctorstitel in de aanbieding.

Stellingen behorend bij het proefschrift:
"Radiologic staging of esophageal and gastroesophageal junction carcinoma"