

## STELLINGEN

### I

De aanwezigheid van depressie is een contra – indicatie voor het verrichten van een rugoperatie als behandeling voor een hernia nucleii pulposus.

### II

De New-York- en de Rome-criteria voor spondylitis ankylopoietica zijn voor personen ouder dan 45 jaar niet meer betrouwbaar.

### III

De aanwezigheid van lumbale discusdegeneratie of lumbale spondylolisthesis zijn geen afdoende verklaring voor lage – rugpijn – klachten.

### IV

Thermografie levert geen bijdrage in de diagnostiek en evaluatie van reumatoïde arthritis van de hand – en voetgewrichten.

### V

Het is een kunstfout om bij een jichtaanval een urinezuurverlagend middel voor te schrijven.

### VI

Een autopsie blijft een vitale component voor het zeker stellen van een goede medische zorg.

*Goldman e.a. in New Engl J Med 1983.*

### VII

Het inappropriate ADH syndroom (SIADH) dient primair behandeld te worden met waterbeperking. Is dit voor de patiënt ondraaglijk dan kan behandeling met ureum per os uitkomst bieden.

## VIII

Patiënten met het ziektebeeld thrombotische thrombocytopenische purpura (ziekte van Moschcovitz) dienen met vers-plasmainfusen te worden behandeld en niet met thrombocytensuspensies.

## IX

Een selectieve H2-antagonist zoals cimetidine mag bij verdenking op een peptisch ulcus pas worden voorgeschreven na een adequaat maagonderzoek.

## X

De omschrijving "eosinofiele fasciitis" is misleidend. Beter is "fasciitis met eosinofilie in het perifere bloed", zoals de oorspronkelijke beschrijving van Shulman ook luidde.

## XI

Fysiotherapie is een vorm van psychotherapie.

## XII

Muziekonderwijs dient een basisvak te zijn op de lagere school naast lezen schrijven en rekenen. Ook op de middelbare school behoort muziekonderwijs onderdeel te zijn van het studiepakket.

## XIII

Bij het aanvragen van het HLA-B27 antigeen dient de aanvrager nuchter te zijn.

Stellingen behorend bij het proefschrift van H.C.M.Haanen: "Een epidemiologisch onderzoek naar lage-rugpijn".  
Rotterdam, 7 november 1984.