

STELLINGEN

behorend bij het proefschrift

“Topoisomerase I inhibitors: clinical studies on oral administration and/or combinations with cisplatin”.

1. Farmacokinetisch onderzoek dient een standaard onderdeel te vormen van fase I studies, waarin combinatiechemotherapie wordt onderzocht.
Dit proefschrift.
2. Voor combinatietherapie met topoisomerase I remmers geldt: “sequence can be an issue”.
Dit proefschrift.
3. Door adequate samenwerking tussen preklinisch onderzoeker, clinicus en farmacoloog kan ‘pharmacoptosis’ van nieuwe geneesmiddelen worden voorkomen.
Clin Cancer Res, 4:1079-1086,1998.
4. Uit farmacologisch oogpunt geniet het de voorkeur om irinotecan met grapefruitsap in te nemen, terwijl topotecan oraal het best met sinaasappelsap kan worden gecombineerd.
5. Uit onderzoek is gebleken, dat de patiënt liever slikt dan prikt. Daarom verdient de ontwikkeling van oraal toepasbare cytostatica de voorrang.
J Clin Oncol 15:110-115,1997.
6. Ook door radiologen dienen de WHO-richtlijnen ter bepaling van een tumorrespons te worden gebruikt.
7. De steeds uitgebreidere verantwoording die patiënten vragen over de werkzaamheid van reguliere behandelingsmethoden staat in schril contrast tot hun onvoorwaardelijk geloof in alternatieve geneeswijzen.
8. De uitdrukking dat in België patiënten koorts “doen” en in Nederland koorts “krijgen”, suggereert ten onrechte een actievere opstelling van de Belgische patiënt.

9. "Man cannot discover new oceans until he has courage to lose sight of the shore."

10. Idealiter dient de relatie tussen medisch oncoloog en oncologisch chirurg te zijn als tussen man en vrouw: ze vullen elkaar aan.