

Stellingen

behorende bij het proefschrift

**Renal artery stenosis:
diagnostic strategy and treatment**

Brigit van Jaarsveld

2 december 1999

1. Nierscintigrafie is bij de diagnostische screening van patiënten met hypertensie weinig zinvol, ook wanneer er voorselectie van patiënten met een verhoogd risico op renovasculaire hypertensie heeft plaatsgevonden.
(Dit proefschrift)
2. Een nierscintigram dat de aanwezigheid van een hemodynamisch significante nierarteriestenose suggereert, voorspelt niet of de bloeddruk gunstig zal reageren op ballonangioplastiek.
(Dit proefschrift)
3. Bij patiënten met hypertensie en normale nierfunctie die een adequate bloeddrukdaling tonen op 1 of 2 antihypertensiva, is het verrichten van verdere diagnostiek naar een nierarteriestenose niet geïndiceerd.
(Dit proefschrift)
4. Met behulp van een combinatie van eenvoudige klinische criteria kan het risico op nierarteriestenose worden geschat bij patiënten die hypertensief blijven ondanks het gebruik van 2 middelen.
(Dit proefschrift)
5. Vanwege de grote interobserver-variatie bij de angiografische beoordeling van de plaats en de ernst van nierarteriestenose, kan de radioloog zich het best beperken tot het classificeren van de stenose als “niet ernstig” en “ernstig”.
(Dit proefschrift)
6. Het verrichten van ballonangioplastiek bij een atherosclerotische nierarteriestenose is alleen geïndiceerd als de hypertensie blijft bestaan ondanks behandeling met 3 middelen of als er sprake is van recente achteruitgang van nierfunctie.
(Dit proefschrift)
7. Bij een klinisch multicentrisch onderzoek geldt: hoe gecompliceerder de aandoening die men onderzoekt, hoe eenvoudiger de studie-opzet.
8. Als een centrum wil participeren aan een multicentrisch onderzoek betreffende een bepaalde ziekte, moet het centrum bereid zijn het overgrote deel van het aantal patiënten met die ziekte daadwerkelijk te includeren.

9. De lagere morbiditeit en mortaliteit van patiënten bij wie de hemodialyse-behandeling thuis wordt uitgevoerd, is voor een deel te verklaren uit het toegenomen inzicht van patiënten in hun eigen gezondheidstoestand.
10. De Engelse en Amerikaanse patiënt is mondiger dan de Nederlandse, omdat de Angelsaksische taal veelvuldig Latijnse woorden gebruikt.
11. Intensiever onderwijs over het menselijk lichaam op de basis- en middelbare school zal de communicatie tussen arts en patiënt en daardoor de kwaliteit van de gezondheidszorg sterk ten goede komen.
12. Het welzijn van een patiënt is minstens zo gebaat bij een arts die goed kan communiceren, als bij een arts die over een grote medische kennis beschikt.
13. De agressie van een patiënt, ook al is deze onterecht, kan het best worden benaderd door louter begrip te tonen voor zijn of haar situatie, omdat agressie meestal uiting is van onverwerkte rouw.
14. Een binnenhuisarchitect is pas tevreden met een ontwerp als de uitvoering ervan technisch niet mogelijk is.
15. Het vermeende tekort aan internisten, dat zou ontstaan door deeltijdarbeid, komt voort uit mannelijk instinct en zou met vrouwelijke efficiency met gemak kunnen worden voorkomen.

