

PREVENTION OF UNINTENTIONAL INJURIES IN EARLY CHILDHOOD

Using an E-health4Uth home safety intervention to promote parents' child safety behaviours

1. Ouders nemen bij een eerste kind vaak te laat veiligheidsmaatregelen (*dit proefschrift*).
2. Kinderen onder de 12 maanden worden vaker alleen gelaten in bad als er meerdere kinderen in het gezin zijn (*dit proefschrift*).
3. Ouders schatten de kans dat hun kind een ongeval krijgt laag in (*dit proefschrift*).
4. Veiligheidsvoorlichting ter preventie van ongevallen bij kinderen dient rekening te houden met kenmerken van de ouders en het gezin (*dit proefschrift*).
5. Online Advies-op-Maat gecombineerd met persoonlijke counseling op consultatiebureaus kan het veiligheidsgedrag van jonge ouders bevorderen (*dit proefschrift*).
6. Vervoer van jonge kinderen in een autostoel tegen de rijrichting in is in ieder geval tot 2 jaar de veiligste keuze (*Henry, et al, Injury Prevention. 2007;13:398-402*).
7. Post mortem computer tomografie kan een toevoeging zijn op autopsie in het beoordelen van de doodsoorzaak van trauma slachtoffers (*Scholing, et al, Eur Radiol. 2009 Oct;19(10):2333-41*).
8. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in een liefdevolle omgeving (*Unicef, Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 1989*).
9. Kinderen die buiten slapen in de winter, zijn actiever, eten beter en slapen langer dan kinderen die binnen slapen (*Tourula, et al, Int J Circumpolar Health. 2008 Jun;67(2-3):269-78*).
10. Evidence Based Practice verbetert het verpleegkundig vak en de zorg voor patiënten (*Ubbink, et al, The Netherlands Journal of Medicine. 2011 Feb; 69(2): 87-94*).
11. "Happiness [is] only real when shared" (*Jon Krakauer, Into the Wild*).

Mirjam Scholing - van Beelen
20 november 2013

