

STELLINGEN

1. Patiënten met een orbitabodemfractuur dienen door een oogarts te worden onderzocht.
2. Bij orbitabodemfracturen met het vermoeden op herniatie van orbitaweefsel in de sinus maxillaris verdient coronaire computertomografie de voorkeur boven conventionele tomografie.
3. Een orbitabodemfractuur met een intacte periorbita behoeft geen bodemimplantaat.
4. Fixatie van een zygomafractuur met een tampon of ballon in de sinus maxillaris is niet mogelijk.
5. Bij posttraumatische lekkage van liquor uit neus of oor is de prophylactische toediening van antibiotica gecontraïndiceerd.
6. Het bewijs dat antimicrobiële prophylaxe bacteriële endocarditis bij patiënten met aangeboren of verworven klepgebreken voorkomt, kan om logistieke redenen niet worden geleverd.
7. De gezondheidstoestand van het gebit bij personen met aangeboren of verworven klepgebreken moet in veel gevallen als slecht worden aangemerkt.
8. Het gebruik van een Thiersch-transplantaat bij een mondbodem- en vestibulumplastiek verdient de voorkeur boven een mucosatransplantaat.
9. De invoering van de Wet twee-fasenstructuur w.o. mag er niet toe leiden dat (aanstaande) specialisten in de mondziekten en kaakchirurgie de mogelijkheid wordt ontzegd om, na het behalen van het tandartsdiploma, het artsdiploma te verwerven.
10. Bij de herziening van de medische curricula dienen de klinische hoorcolleges een belangrijke plaats te krijgen in het klinisch onderwijs, niet alleen op grond van economische overwegingen, maar vooral vanwege de onderwijskundige waarde.
11. Het is een bedenkelijk verschijnsel dat de medische bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam op zaterdag na 12.30 uur en de gehele zondag gesloten is.