

## STELLINGEN

I

De validiteit van een screeningstest voor congenitale hypothyreoïdie waarbij van een thyroxine (T<sub>4</sub>)-bepaling gebruik wordt gemaakt, wordt verhoogd door tevens het thyroxine-bindende globuline (TBG)-gehalte te bepalen en de indicatie voor vervolgonderzoek te stellen op grond van de T<sub>4</sub>/TBG-ratio.

*E.F. Robertson et al. J. Pediat. 97 (1980) 604.*

II

De noodzaak te screenen op congenitale en neonatale vormen van secundaire en tertiaire hypothyreoïdie is slechts met behulp van screening op deze aandoeningen aan te tonen.

III

Amniofoetografie met behulp van jodiumhoudende contrastmiddelen is, mede in verband met het gevaar voor een foetale hypothyreoïdie, te beschouwen als een verouderde onderzoeksmethode.

IV

De bekendheid van het anglicisme "screenen" bemoeilijkt de invoering van een gelijkwaardige Nederlandse term als horden, ziften, zijgen, wannen, klenzen of teemsen.

V

In de opleiding tot arts wordt te weinig ruimte gelaten voor de epidemiologie.

VI

Hoewel de neonatale screening op phenylketonurie als een schoolvoorbeeld van screening geldt, is de voorspellende waarde van een abnormale testuitslag bij deze screening niet hoog.

VII

Er zijn onvoldoende gegevens bekend om te mogen stellen dat het door Hoogendoorn gevonden verband tussen de afname van de perinatale sterfte en de toename van ziekenhuisbevallingen, een causaal verband is.

*D. Hoogendoorn. Ned.T.Geneesk. 122 (1978) 1171.*

VIII

De tijdsduur tussen een eerste pediatrisch onderzoek naar aanleiding van specifieke verschijnselen en het stellen van de diagnose galactosemie rechtvaardigt onderzoek naar de waarde van een selectieve screening op galactosemie.

IX

Hoewel de pneumokokkenvaccinatie bij kinderen die een acute otitis media doormaakten de kans op recidieven doet afnemen, is er bij deze aandoening vooralsnog geen indicatie tot vaccinatie.

*P.H. Mäkelä et al. Lancet 2 (1980) 547.*

X

De preventie van het Sudden Infant Death syndroom ("wiegedood") dient gebaseerd te zijn op de resultaten van epidemiologisch onderzoek; dergelijk onderzoek verdient ook in ons land hoge prioriteit.

XI

De uitvoerders van een screeningsprogramma dienen de oprichting van een vereniging van (ouders van) patienten lijdende aan de ziekte waarop wordt gescreend, te stimuleren.

XII

Het is mede aan de virtuositeit van het spel van Friedrich Pichlerberger te danken dat de contrabas-literatuur werd verrijkt met een werk van W.A. Mozart (K.V. 612).

XIII

De carrière van burgemeesters hangt minder samen met hun feitelijk functioneren dan met het vage idee dat degenen die hun carrière bepalen, daarover hebben.

Stellingen behorende bij het proefschrift van G. Derksen-Lubsen:  
Screening for congenital hypothyroidism in the Netherlands.  
18 maart 1981.