

10. Bij een tweede zitting voor longfunctie-onderzoek dient rekening te worden gehouden met de neiging tot het verkrijgen van betere resultaten.

J.M.England: Medical Research, A Statistical and  
Epidemiological Approach, 37.  
Churchill Livingstone, 1975.

11. Niet roken is een zeer belangrijke profylactische maatregel met betrekking tot respiratoire en vele andere ziekten.

J.L.Burton: Aids to Postgraduate Medicine, 22.  
Churchill Livingstone, 1974.

12. De wettelijke verantwoordelijkheid voor de apotheekvoering door een huisarts dient mede te worden gedragen door een apotheker.

Med.Contact 31 (1976), 1315.

13. Waar dit technisch mogelijk is, dient bij de bereiding van D-penicillamine oogdruppels de voorkeur te worden gegeven aan het afvullen onder stikstof.

Pharmaceutisch Weekblad 112 (1976), 121 en 155.

14. Het theorema van Bayes heeft voor de praktische geneeskunde geen betekenis.

Clin.Pharmacol.Ther.21 (1977), 482.

15. Als toevoeging aan dranken dient aethylalcohol op toxicologische gronden te worden verlaten.

J.L.Burton: Aids to Postgraduate Medicine, 67.  
Churchill Livingstone, 1974.

(behorend bij L.van Wijk: Evaluation of D-Penicillamine in Scleroderma)

## STELLINGEN

1. Bij sclerodermie speelt naar alle waarschijnlijkheid een exogene factor een belangrijke etiologische rol.  
Acta Dermatovener. (Stockh.) 56 (1976), 83.
2. Het is gerechtvaardigd om voort te gaan met het zoeken naar een adequate behandeling van sclerodermie.
3. Het valt te proberen of anti-infectieuze middelen een causaal gerichte verbetering kunnen bewerkstelligen bij primair chronisch reuma en andere collagenosen.  
Arch.Derm,104 (1971), 21.
4. Het ware te onderzoeken of D-penicillamine juist geïndiceerd is voor de behandeling van metaal-intoxicaties en L-penicillamine vooral voor de behandeling van collageenziekten.  
Arzneim.Forsch,24 (1974), 1043.
5. Voor geneesmiddelen die een discutabele werkzaamheid bezitten, kan een uiterste aanduiding van die werkzaamheid worden gezocht in farmacologisch onderzoek naar een additioneel of antagonistisch effect ten opzichte van andere stoffen.
6. De ontwikkeling van een vervangmiddel voor digitalispreparaten, behept met een grote therapeutische breedte en met de werkzaamheid van glucagon op de hartspeer, dient te worden aangemoedigd.  
P.Turner, A.Richens: Clinical Pharmacology, 127.  
Churchill Livingstone, 1975.
7. Teneinde lokale pigmentaties te doen verbleken, valt bevroering met behulp van de chloorethyl-spray te overwegen.
8. De ontwikkeling van een lichtgewicht zuurstof-inhalatie-apparaat kan vooral voor de oudere mens van nut blijken voor het behoud van een redelijk prestatieniveau, bijvoorbeeld in het geval van chronische bronchitis.  
Brit.med.J,2 (1977), 84.
9. De term CARA leidt tot vaagheden en onduidelijkheden in de epidemiologie van respiratoire aandoeningen en dient derhalve bij voorkeur te worden vervangen door meer specifieke aanduidingen.